

ديتيسين

داكاربازين

100 ملغ / 200 ملغ

مجفد للحقن

الشكل والعبوة لائحة 1

مجفد الداكاربازين 100 ملغ : علبة فيها قارورة واحدة مع أمبولة 10 ملل من ماء لمستحضر للحقن. علبة فيها 10 قارورات مع 10 أمبولات 10 ملل من ماء لمستحضر للحقن.

- مجفد الداكاربازين 200 ملغ : علبة فيها 10 قارورات مع 10 أمبولات 20 ملل من ماء لمستحضر للحقن. علبة فيها 10 قارورات أو 50 قارورة بدون أمبولات المذيب.

موانع الاستعمال

- الحمل.

- الإرضاع.

التأثيرات الجانبية

مثل كل مادة فعالة قد يسبب هذا الدواء عند بعض الأشخاص تأثيرات نوعاً ما مزعجة. عليكم استشارة الطبيب.

كيفية الاستعمال

الطبيب وحده هو الذي يحدد كيفية المعالجة. للاستعمال عن طريق التسريب الوريدي أو داخل الشريان.

الاحتياطات

يجب مراقبة الصيغة الدموية بانتظام. ينبغي حفظ الديتيسين بعيداً عن الضوء في درجة حرارة لا تتجاوز 25° مئوية.

يجب تحضير محلول التسريب فوراً بعد إذابة المجفد. يوصى بإضافة الديتيسين للمحلول عن طريق قارورة التسريب بدلاً من الأنبوب.

يلزم وقاية قارورة التسريب وأنبوب الإعطاء من الحرارة والضوء أثناء عملية التسريب.