

Déticène®

200mg

Lyophilisat pour usage parentéral
Freeze-dried substance for parenteral use

PRESENTATIONS

- Liste 1
- 100 mg dacarbazine lyophilisat : boîte de 1 flacon et 1 ampoule 10 ml eau p.p.i. boîte de 10 flacons et 10 ampoules 10 ml eau p.p.i.
 - 200 mg dacarbazine lyophilisat : boîte de 10 flacons et 10 ampoules de 20 ml eau p.p.i. boîte de 10 ou 50 flacons sans solvant.

CONTRE-INDICATIONS

- Grossesse.
- Allaitement.

EFFETS SECONDAIRES

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

Consulter votre médecin.

MODE D'EMPLOI

Seule le médecin est habilité à conduire le traitement.
Perfusion veineuse et voie intra-artérielle.

*Aventis

PRECAUTIONS

Surveillance hématologique régulière.

Le Déticène peut être conservé jusqu'à 25° C à l'abri de la lumière.

Après dilution, la solution à perfuser doit être utilisée extemporanément. Il est conseillé d'introduire le Déticène dans le flacon de perfusion plutôt que dans la tubulure.

Lors de la perfusion, flacon et tubulure doivent être tenus à l'abri de la chaleur et de la lumière

Code Ressource

PRESENTATIONS