

فامودار

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل إستعمال أو تناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.
- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءاً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالإتصال بطبيبك للمعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

- ما هي أقراص فامو دار وما هي دواعي استعمالها**
- قبل القيام بتناول أقراص فامودار**
- طريقة إستخدام أقراص فامو دار**
- الأعراض الجانبية المحتملة**
- ظروف تخزين أقراص فامودار**
- معلومات إضافية**

١. ما هي أقراص فامودار وما هي دواعي الإستعمال؟

تحتوي **أقراص فامودار على دواء يمدى فاموتيدين** (٢٠ ملغم أو ٤٠ ملغم) والذي ينتمي الى مجموعة الأدوية التي تسمى مثبطات مستقبلات الهيستامين ٢ (H2). يقلل فامودار من كمية الحمض التي يتم إفرازها في المعدة.

يستخدم فامودار في:

- منع حدوث قرحة في المعدة أو في الجزء الأول من الأمعاء (قرحة الإثني عشر).
 - علاج القرحة وتخفيف أيضا من الأعراض التي تشعر بها. كما قد يقلل فامو دار من احتمالية عودة قرحة الاثني عشر مرة أخرى.
 - علاج "داء الإرتجاع المعدي المريئي" (GORD) الذي يسببه ارتداد الحمض والطعام من معدتك الى قناة الطعام (المريء)، أو لمنع عودة الأعراض مرة أخرى.
 - "متلازمة زولينجر-إليسون" عندما تقوم معدتك بإفراز كمية كبيرة من الحمض.
- خُذت إلى طبيبك إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الموضوع.

٢. قبل القيام بتناول أقراص فامودار

- موانع إستعمال أقراص فامودار**
- إذا كانت لديك حساسية من المادة الفعالة في هذا الدواء أو أي من المكونات الأخرى
 - سبق ظهور تفاعلات فرط حساسية عند تناول دواء مشابه لهذا الدواء
 - في حال الحمل أو الشك بوجود حمل
 - إذا كنت تخططين للحمل
 - إذا كنت مرضع
- لا تستخدم **فامودار** اذا انطبق عليك أي من المذكور أعلاه. خُذت إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول **فامودار** اذا كنت غير متأكد.
- الأطفال**
- يمنع إستخدام**فامو دار** في الأطفال .

الاحتياطات عند إستعمال أقراص فامودار

راجع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الدواء إذا كانت لديك مشاكل في الكلى.
من الممكن أن يقوم طبيبك بالتحقق من تعداد الدم وأداء الكبد لديك في حال تناولت جرعة كبيرة من**فامو دار** لفترة طويلة.
من المهم أن لا تتوقف عن تناول فامو دار بشكل مفاجيء دون التحدث الى طبيبك في حال كنت تعاني من القرحة لفترة طويلة

التداخلات الدوائية من أخذ هذا المستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب او مكملات غذائية
الرجاء إخبار طبيبك إذا كنت تتناول أو تناولت أي أدوية أخرى مؤخرًا، بما فيها تلك التي تتناولونها دون وصفة طبية، عليك إخبار طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية على وجه الخصوص:
برونيبيد. يستخدم لعلاج النقرس أو التهاب المفاصل الناتج عن النقرس
ايتراكونازول أو كيتوكونازول. يستخدم للعوى الفطرية
اتازانافير. يستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز)
مضادات الحموضة. تستخدم لعلاج حرقة المعدة أو عسر الهضم
سكرالغيت، الذي يستخدم لعلاج القرحة

تأثير أقراص فامو دار على القيادة وإستخدام الآلات
ظهرت بدون أفعال سلبية مثل دوخة وصداغ لدى تناول فاموتيدين. لا تقم بالقيادة أو تشغيل الآلات حتى تعرف كيف يؤثر فامو دار عليك وإذا كنت تواجه هذه الأعراض .

معلومات هامة حول بعض مكونات أقراص فامودار
تحتوي أقراص فامو دار ٢٠ ملغم و ٤٠ ملغم على لون أصفر (E110)، بالإضافة لـون أحمر (E122) في أقراص فامو دار ٤٠ ملغم، والتي من الممكن أن تسبب تفاعلات حساسية.

٣. طريقة إستخدام أقراص فامودار

تناول هذا الدواء

- يجب أن تتناول هذا الدواء عن طريق الفم. سيقتصد عدد الأقراص التي عليك تناولها يوميا على حالتك وإذا كانت لديك مشاكل في الكلى.
 - إبلع القرص مع الماء.
 - لا تتناول أكثر أو أقل من الجرعة الموصوفة من قبل طبيبك.
 - يجب أن تتقيد بالفترة العلاجية التي حددها الطبيب حتى لو شعرت بتحسن بشكل سريع.
 - من المهم أن لا تتوقف عن تناول الأقراص دون التحدث الى طبيبك.
- الجرعة المعتادة هي:**

- العلاج:** قرص واحد ٤٠ ملغم مساءً، لمدة ١ إلى ٨ أسابيع. قد يتغير هذا اعتمادا على الطريقة التي تستجيب فيها للعلاج.
- الوقاية :** قرص واحد ٢٠ ملغم مساءً.

داء الإرتجاع المعدي المريئي

- الوقاية من الأعراض الطفيفية: قرص واحد ٢٠ ملغم صباحا وقرص واحد ٢٠ ملغم مساءً.
 - علاج الأعراض الطفيفية: قرص واحد ٢٠ ملغم صباحا وقرص واحد ٢٠ ملغم مساءً . لمدة ٦ إلى ١٢ أسبوع .
 - علاج الأعراض الأكثر حدة: قرص واحد ٤٠ ملغم صباحا وقرص واحد ٤٠ ملغم مساءً . لمدة ٦ إلى ١٢ أسبوع.
- "متلازمة زولينجر-إليسون"
- قرص واحد ٢٠ ملغم كل ٦ ساعات
 - من الممكن أن يحتاج بعض المرضى الى جرعة أكبر

الجرعة الزائدة من فامو دار
يرجى مراجعة طبيبك على الفور .

نسيان تناول جرعة فامو دار
لا تتناول جرعة إضافية . تناول الجرعة التالية **من فامو دار** في موعدھا المعتاد دون تعويض الجرعة الفائتة.
في حال وجود إستفسارات أخرى حول استخدام هذا الدواء قم باستشارة طبيبك أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

شأنه شأن الأدوية الأخرى، قد يسبب فامودار أعراضا جانبية بالرغم من انها لا تحدث لدى جميع المرضى. من الممكن حدوث الأعراض الجانبية التالية:

فاموتيدين

شائعة (تؤثر في أقل من ١ من كل ١٠ أشخاص)

- صداع، دوخة
- إمساك، إسهال

غير شائعة (تؤثر في أقل من ١ من كل ١٠٠ شخص)

إذا ظهرت لديك تفاعلات حساسية، توقف عن تناول فامودار وراجع طبيبك على الفور تتضمن الأعراض حدوث العلامات التالية:

- تورم الوجه، الشفاه، اللسان، أو الحلق (مع صعوبة في التنفس أو البلع)
- شرى
- جفاف الفم، تغير في الذئوق
- شعور بالغثاس، تقيؤ
- آلم أو انتفاخ طفيف في المعدة (البطن)
- طفح
- فقدان الشهية
- شعور بالتعب
- حكة

نا درة جدا (تؤثر في أقل من ١ من كل ١٠٠٠ شخص)

- صغير أو صعوبة في البلع
- شعور بالإكتئاب، قلق، تهيج، إرتباك أو رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسات) وإرتباك. عادة تزول هذه الاعراض بعد التوقف عن تناول فامودار
- صعوبة في النوم
- نوبات لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى
- الشعور بوخز أو خدر
- برود جنسي

- تفاعلات جلدية خطيرة تعرف باسم متلازمة ستيفنز جونسون/أو انحلال البشرة السمي

- بطء أو عدم انتظام ضربات القلب
- إلتهاب رئوي (تشنج أحيانا)، آلم في المفاصل، تشنج العضلات
- إصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان)
- إختلال في فحوصات الكبد
- إنخفاض تعداد الدم (تظهر عن طريق فحص الدم)

تساقط الشعر

- خلل الإنتصاب (عجز جنسي)

غير معروفة

- زيادة حجم الثدي لدى الرجال (على الرغم أن السبب قد لا يكون استخدام فامو دار)

إذا أصبحت أي من هذه الأعراض الجانبية خطيرة، أو إذا لاحظت أي أعراض جانبية غير مدرجة في هذه النشرة يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي من المفضل القيام بتدوين ملاحظات عن حالتك، متى بدأت والى متى استمرت.

٥. ظروف تخزين أقراص فامودار

- يحفظ بعيدا عن متناول أيدي الأطفال ونظرهم.
- لا تستخدم فامو دار بعد تاريخ الانتهاء المذكور على العبوة الخارجية. يدل تاريخ الانتهاء على اخر يوم في الشهر المذكور.
- يحفظ بعيدا عن الضوء في مكان جاف على درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.
- يجب عدم التخلص من الأدوية في المياه العادمة أو النفايات المنزلية، إرسال الصيدلي حول الطريقة السليمة للتخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، سيساعد هذا في حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية

ما هي محتويات فامودار، ار.

أقراص فامودار: ٢٠ الغلغلة: يحتوي كل قرص مغلف على ٢٠ ملغم فاموتيدين كمادة فعالة.

أقراص فامو دار: ٤٠ الغلغلة: يحتوي كل قرص مغلف على ٤٠ ملغم فاموتيدين كمادة فعالة.

تحتوي أقراص فامو دار الـغلغلة أيضا على سيليلوز دقيق البلورية، نشا مهيلم، ستيارات المغنيسيوم، تالك، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم، مأكروغول، لون أصفر(E110) . بالإضافة الى ما سبق تحتوي أقراص فامو دار: ٤ على لون أحمر (E122) و لون أزرق (E132).

ما هو الشكل الصيدلاني لفامو دار ووصفه وحجم عبوته

أقراص فامو دار ٢٠ هي أقراص مغلفة دائرية محدبة الوجهين لونها أصفر إلى برتقالي، مرمزة بالرمز (FAM 20) على جهة واحدة، ملساء على الجهة الأخرى.

أقراص فامو دار ٤٠ هي أقراص مغلفة دائرية محدبة الوجهين لونها قرميدي، مرمزة بالرمز (FAM 40) على جهة واحدة، ملساء على الجهة الأخرى.

تنوفر أقراص فامو دار في أشكاله يحتوي كل منها على ١٠ أقراص . تنوفر أقراص فامو دار ٢٠ ملغم المغلفة في عبوات تحتوي ٢٠ قرص (شريطين)، ٣٠ قرص (ثلاث أشريطه)، ٤٠٠ قرص (٤٠ شريط) أو ٥٠٠ قرص (٥٠ شريط). وتنوفر أقراص فامو دار ٤٠ ملغم المغلفة في عبوات تحتوي ١٠ أقراص (شريط واحد)، ٤٠٠ قرص (٤٠ شريط) أو ٥٠٠ قرص (٥٠ شريط) .

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم وعنوان مالك رخصة التسويق والمصنع

شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار المساهمة المحدودة (ناعور - الأردن)

هاتف: ٥٧ ٢٧ ١٣٢ ٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس: ٥٧ ٢٧ ٧٧٦ ٥٧ (٩٦٢ ٦)

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية: