

ULSTOP

GÉLULES

OMÉPRAZOLE 20 mg

POUR LE TRAITEMENT DE
L'ULCÈRE GASTRIQUE ET
DUODÉNAL

COMPOSITION:

Chaque gélule contient:

Oméprazole (granulés à enrobage entérique) 20 mg

PROPRIÉTÉS:

ULSTOP (Oméprazole) appartient à une nouvelle classe d'agents antisécréteurs de l'acide gastrique. C'est un bloquant grandement sélectif de la pompe à protons responsable de la sécrétion acide par les cellules pariétales gastriques.

L'Oméprazole, en granulés à enrobage entérique, est protégé contre l'acidité élevée de l'estomac. Dans l'intestin grêle, l'Oméprazole est libéré, efficacement absorbé et distribué dans le corps avec une accumulation préférentielle dans les cellules pariétales gastriques à valeurs basses de pH. Dans ces cellules, l'Oméprazole est disposé de nouveau rapidement en ses deux dérivés actifs à savoir l'acide sulfonique et le sulfonamide. Ces formes actives inhibent de façon irréversible l'enzyme hydrogène /

potassium adénosine triphosphatase (H^+ / K^+ ATPase), le médiateur ultime de la sécrétion d'acide par les cellules pariétales. Comme résultat, les sécrétions d'acide gastrique à la fois basales et stimulées sont inhibées causant une diminution de l'acidité gastrique et du débit d'acide. Ceci fournit un soulagement rapide de la douleur associée à l'oesophagite par reflux, aux ulcères gastriques et duodénaux. La guérison de ces ulcères est aussi accélérée suivant l'administration des gélules d'ULSTOP.

ULSTOP est sûr et bien toléré et assure un effet de longue durée. ULSTOP offre un moyen systémique très efficace pour le contrôle de l'hyperacidité et le traitement de l'ulcère peptique avec un taux très bas de toxicité.

PHARMACOCINÉTIQUE:

L'Oméprazole est rapidement absorbé au niveau de l'intestin grêle. Il est grandement lié aux protéines plasmatiques (environ 95 %), métabolisé principalement dans le foie et éliminé rapidement sous forme de métabolites inactifs surtout dans les urines. Quelque la demi-vie plasmatique de l'Oméprazole soit de 0,5-1,5 heures, une dose unique quotidienne supprime la sécrétion d'acide pendant 24 heures.

INDICATIONS:

- Oesophagite par reflux.
- Ulcère peptique (ulcères gastrique et duodénal).
- Autres conditions associées à l'hyperacidité gastrique, comme le syndrome de Zollinger - Ellison.

POSOLOGIE:

1. Pour le traitement de l'oesophagite par reflux et l'ulcère peptique: 1-2 gélules une fois par jour le matin pendant 2-8 semaines.
2. Pour le contrôle du syndrome de Zollinger-Ellison: jusqu'à 6 gélules en deux ou trois doses réparties par jour peuvent être nécessaires selon la sévérité de la condition.

CONTRE-INDICATIONS:

Hypersensibilité à l'Oméprazole.

EFFETS INDÉSIRABLES

L'Oméprazole est très bien toléré. Dans de rares cas, nausée, diarrhée, colique abdominale, céphalée, étourdissement ou éruption cutanée peuvent survenir.

PRÉCAUTIONS:

L'Oméprazole ne doit pas être administré durant la grossesse et l'allaitement à moins qu'il ne soit strictement indiqué. Le traitement par l'Oméprazole n'est pas recommandé chez les patients ayant des tumeurs gastriques suspectées car il peut atténuer les symptômes et retarder le diagnostic.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

L'Oméprazole peut inhiber le métabolisme de quelques médicaments comme le diazépam, la phénytoïne et l'anticoagulant warfarine.

PRÉSENTATION:

Une boîte contenant 8, 14, 24 ou 28 gélules.

CONSERVATION:

Garder à la température ambiante.
Garder loin de la portée des enfants.

FABRIQUÉ EN

PHARCO
Pharmaceuticals



ALEXANDRIE