

معلومات لمستخدم الدواء

النشرة الداخلية للمستحضر الصيدلاني

أقراص أكستين ٢٠ ملغ المغلفة

فلوأكستين على هيئة قلوأكستين هيدروكلورايد

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال أو تناول هذا الدواء

احفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.

في حال كانت لديك أي استفسار تتعلق بهذا المستحضر فم

باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

إن هذا الدواء قد صرفة خصيصاً لك بناءً على وصفة

طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان

الشخص يعاني نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.

قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة

الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه

النشرة.

تحتوي هذه النشرة على :

١. ماهو أكستين و ما هي دواعي استعماله.

٢. قبل القيام بتناول أو استعمال أكستين.

٣. طريقة استخدام أكستين.

٤. الأعراض الجانبية.

٥. ظروف تخزين أكستين.

٦. معلومات إضافية.

١. ما هو أكستين و ما هي دواعي استعماله

تحتوي أقراص أكستين على المادة الفعلة فلوأكستين التي هي

واحدة من مجموعة الأدوية التي تسمى المثبطات الانتقائية

لاسترداد السيروتونين والتي تستخدمن لعلاج الاكتاب.

يسخدم هذا الدواء لعلاج الحالات التالية:

البالغين:

الاكتاب النفسي الرئيسي □ اضطراب الوسوس الهرمي

□ النهار النصبي: يستخدم أكستين إلى جانب العلاجات النفسية

للتقليل من سلوك الأكل بشكل مفرط والاسهال.

الاطفال و المراهقين الذين يبلغون من العمر ثمانى سنوات فما

يستخدم لعلاج الأضطراب الافتكي المترافق مع الذهاب

النفسي العذلن إلى الشديد فقط مع العلاج النفسي.

٢. قبل القيام بتناول أو استعمال أكستين

موانع استعمال أكستين

إذا كنت تعاني من حساسية أكستين أو لأي من المكونات

الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم ٦). إذا كنت تعاني من

الطفح الجلدي أو حساسية أخرى (مثل الحكة، تورم الشفاه أو

الوجه أو ضيق في التنفس)، توقف عنأخذ الأقراص واتصل

بطبيبك على الفور.

إذا كنت تتناول أقراص أكستين بعد بذور الطعام كما يفضل

الحمل، الرضاة والخصوصية:

إذا كنت تأملأ أو مرضعة، أو تعقيني بأنك حامل أو تخططين

للإنجاب، اطلبين من طبيبك أو الصيدلي تقديم المشورة قبل تناول

هذا الدواء.

الحمل:

إذا تحدثت مع طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت حاملاً، أو من

المحتمل أن تصيبني حاملاً أو إذا كنت تخططين للإنجاب.

الأطفال الذين أخذت أمهاهم فلوأكستين خلال الشهر الأولى من

الحمل، كانت هناك بعض الدراسات التي تصف زيادة خطر

العيوب الخلقية التي تؤثر على القلب. ويولد حوالي ١ من ١٠٠ طفل

مع عيب في القلب. وزاد هذا إلى حوالي ٢ من ١٠٠ طفل

في الأمهات اللاتي أخذن فلوأكستين.

إذا عندما تؤخذ الأدوية مثل فلوأكستين أثناء الحمل، وخاصة في

الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، قد تزيد من خطر حدوث حالات

خطيرة في الأطفال، تسمى ارتفاع ضغط الدم الرئوي المترافق،

مما يجعل الطفل يتوقف شكل أسرع ويطهر مزرك. وإذا

تبدأ هذه الأعراض مرتاحاً خلال الـ ٢٤ ساعة الأولى بعد ولادة الطفل.

إذا حدث ذلك لطفلها، فيجب عليك الاتصال بالقابلة / أو الطبيب

فوراً.

يفضل عدم استعمال أكستين أثناء العلاج الحمل لم تتفق

الغرافون المحتملة المخاطر المحتملة. وبالتالي، يمكنك أن

تطبيبك قرر التوقف عن تناول أكستين تدريجياً أثناء قيامك بذلك

حمل أو قبل الحمل. ومع ذلك، اعتماداً على طرائقك، قد يقوم

طبيبك بقرار أنه من الأفضل لك الاستمرار في تناول أكستين.

إذا ينبعي توخي الحذر عند استخدامها أثناء الحمل، وخاصة

خلال فترة الحمل المتأخرة أو قبل الولادة مباشرةً من أن تم

الإبلاغ عن الآثار الجانبية الشائعة تؤثر على أكثر من شخص واحد من

كل عشرة أشخاص هي الأرق والصداع والإسهال والشعور

بالمرض (الثبات) والتعب.

بعض المرضى لديهم:

مجموعة من الأعراض المعروفة باسم "متلازمة السيربروتونين"

التي تشمل الأعراض التي يذكرها في القسم ٦.

المتلازمة الخبيثة للدواء المذكورة أدناه.

على الرغم من أنها قد تحدث إلا أنها قد تؤدي إلى الوفاة؛ اتصل

بطبيبك على الفور، لأن أكستين يحتاج إلى التوقف.

إذا كنت مصاب بالهوس بالوقت الحالي أو في الماضي، اتصل

بطبيبك على الفور لأن أكستين يحتاج إلى التوقف.

إذا سبقت أكستين من أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التوقف.