

BEVACOL®

DESCRIPTION

BEVACOL est le nom commercial de Chlorhydrate de Mébévérine, un médicament antispasmodique.

Chaque Comprimé Enrobé de **BEVACOL 135** contient 135 mg de Chlorhydrate de Mébévérine.

COMPOSITION CHIMIQUE

Chlorhydrate de Mébévérine est le : Diméthoxy-3,4 benzoate de [N-éthyl (méthoxy-4 phényl)-2 méthyl-1 éthylamino]-4 butyl, acide chlorhydrique.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Mébévérine est un antispasmodique musculotrope qui a une action directe sur le muscle lisse du tractus gastro-intestinal, en soulageant les spasmes sans affecter la motilité normal de l'intestin. Mébévérine n'a pas d'effets secondaires anticholinergiques car son action n'est pas dirigée par le système nerveux central autonome, pour cela Mébévérine est convenable pour les patients avec une hypertrophie prostatique et glaucome.

Mébévérine est rapidement et complètement absorbé après administration orale. Il est hydrolysé dans le foie et une grande partie est éliminée dans l'urine. Une faible partie est excrétée dans la bile. Mébévérine est totalement éliminé au bout de 24 heures.

INDICATIONS

- **BEVACOL** est indiqué dans le traitement symptomatique de la douleur abdominale et malaise liés au syndrome d'intestin irritable.
- Le traitement du spasme gastro-intestinale secondaire aux maladies organiques.

Note

Mébévérine est convenable pour les patients avec une hypertrophie prostatique et glaucome parce qu'il manque atropine-comme des effets.

POSOLOGIE

Adultes et enfants sur 10 ans

Un Comprimé de **BEVACOL 135** trois fois par jour, apporté approximativement 20 minutes avant les repas.

EFFETS INDESIRABLES

Rarement : Nausée, vertige, céphalée et réactions allergiques (notamment éruption, urticaire, et œdème de Quincke).

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE

Aucun effet embryotoxique ou tératogène n'a été indiqué lors des expérimentations animales avec Mébévérine. Cependant, en absence des données cliniques humaines, le risque n'est pas connu. Par prudence, il convient d'éviter l'utilisation de ce médicament pendant le premier trimestre de grossesse si c'est possible.

UTILISATION PENDANT L'ALLAITEMENT

Mébévérine n'est pas excrété dans le lait maternel après des Doses thérapeutiques. Néanmoins, en absence d'études adéquates, à éviter pendant l'allaitement.

INTERFERENCE AVEC LES TESTS CLINIQUES ET LABORATOIRES

Non documenté.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Non connu.

CONTRE INDICATIONS

- ☐ Hypersensibilité au Mébévérine.
- ☐ Iléus paralytique.

MISE EN GARDE

Non documenté.

SURDOSAGE

En cas de surdosage, les expérimentations animales laissent prévoir une hyperexcitabilité du système nerveux centrale.

Il n'y a pas d'antidote spécifique pour Mébévérine. Un lavage gastrique et un traitement symptomatique sont recommandés en cas de surdosage.

PRECAUTIONS

Mébévérine devrait être évité dans la porphyrie.

PRESENTATION

TABLEAU C

- ☐ Boîtes de 48 comprimés sous blister de **BEVACOL 135** Reg. No. 19/00
 - ☐ Boîtes de 32 comprimés sous blister de **BEVACOL 135** Reg. No. 19/00
 - ☐ Conditionnements pour usage hospitalier de différentes présentations.
- Conserver conformément aux conditions spécifiées sur le conditionnement.
Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le conditionnement.



CECI EST UN MEDICAMENT



- ☐ Un médicament est un produit qui affecte votre santé et toute consommation non conforme aux instructions présente des dangers.
- ☐ Suivez strictement les recommandations de votre médecin, le mode d'emploi et les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament.
- ☐ Le médecin et le pharmacien sont des experts en matière de médecine.
- ☐ N'interrompez pas, de vous-même, la durée du traitement qui vous a été prescrit.
- ☐ Ne renouvelez pas la même ordonnance sans consulter votre médecin.
- ☐ Gardez les médicaments hors de portée des enfants.

Issu en Novembre 2003

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE
SYNDICAT DES PHARMACIENS ARABES

Des informations sur la prescription disponibles sur demande



LA COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE JORDANIENNE, Cie Anonyme (J.P.M.)
B.P. 94, NAOR 11710, JORDANIE