

فارماتون كيدى شراب

اقرأ هذه النشرة بعناية. هذه النشرة تحتوى على معلومات هامة. لقد حصلت على هذا الدواء إما بناء على وصفة طبية لاستعمالك الشخصى أو من الصيدلى بدون وصفة طبية. لذا، كي تحصل على الفائدة القصوى من هذا

الدواء يجب أن تتناوله كما هو موصوفى فى هذه النشرة أو كما نصحك طبيبك أو الصيدلى الذى تتعامل معه. احتفظ بهذه النشرة إذ أنك قد ترغب فى قرائتها مرة أخرى أو الرجوع إليها فى وقت لاحق.

الخواص ودواعى الاستعمال

يحتوى فارماتون كيدى شراب على فيتامينات، ومعادن ولايسين. لايسين هو حمض امينى أساسى، و هو ذو أهمية لتكوين العظام بالإضافة الى وظائفه الأخرى. ترد تقارير كثيرة عن نقص إمداد الحمض الامينى لايسين عند الأطفال. إن الوجبة الغير متوازنة او الناقصة قد لا تمد الطفل بكل احتياجاته من الفيتامينات والمعادن. بالنسبة للأطفال والمراهقين فإن فارماتون كيدى شراب يغطى الإحتياج المتزايد للفيتامينات و الحمض الامينى الأساسى لايسين فى فترة النمو وفى حالة فقدان الشهية، النقاها، التعب البدنى وكذلك فهو يقوى المناعة والاداء والتركيز.

ملحوظة

إن الوجبة المناسبة و المتنوعة هى الوسيلة الأكثر أهمية لمنع. بقدر الإمكان. نقص الفيتامينات والمعادن والعناصر النادرة. يناسب فارماتون كيدى شراب مرضى داء السكرى (تحتوى ١٥ ملل شراب على ٣,٦ جرام من الكربوهيدرات. تعادل ٣٦,٠ وحدة كربوهيدرات).

موانع الاستعمال

يمنع استعمال فارماتون كيدى شراب فى الحالات التالية:
- اضطراب أيض الكالسيوم، مثل زيادة الكالسيوم بالدم أو البول
- زيادة مستوى فيتامين د بالجسم.
- قصور وظائف الكلى
- فى فترة العلاج بفيتامين د
- فى حالة تواجد فينيل كيتون بالبول
- فى حالة وجود حساسية معروفة لأى من مكونات المستحضر.

إحتياجات

يجب عدم تناول فارماتون كيدى شراب بجرعات أعلى من الجرعة الموصوفة و لفترة طويلة إلا تحت رعاية طبية. تحتوى ١٥ مليلتر من فارماتون كيدى شراب على ٣,٧٥ جرام سوربيتول. يجب عدم اعطاء هذا المستحضر للأطفال والمراهقين المصابين بمشاكل وراثية نادرة فى عدم تحمل الفركتوز. يجب إبلاغ طبيبك أو الصيدلى الذى صرف لك الدواء إذا:
- كنت تعانى من امراض أخرى.
- كانت لديك حساسية
- كنت تتناول أدوية أخرى (بما فيها الادوية التى اشتريتها بنفسك ويدون وصفة طبية).

الحمل والإرضاع

فارماتون كيدى شراب مخصص للأطفال والمراهقين. بناء على التجربة المكتسبة حتى الآن مع المستحضر. لا يوجد خطر على الجنين إذا تم تناول الدواء بالجرعة الموصى بها. ولكنه لم يتم عمل أبحاث علمية بهذا الشأن. على سبيل الحذر، يجب الإبتعاد عن تعاطى الأدوية فى فترة الحمل والأرضاع أو عليك طلب النصيحة من طبيبك أو الصيدلى الذى صرف لك الدواء.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الأطفال من ١ الى ٥ سنوات: ٧,٥ مليلتر يومياً. الأطفال أكثر من ٦ سنوات والمراهقين: ١٥ مليلتر يومياً تقاس جرعة الشراب بالمليلتر بواسطة الكأس العياريّة المتاحة. يجب أخذ فارماتون كيدى شراب قبل الإفطار. ويمكن أيضاً تخفيفه بالمياه أو خلطه بالطعام. فارماتون كيدى شراب له طعم البرتقال وذلك بسبب وجود نكهة البرتقال بالمستحضر. التزم بالجرعة الموصوفة بالنشرة الداخلية أو التى وصفها لك الطبيب. إذا شعرت أن مفعول الدواء أقل أو أكثر من المتوقع، يجب أن ترجع الى الطبيب أو الصيدلى الذى صرف لك الدواء.

الأثار الجانبية

لم تلاحظ حتى الآن أية أثار جانبية للدواء. إذا لاحظت أية أثار جانبية، عليك إبلاغ طبيبك أو الصيدلى الذى صرف لك الدواء.

ملحوظة عامة

اللون الأصفر بالبول بعد تناول فارماتون كيدى شراب يرجع الى وجود فيتامين ب٢ (لون الطبيعى للمادة) وهو غير ضار. قد يظهر فارماتون كيدى شراب بعض العكارة الطبيعية وذلك بسبب بعض السواغ ولكن هذا لا يؤثر على فعاليته. رج العبوة جيداً قبل الاستعمال. يجب استعمال المستحضر فى خلال ٣٠ يوم من فتح العبوة. يحفظ فارماتون كيدى شراب فى درجة حرارة الغرفة (١٥° - ٢٥° مئوية) وبعيداً عن متناول الأطفال. يجب عدم استعمال المستحضر بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية والمُددون على العبوة بـ «EXP». يمكنك الحصول على معلومات إضافية من طبيبك أو الصيدلى الذى صرف لك الدواء.

التركيب

١٥ مليلتر شراب تحتوى على:
المواد الفعالة:
هيدروكلوريد اللايسين ٣٠٠,٠ ملجم

فيتامين ب١ هيدروكلوريد ٣,٠ ملجم
فيتامين ب٢ فوسفات
صوديوم ٣,٥ ملجم
فيتامين ب٦ هيدروكلوريد ٦,٠ ملجم
فيتامين د٣ ٤٠٠ وحدة دولية
فيتامين و ١٥,٠ ملجم
نيكوتيناميد (PP) ٢٠,٠ ملجم
ديكسانثينول ١٠,٠ ملجم
كالسيوم ١٣٠,٠ ملجم
السواغ:
مواد حافظة: سوربات البوتاسيم (E202)، بنزوات الصوديوم (E211)، بنزيل الكحول. مكسبات طعم: فانيلين مواد تحلية: سوربيتول، اسبارتام وسواغ أخرى

العبوة:

بالصيدليات ومخازن الأدوية بدون وصفة طبية. زجاجة بها ٢٠٠ مليلتر. تمت آخر مراجعة هذه النشرة بواسطة السلطات السويسرية لتنظيم الأدوية (سويس ميديك) فى أبريل ٢٠٠٤ (سويس ميديك) فى أبريل ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠

تم التصنيع بواسطة جنيسا - شركة مساهمة، بروجيو - سويسرا لصالح بورنجر لجهازم العالمية، شركة مساهمة، ألمانيا (بتمريع من فارماتون، شركة مساهمة)