

Pharmaton® kiddi SIROP

Propriétés et indications

Pharmaton Kiddi Sirup contient des vitamines, des sels minéraux et de la lysine.

La lysine est un acide aminé essentiel qui joue entre autre un rôle important dans l'ostéogénése.

La carence la plus fréquente en acides aminés chez l'enfant concerne la lysine. A la suite d'une alimentation mal équilibrée ou parentéllique, les apports pour toutes ces substances ne peuvent pas toujours être assurés.

Pharmaton Kiddi Sirup est utilisé comme reconstituant pour les enfants et les adolescents durant la croissance, en cas de manque d'appétit, pendant la convalescence, dans les états de fatigue corporelle ainsi que pour augmenter la résistance aux maladies infectieuses, pour améliorer l'efficience et la capacité de concentration.

Note

Une alimentation suffisante et variée est le meilleur moyen de prévenir dans une large mesure les carences en vitamines, en sels minéraux et en oligoéléments.

Pharmaton Kiddi Sirup convient

aux diabétiques (15 ml de sirup contiennent 3.6 g d'hydrates de carbone, correspondant à 0.36 UP).

Contra indications

Pharmaton Kiddi Sirup ne doit pas être pris en cas de

- troubles du métabolisme calciques tels que taux sanguin de calcium élevé ou excrétion urinaire élevée de calcium
- hypervitaminose D
- phénylcétonurie
- troubles rénaux
- traitement avec d'autres préparations contenant de la vitamine D
- hypersensibilité connue envers l'un de ses composants.

Précautions

Il ne faut pas prendre Pharmaton Kiddi Sirup à des doses supérieures à celles recommandées pendant une période prolongée, sauf recommandation expresse du médecin. 15 ml de Pharmaton Kiddi Sirup contiennent 2.6 g de sorbitol. Les enfants et les adolescents intolérants au fructose, ne doivent pas prendre ce produit.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre drapiste si

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic) les mois de avril 2004.

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice,

veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Grossesse et allaitement

Pharmaton Kiddi Sirup est destiné aux enfants et aux adolescents. Sur la base des expériences faites jusqu'à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu, si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Emploi et posologie

Enfants de 1 à 5 ans: 7,5 ml par jour. Enfants à partir de 6 ans et adolescents: 15 ml par jour. Doser les millilitres (ml) de sirop avec la mesure jointe à l'emballage. Prendre Pharmaton Kiddi Sirup de préférence avec le petit déjeuner. Pharmaton Kiddi Sirup peut aussi être dilué avec de l'eau ou mélangé à de la nourriture. Le goût est dû à l'arôme orange.

Veuillez vous conformer au dosage figurant dans cette notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou à votre droguiste.

Effets secondaires

Aucun effet secondaire n'a été constaté à ce jour. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Notice générale

Suite à la prise de Pharmaton Kiddi Sirup, l'urine peut prendre une coloration jaune, qui est due à la présence de la vitamine B2 (couleur naturelle de la substance) et ne représente aucun danger. En raison de certains excipients qu'il contient, le sirop peut être légèrement trouble, ce qui n'en diminue pas l'efficacité. Bien agiter avant l'emploi. Une fois ouvert le contenu du flacon doit être utilisé au plus tard dans les 30 jours suivants. Conserver le sirop à température ambiante (15-25°C) et hors de la portée des enfants. Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Composition

15 ml de Pharmaton Kiddi Sirup contiennent:

Principes actifs

Lysine hydrochloride	300.0 mg
Vitamin B1 hydrochloride	3.0 mg
Vitamin B2 phosphaté sodique	3.5 mg
Vitamin B6 hydrochloride	6.0 mg
Vitamin D3 400 UI	400 UI
Vitamin E acétate	15.0 mg
Nicotinamide (PP)	20.0 mg
Dexpanthénol	10.0 mg
Calcium	130.0 mg

Excipients:

Agents de conservation: sorbate de potassium (E 202), benzoate de sodium (E 211); alcool benzyllique; arôme: vanilline; édulcorants: sorbitol, aspartame et autres excipients.

Présentations

En pharmacie et en droguerie sans ordonnance médicale.

Flacons de 100 ml et 200 ml de sirop

Fabriqué par Ginsana SA,
Bioggio - Suisse
pour Boehringer Ingelheim
International GmbH, Allemagne
(sous licence de Pharmaton SA)