

Tylenol®

Suppositoires 100 mg/200 mg/350 mg
Pour enfants, contre la fièvre et les douleurs.

Composition

Suppositoires à 100 mg, 200 mg et 350 mg de paracétamol.

Propriétés

La substance du TYLENOL qui calme la douleur et fait tomber la fièvre est le N-acétyl-p-aminophénol (paracétamol, acétaminophène).

Son activité calmante et fébrifuge correspond à celle de l'acide acétylsalicylique. En revanche, il est mieux toléré et provoque moins d'effets secondaires que cette substance.

Le TYLENOL est généralement bien toléré. Des effets secondaires tels que réactions allergiques ou dérangements de l'estomac et de l'intestin n'ont été que très rarement observés.

Indications

Le TYLENOL convient aux bébés et aux enfants dont le traitement exige un abaissement de la fièvre et une diminution de la douleur, p.ex.:

- inflammation des amygdales
- maux de tête
- réactions aux vaccins
- refroidissements
- douleurs musculaires
- opération des amygdales
- grippe

Contre-indications

Aucune connue

Mesures de précaution

Les personnes abusant chroniquement de l'alcool en grandes quantités peuvent présenter un risque accru de toxicité hépatique d'un excès de paracétamol, bien que les rapports d'un tel incident soient rares. Ils font généralement mention de cas de graves alcooliques chroniques, les doses de paracétamol sont souvent supérieures aux doses recommandées, et il s'agit souvent même d'intoxications. Les professionnels doivent prévenir ceux de leurs patients qui consomment régulièrement d'importantes quantités d'alcool de ne pas aller au-delà des doses recommandées pour paracétamol.

Comme c'est le cas pour toute médication, un contrôle médical régulier s'avère nécessaire lors d'affections hépatiques ou rénales graves.

Mode d'emploi

L'administration des suppositoires TYLENOL aux enfants de moins de 3 mois ne devrait être faite que sur ordonnance médicale. Il en va de même pour les enfants de tout âge lorsque le traitement dure plus de 10 jours.

Les suppositoires de TYLENOL se liquéfient ou se ramollissent à une température de plus de 35°C. Dans tel cas, un bref refroidissement sous l'eau froide courante les rend à nouveau utilisables. La qualité des suppositoires n'est ainsi pas modifiée.

Posologie

(sauf avis contraire du médecin)

Enfants au-dessous de 3 mois
selon ordonnance médicale

	3 à 6 mois
2 - 3 x 1	supp. 100 mg par jour
	6 à 12 mois
3 - 4 x 1	supp. 100 mg par jour
	1 à 3 ans
2 - 3 x 1	supp. 200 mg par jour
	3 à 6 ans
3 - 4 x 1	supp. 200 mg par jour
	au-dessus de 6 ans
2 - 4 x 1	supp. 350 mg par jour

Emballages

Boîte de 10 suppositoires à 100 mg Paracétamol

Boîte de 10 suppositoires à 200 mg Paracétamol

Boîte de 10 suppositoires à 350 mg Paracétamol

«Avant l'application conserver au réfrigérateur pendant 30 minutes.»

CILAG SA
Schaffhouse
Suisse

