

فستيل

أقراص مغلفة / قطرات

مضاد الهيستامين، مانع للحكة، مضاد للحساسية

ما هو فستيل ومتى يستخدم؟

فستيل يبطئ آثار الهيستامين، والهيستامين مادة تبتعث أثناء تفاعلات الحساسية. يستخدم فستيل لعلاج أعراض الحكة وحالات تهيج الجلد التي تسبب فيها تفاعلات الحساسية، كما يقلل من التورم المصاحب للحساسية (تراكمات السوائل المرضية في الجلد أو في الأغشية المخاطية) ويزيل أعراض التهابات الأنفية مثل جريان الأنف وتدمع العينين والعطاس.

ويوصف فستيل للحالات التالية:

- حالات حساسية الجلد : الحكة الناتجة عن العديد من الأسباب الأخرى (عدا الحكة الناتجة عن اليرقان)، والأكزيما وحالات أخرى تسبب حكة الجلد والأرتيكاريا والحكة المصاحبة للأمراض التي ينتج عنها طفح جلدي و/ أو بقع كالتي يتسبب فيها الجدرى الكاذب (العنقز) ولسعة الحشرات.
- حالات الحساسية التي تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي: حمى الكلاً والتهابات الأنفية الأخرى.
- علاج أعراض حساسية الغذاء والعقاقير الطبية.

قيود الاستعمال

يجب عدم استعمال فستيل إذا كنت تعاني من فرط الحساسية لأي من مكونات الدواء كما ينبغي من استخدامه للأطفال أقل من عمر شهر وخاصة الأطفال الخدج.

ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استعمال فستيل:

- يجب إخطار الطبيب أو الصيدلاني في الحالات التالية:
 - إذا كنت تعاني من الجلوكوما أو الاحتباس البولي (تضخم البروستاتا على سبيل المثال) أو مرض الرئة الانسدادي المزمن أو أي حالات أخرى.
 - إذا كنت تعاني من الحساسية وخاصة ضد العقاقير الطبية.
 - إذا كنت تستعمل مضادات الاكتئاب الحلقيّة الثلاثية ومضادات إفراز الكولين (عقاقير تستخدم لتشنجات البطن والمعدة) ومخمدات الجهاز العصبي المركزي (مثل الأدوية المهدئة أو المنومة) أو الأدوية الأخرى ذات الاستخدام الداخلي أو الخارجي بما في ذلك الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية.
- استعمال أقراص أو قطرات فستيل ممتدة المفعول قد تؤدي إلي ضعف في التركيز، لذا يجب توخي الحذر عند قيادة السيارة أو أداء أعمال تتطلب تركيزاً عالياً مثل تشغيل المكنائن، وكأي من مضادات الهيستامين، قد يزيد فستيل من تأثير الكحول.
- القطرة : يجب استشارة الطبيب قبل استخدام فستيل لمعالجة الأطفال دون 12 شهراً.

هل يمكن استعمال فستيل أثناء الحمل أو الرضاعة؟

ينبغي عدم استعمال فستيل أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة بالثدي ما لم يقر الطبيب بوصفه لك.

الجرعة وإرشادات الاستعمال:

للبالغين و الأطفال فوق ١٢ سنة.

القطرات (المج/مل) : ٤٠-٢٠ مرات في اليوم.

الأقراص المغلفة (١مجم) : ١-٢ مرات في اليوم.

الأطفال: الجرعة اليومية للأطفال عمر شهر إلي ١٢ سنة.

العمر	نقاط ١ مجم / مل
من عمر ١ شهر إلي ١ سنة	من ٣ إلي ١٠ نقاط ثلاث مرات يومياً.
من عمر ١ سنة إلي ٣ سنوات	من ١٠ إلي ١٥ نقطة ثلاث مرات يومياً.
من عمر ٣ إلي ١٢ سنة	من ١٥ إلي ٢٠ نقطة ثلاث مرات يومياً.

والطبيب وحده يستطيع تحديد الجرعة القصوى.

لا تتحمل قطرة فستيل درجات الحرارة المرتفعة، لذلك توضع النقاط في رضاعة الطفل الدافئة في آخر دقيقة قبل الإرضاع، أما إذا بدأ الطفل تناول الطعام بواسطة الملعقة، فيتم إعطاء النقاط بدون مزجها بالسوائل في ملعقة القهوة حيث أن لعلمها مقبول. اتبع بدقة طريقة الاستعمال المنصوص عليها ووصفة الطبيب، وإذا رأيت بأن أن الهواء ضعيف أو قوي جداً، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

ما هي الآثار الجانبية لفستيل؟

قد يتسبب فستيل في الآثار الجانبية الثانوية التالية:

لوحظ بعض حالات الشعور بالنوم، خاصة في بداية العلاج، كما سجلت أيضاً حالات جفاف الفم والحلق ولوحظ أيضاً في بعض الأحيان حالات غثيان وتهيج ودوار وصدا. وفي بعض الحالات الاستثنائية عند ظهور طفح جلدي و/ أو الانتفاخ ينبغي إيقاف العلاج بفستيل فوراً واستشارة الطبيب أو الصيدلاني. وإذا لاحظت أي أعراض جانبية غير التي تم الإشارة إليها في هذه النشرة قم بطالع الطبيب أو الصيدلاني عليها.

ما هي المحاذير الأخرى؟

- أحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
- تحفظ أقراص فستيل بعيداً عن تأثير الضوء ولا يخزن عند درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.
- تحفظ قطرة فستيل بعيداً عن تأثير الضوء كما تحفظ الزجاجات داخل الغلاف الكرتوني عند حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية.
- لا تستخدم الدواء بعد انتهاء تاريخ صلاحيته المبين على العبوة (EXP). والعديد من المعلومات يوصي باستشارة الطبيب أو الصيدلاني حيث تتوفر لديهم معلومات مفصلة.

ماذا يحتوي عقار فستيل؟

يحتوي قرص فستيل ١ ملجم على مادة داياميندين ماليات. ١ مل من قطرة فستيل يحتوي على ١ ملجم من مادة داياميندين ماليات، نكهة وسكرينات الصوديوم، مادة حافظة: حامض البينزويك (E210)، وجليكول البروبيلين ومواد أخرى.

أين يمكن الحصول على فستيل؟ وما هي العبوات المتوفرة في السوق؟

يتوفر في الصيدليات بدون وصفة من الطبيب.

الأقراص: عبوة سعة ٢٠ قرص مغلف.

القطرات: ٢٠ و ٥٠ مل

قد لا تتوفر جميع العبوات في جميع الدول المسوق بها المستحضر.

القطرات : المصنع وصاحب التصريح:

نوفارتس للعناية بالصحة أس آيه، نيون ، سويسرا

الأقراص: صنعت من قبل: نوفارتس فارماسوتيكاس إس. آيه باربيرا، أسبانيا لصالح

شركة نوفارتس للعناية بالصحة، اس آيه، نيون ، سويسرا

تاريخ تحديث المعلومات

أكتوبر (تشرين أول) ٢٠٠٨

(إن هذا دواء)

أ- الدواء عبارة عن منتج يؤثر على صحته، واستعماله يعكس ما أوصى به الطبيب خبيراً على حياته.

ب- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام ونصحة الصيدلي الذي باعك الدواء.

ج- الطبيب والصيدلي خبراء في العلاج وبفوائده ومخاطره.

د- لا تقطع فترة تناول العلاج المقررة من تلقاء نفسك.

هـ- لا تكرر نفس الوصفة بدون استشارة الطبيب.

أحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب