

# فنستيل

نقط

الجرعة بالنقاط	الجرعة باللليلي جرام	الجرعة باللليلي جرام	العمر/الوزن
١٠٣ نقاط ثلاثة مرات في اليوم	٥٠-٥٠،٥٠ ملجم ثلاث مرات في اليوم	٥٠-٥٠،٥٠ شهري واحد إلى عام واحد / كجم	١٥-٤٥،٥ مرات في اليوم
١٠١٠ نقاط ثلاثة مرات في اليوم	٧٥-٧٥،٥ ملجم ثلاث مرات في اليوم	٢٢،٥-١٥،٥ كجم	٣-١٠ أيام
٢٠١٥ نقاط ثلاثة مرات في اليوم	٧٥ ملجم ثلاث مرات في اليوم	٣٠٢٠،٥-٣٠٢٠ كجم	١٢-٣ عاًماً

٢٠ نقطة = ١ ملجم من دميتيندين ماليات.

١ نقطه =

٠٥٠ ملجم من دميتيندين ماليات.

لا يمكن لدواء فنيستيل تحمل درجات الحرارة المرتفعة: لذا يرجى وضعه مباشرة قبل الإدخال في زجاجة رطافة دائمة، وإذا كان الطفل يأكل بالملعقة بالفعل، فيرجى إعطاء النقاط في ملعقة الشاي: فهذا هو أقصى حد.

لا يستعمل نقط عن طريق الفم لمدة أكثر من ١٤ يوماً دون استشارة الطبيب.

الجرعة المفرطة

من بين علامات الجرعة المفرطة مضادات الهيستامين وأعراضه ما يلي: تثبيط الجهاز العصبي المركزي تصاحبه دوراً محدداً مع الماء، مما يعيق امتصاص الماء، وآثار مضاد المسكرين (السيما مع الأطفال)، بما في ذلك الانتعاش وتشنج القلب وتسرع النزف والبرد والبرد والتشنجات التوتية أو الرمعية وتوسيع حدة العين وجفاف الفم واحمرار الوجه واحتباس البول والإصابة بالغثيان، وقد يصاب المريض فيما بعد بانخفاض ضغط الدم وبغيبوبة وهو يبوء في القلب والجهاز التنفس.

لا يوجد ترقيات محددة في حالة الجرعة المفرطة مضادات الهيستامين، يجب أن يكون العلاج متضمناً مع الأعراض السريرية

## ٥. الآثار الجانبية المحتملة:

تتضمن الآثار غير المرغوبية التفاعلي، لا سيما عند بدء العلاج، وقد تحدث تفاعلات حساسية في حالات نادرة جداً.

اضطرابات الجهاز المناعي المكتسبة مذكورة أدناه حسب تصنيف أعضاء أجهزة الجسم ومعدل التكرار.

نادرة جداً: تفاعلات المعاشرة المفرطة تتضمن وذمة في الوجه وفي البعوض وطفقاً جلدياً وتشنجات عضلية وضيق التنفس.

أfrequency افتراضات

نادرة: هياج

اضطرابات الجهاز العصبي

أثار شائعة: الغثيان، التعب

أثار شائع: التعبان، العصبية

أثار نادرة: معدان، دوار

اضطرابات الجهاز الهضمي:

أثار نادرة: اضطرابات الجهاز الهضمي، الغثيان، جفاف الفم/جفاف الحلق

التفاعل

رجاء من المتوقع أن يتسبب الاستخدام المتزامن لدواءين أو أكثر من الأدوية المشبطة للجهاز العصبي المركزي في زيادة ثبتبيته، وقد يكون لذلك عوّق غير مرغوب وبها وخطيرة على الحياة أيضاً.

وتحتمل الحالات وظائف المركبات الأفيونية ومضادات الصرع وأدوية الاكتئاب اللاسلية والهالات ومضادات الذهان ومضادات القلق والأدوية المؤلمة ودواء سكوبولامين والكموبيات.

قد يكون الأدوية الاكتئاب اللاسلية والهالات والأدوية المضادة للتشنجات في الجهاز الهضمي، الأدوية المؤلمة لحدقة العين، والأدوية المضادة للمسكرين في الملايين البولية مع الأدوية المضادة للهيستامين؛ مما يزيد من خطورة تفاقم الإصابة باليه الزقاء أو احتباس البول.

من أجل الحد من مخاطر الاصطدام الجهاز العصبي المركزي أو التقوية المحتملة، يجب توخي الحذر عند إعطاء البروكاربازين ومضادات الهيستامين في الوقت المناسب

٦. كيفية تخزين فنيستيل نقط

لا يحفظ عند درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

تُرجح الجماعة من الضوء

لا يحتفظ بالزجاجة في الغرفة الخارجية

لا تستخدم الدواء بعد انتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العبوة الخارجية

الدواء صالح حتى آخر يوم من شهر تاريخ انتهاء الصلاحية

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

حجم العبوة:

فنيستيل نقط: ٢٠ مل

صاع من قبلي:

جي اس كيه كونسومر هيلث كير اس إيه أر إل نيون، سويسرا.

الشركة المالكة لحق التسويق: جي اس كيه كونسومر هيلث كير سويسرا، تاريخ المراجعة يونيو ٢٠٢١، GDS version ٢٠٨١، توفر SmPC ٢٠٨١.

العلامة التجارية مملوكة / مرجحة لشركة جي اس كيه.

هذه الدواء

أ. الدواء عبارة عن منتج يُؤثر على صحتك واستخدامه خالقاً للتعليمات يعرضك للخطر.

ب. اتبع وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باع لك الدواء بنته الدقة.

ج. الطبيب والصيدلي هما أهل الخبرة بالدواء وفوائده ومحاذيره

د. لا تقطع فترة العلاج دون استشارة الطبيب.

هـ. لا تكرر العلاج دون استشارة الطبيب.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ونطاق رؤيتهم.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب

لاستعمال عن طريق الفم فقط

يرجى قراءة هذه النشرة بالكامل ويعلن قبل بدء استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على

معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احرص دائمًا على استخدام فنيستيل نقط على هذه النشرة أو حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

- توجه للحادي على أي آثار جانبية، أغير الطبيب أو الصيدلي، وذلك يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مدروجة في هذه النشرة.

- يجب التحدث إلى الطبيب إذا تم تحسين حالتك أو ساءت أعراض المرض.

في هذه النشرة:

١. على ميحيوني فنيستيل نقط؟

٢. ما هو فنيستيل نقط وما هي دواعي استعماله؟

٣. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام فنيستيل نقط؟

٤. كيفية تخزين فنيستيل نقط؟

٥. على ما يحوي فنيستيل نقط؟

٦. يحتوي ١ مل (٢٠ نقط) من دواء فنيستيل نقط على ١ ملجم من دميتيندين ماليات

كمادة فعالة.

المادة الأضافية: جليكون البروبيلين، فوسفات الديصوديوم دوديكابرارات، موتهيدرات

حامض الستيريك، حمض البنزويك، إيديتات الديصوديوم، ساكرين الصوديوم، ماء مقطر.

٧. ما هو فنيستيل نقط وما هي دواعي استعماله؟

٨. يُستخدم دواء فنيستيل نقط لعلاج أعراض اضطرابات المعاشرة الشَّرِقيَّة، وحساسية الجهاز

التنفسي الشَّعْبِيَّ مثل حمى القش والتباين الأنف غير الموسمي والحساسية من الأطعمة ومن المنتج الدوائي.

- الإحساس بحكمة جلدية من أصول مختلفة، باستثناء حكة الجلد الناجمة عن ركود

المفراة،

- الإحساس بحكمة جلدية في أمراض الفطح الجلدي، مثل الجدرى ولدغات الحشرات.

يُستخدم الدواء كحلق مساعد في حالات الإلزها وغيرة منها من الأمراض الجلدية الأخرى التي تسبب الحكة والتي ترجع إلى الحساسية.

٩. ما تحتاج إلى معرفة قبل استخدام فنيستيل نقط؟

أ. يرجى تجنب استعمال فنيستيل نقط في الحالات التالية:

الحساسية المفرطة من المادة المغذية، الديميتيندين ماليات، أو أي من المواد الأضافية المذكورة أعلاه.

- الأطفال الرضع الذين تقل عمرهم عن شهر واحد، لا سيما الأطفال الخدج.

ب. التضيُّعات والاحتياطات:

كما هو الحال مع مضادات الهيستامين، يوصي توخي الحذر في حالة الاستعمال مع المرضى

المصابين باليه الزقاء أو بآنساد من المثانة (بروستاتا) على سبيل المثال) ومرض

الإنسداد الرئوي المزمن.

يُنصح توخي الحذر عند الاستعمال مع مرضي الصدر مع مرضي الصدر مع مرضي الصدر مع مرضي الصدر.

مضادات الهيستامين قد تسبب تهيج في الأطفال الصغار والمربي لاستخدامه في الأطفال.

المغارف على عمر شهر إلى سنة واحدة ويعود توخي الحذر في حالة استعمال أي مضاد

لليستامين مع الأطفال الرضع الأقل من عمر واحد: فقد يصاحب المرض توقف

النفس في أثناء النوم.

ينبغي توخي الحذر عند الاستعمال مع الأطفال الرضع ما بين شهر واحد وعام واحد سوي

باستهارة طفلي وبالإشارة الطبية الدقيقة للعلاج بمضادات الهيستامين، وينبغي عدم تجاوز

الجرعات الموصى بها.

الاستخدام بحذر في المرضى المسنين، وهذه الفتة العمروية هي أكثر عرضة لارداد الفعل

السلبية مثل الهايج والتعصب، وينبغي تجنب استخدامها في المرضى المسنين الخطأ يجب عدم

تجاوز الجرعة الموصى بها ومرة الاستخدام دون موافقة الطبيب

ج. العمل والرضاة الطبيعية

من المنطق توخي إمكانية إفراز الديميتيندين في لدئن، لذا لا يوصى باستعمال فنيستيل في

أثناء الرضاة الطبيعية.

هـ.قيادة والاسخدام الماكينات

ويambil مع مضادات الهيستامين الأخرى، قد يؤدي دواء فنيستيل إلى التقليل من القدرة

الذهنية مع بعض المرض، لذا ينصح توخي الحذر في أثناء القيادة أو تشغيل الماكينات أو

أداء المهام الأخرى التي تستدعي الانتباه.

٤. كيفية استعمال فنيستيل نقط

البالغون والمراهقون فوق ١٢ عاماً:

تبليغ الجرعة اليومية الموصى بها بين ٣ و٦ ملجم إلى ٦ ملجم من مادة الديميتيندين ماليات في

اليوم، مُقسمة إلى ٣ جرعات؛ وهذا يعادل ما يلي:

نقطة ١ ملجم: ١٠-٢٠ ملجم: ٣-٤٠ ملجم: ٣ مرات في اليوم.

يوصى مع المرض المعزز للشعر بالعناس وصف، ٤ نقطه قبل الخلود إلى النوم، و٥ نقطه في الصباح عند الإفطار.

مـ. مع الأطفال:

تبليغ الجرعة اليومية الموصى بها، ١ ملجم لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم (وهذا

يعادل نقطتين من كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم، مُقسمة إلى ٢ جرعات).

ينبغي عدم استخدام دواء فنيستيل مع الأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين شهر

إلى عام واحد إلا وفقاً لتوصيات الطبيب، وبالإشارة الطبية الموصى بها.

ينبغي توخي الحذر في استخدام نقطه مع الأطفال الأقل من عام واحد. وقد يصاحب

تأثير المهدئ نوبات توقف التنفس في أثناء النوم.

ومن ثم تصبح الجرعات اليومية الموصى بها للأطفال للأطفال الأقل من عمر شهر واحد إلى ١٢ عاماً.

وبحسب وزن الجسم، على النحو التالي: