

Venoruton® 300 ۳۰۰ فینوروتون

کبسولات

علاج الاضطرابات الوريدية

الخصائص/الاستعمال للمعالجة

ماهو Venoruton 300 وماهي دواعي استعماله؟

يحتوي فينوروتون 300 ٣٠٠ Venoruton على مادة أروثو (بيتا - هيدروكسي أثيل) - روتوسيد O-(β-hydroxyethyl)-rutoside التي تساعد على استعادة الوظائف العادية لأصفر الأوعية الدموية، والأوعية الشعرية. عن طريق زيادة مقاومة جدار الوعاء الشعري وتخفيض التنفذية.

وعند المرضى الذين يعانون من الدوالي وبعض الاضطرابات الأخرى في أوردية الساقين، تفقد هذه الأوعية الصغيرة كميات كبيرة من الماء، مما يؤدي إلى تورم الكاحلين. ويعمل Venoruton 300 على تقليل التورم وتخفيف الأعراض المرتبطة به بالصورة عامة، مثل المصع والشعور بالألم والثقيل والتعب في الساقين. وبالإضافة استعمال Venoruton 300 كذلك للباسور وفقاً لمشورة الطبيب. وفي حالة اللباسور، يؤدي Venoruton 300 إلى تخفيف سريع ودائم لاحتمان الطريقة المخاطية في الشرح، وتخفيف بعض الأعراض كالوجع والنز والحكة والتنف.

معلومات إضافية

ماذا يجب أن أعرف أيضاً؟

من أجل تخفيف أعراض الدوالي، من المفيد أن ترفع رجليك في فترات متكررة أثناء النهار إذا أمكن ذلك، وأن ترفع مستوى القدمين عن السرير. كما أن من المستحسن ارتداء ملابس مطاطية (وهي عادة الجوارب).

موانع الاستعمال

متى يجب عليّ أن أمتنع عن استعمال Venoruton 300؟

يجب أن لا تستعمل Venoruton 300 إذا كانت لديك حساسية ضد المكون النشيط O-(β-hydroxyethyl)-rutoside أو ضد أي مواد مماثلة أو أي من المواد الأخرى ضمن تركيبة المستحضر. لا تستعمل Venoruton 300 خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. وسيعلم طبيبك ما الذي ينبغي عمله في هذه الحالة.

التدابير الوقائية

ما هي التدابير الوقائية التي يجب أن نتخذها عند استعمال **Venoruton 300** ؟

استشر طبيبك إذا استمرت أو إذا تفاقمَت الأعراض قبل استعمال **Venoruton 300** مع بلاغ الطبيب إذا كنت تشكو من أي نوع من الأمراض الالتهابية، وخاصة إذا. كانت لديك حساسية ضد أدوية أخرى، أو إذا كنت تتناول أصلاً أية أدوية أخرى (بما في ذلك الأدوية التي تأخذها من دون وصفة طبية).

الحمل/الإرضاع

هل يمكن استعمال **Venoruton 300** أثناء فترة الحمل أو الإرضاع؟
إذا كنت حاملاً أو مرضعاً فيجب ألا تستخدمى Venoruton 300 بدون
استشارة طبيبك يجب أن لا تستعمليه في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل.
إذا كنت حاملاً، أو تنوين الحمل والإرضاع فاستشيري طبيبك قبل
استعمال Venoruton 300

الجرعة/طريقة الاستعمال

کیف یتیم استعمال Venoruton 300 ؟

المعالجة المكثفة الأولية

يتم تناول كبسولة واحدة من Venoruton 300 ثلاث مرات في اليوم أثناء وجبات الطعام. وتخف الأعراض بصورة عامة خلال أسبوعين.

ويمكن عندئذ وقف العلاج (ويستمر التحسن عادة لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع بعد توقف العلاج) وبالإمكان استئنائه بمجرد ظهور الأعراض من جديد، ونفس الجرعة المذكورة أعلاه، أو يمكن متابعة العلاج كما يلي:

المعالجة الداعمة

إن الحد الأدنى للجرعة الداعمة هو ٦٠٠ ملليغرام في اليوم، أي كبسولة واحدة من Venoruton 300 مرتين في اليوم.

ينبغي أن تتناول الكبسولات أثناء وجبات الطعام وأن تحافظ على مستوى الجدة المذكورة في هذه النشرة أو التي يصفها لك الطبيب. وإذا شعرت بأن فاعلية الدواء ليست كافية، أو أنها أقوى من اللازم، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

الأطفال والمراهقين:

لم يتم اختبار مأمونية استخدام Venoruton 300 للأطفال والمراهقين.

المضاعفات الجانبية

ما هي المضاعفات الجانبية لدواء Venoruton 300؟

Venoruton 300 يمكن أن يسبب الأعراض الجانبية التالية:

نادرة الحدوث: اضطرابات معوية، تطبل، اسهال، ألم في البطن والمعدة، مشاكل هضمية، تفتق أو احمرار في الجلد، أرثيكايريا.

أعراض نادرة الحدوث للغاية:

دوار، صداع، إرهاق، احمرار، تفاعلات تحسسية قد تؤدي إلى تفاعلات وعائية أو كروب تنفسية.

لملاحظت أي من الأعراض المذكورة أعلاه أخبر طبيبك أو الصيدلي فوراً

ملاحظات خاصة

ماذا يجب عليّ أن أعرف أيضاً؟

عليك أن تستشير طبيبك.

جاف لا تزيد حرارته على ٣٠ درجة مئوية.

ويجب أن لا يُستعمل الدواء بعد التاريخ المبيّن على العلبة بجانب كلمة: EXP. وإذا كنت بحاجة لأية معلومات إضافية، استشر الطبيب أو الصيدلي، إذ أن لديهما معلومات مفصلة يتم إرسالها للاختصاصيين في المجال الطبي.

التركيب

يحتوي الكبسولة الواحدة من Venoruton 300 على ٣٠٠ ملليغرام من مادة O-(β-hydroxyethyl)-rutoside كما تحتوي على أسوغه (مواد مضافة لتجعل الدواء سائفاً).

كيفية عرض الدواء

تحتوي العلبة على ٢٠ أو ٥٠ كبسولة

نوفارتیس کونسیومر هیلث ش م نیون — سویسرا

تاريخ المراجعة الأخيرة للمعلومات

غبرایر / شباط ۲۰۰۸

