

قيود الاستعمال

نواهي الاستعمال

فرط الحساسية لأي من المكونات.

لا يستعمل الفينيل إفرين، شأنه شأن المواد الأخرى القابضة للأوعية، في حالات التهاب الأنف الالتهابي البسيط، والتهاب الأنف الالتهابي الموسمي المصحوب بإفرازات كريمة الرائحة (رائحة النفس الكريهة)، وفي المرضى الذين يتعاطون مثبطات أكسيداز أحادي الأمين أو الذين كانوا يتعاطون هذه العقاقير في الأسبوعين السابقين.

احتياطات

لا يستعمل فيروسيل بصورة متواصلة لمدة تزيد على أسبوع. أما إذا استمرت الأعراض، فإنه ينبغي استشارة الطبيب. وقد يؤدي الاستعمال الطويل أو الزائد إلى تسرع الماعة أو احتقان ارتدادي أو التهاب أنفي مستحيط بالدواء.

وكما هو الحال في جميع العقاقير الموضعية القابضة للأوعية، لا يجوز تجاوز الجرعة الموصوفة، ولا سيما بالنسبة إلى الرضع وصغار الأطفال والمسنين: إذ قد يؤدي الإفراط في الاستعمال إلى ظهور عيوب جهازية وخاصة بالنسبة إلى صغار الأطفال والمسنين.

ويجب كذلك تجنب استعمال جرعات زائدة في حالات ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض القلبية الوعائية الأخرى، أو فرط الدرقية أو الغلوكوما (الرُّق) الضيقة الزاوية.

وكما هو الحال في جميع المنتجات الموضعية القابضة للأوعية، يتعين الحذر في استعمال فيروسيل في حالات التفاعلات المفرطة لتشبهات السميتاوي، التي تظهر في شكل أرق أو دوخة. تستعمل نقط الأنف للرضع وصغار الأطفال دون 6 سنوات.

الحمل والإرضاع بالثدي

لا تتوفر دراسات في الحوامل أو المرضعات أو الحيوانات. ولذلك ينبغي ألا يستعمل فيروسيل إلا في حالات الضرورة القصوى.

الأثار الجانبية غير المرغوبة

قد يلاحظ في حالات نادرة إحساس موضعي مؤقت بلسعة أو جفاف في الأنف.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

كما هو الحال في جميع العقاقير القابضة للأوعية، يمنع استعمال الفينيل إفرين في المرضى الذين يعالجون بمثبطات أكسيداز أحادي الأمين أو الذين كانوا يعالجون بها في الأسبوعين السابقين. وينبغي الحذر عند تعاطي مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات أو مضادات ارتفاع ضغط الدم، من قبيل حاصرات بيتا.

فرط الجرعة

لم يسفر تعاطي فيروسيل بشكل عارض بواسطة صغار الأطفال عن أي آثار جانبية خطيرة مطلقاً.

وكانت غالبية الحالات بدون أعراض، غير أنه سجلت أحياناً حالات إحساس بالتعب، أو ألم بالبلعده، أو تسرع طفيف في ضربات القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو تهيج، أو أرق، أو شحوب. ولا يوجد ترياق محدد في حالة زيادة الجرعة في حالة استعمال مضاد للهيستامين مع عقار قابض للأوعية ولا يقتضي الأمر غسيل للمعدة عادة، حتى بعد ابتلاع محتويات قارورة كاملة (15مل).

ويمكن وصف إعطاء فحم منشط وربما عقار ملين في حالة زيادة الجرعة لدى صغار الأطفال. أما في حالة الأطفال الأكبر سناً (فوق 6 سنوات) والبالغين فإنه يكفي عادة شرب كمية كبيرة من السوائل.

ملاحظات أخرى

التخزين

يحفظ بعيداً عن تأثير الحرارة (يحفظ في درجة أقل من 30°س) الا في حالة رذاذ الأنف: 10مل (يحفظ في درجة أقل من 25°س) لا يستخدم الدواء بعد انقضاء فترة صلاحيته <EXP> المبينة على العبوة.

العبوات

نقط الأنف: 15مل، رذاذ الأنف: 10مل، رشاش الجرعات الصغيرة: 15مل، هلام الأنف: 12غم.

نوفارتيس كونسيومر ش.م
نيون، سويسرا.

تاريخ تحديث المعلومات: أكتوبر/تشرين الأول 2003

التركيب

نقط الأنف، رذاذ الأنف، رشاش الجرعات الصغيرة
المواد الفعالة: مالمات داياميندين 0.25، ملغم، فنيل إفرين 2.5 ملغم. مادة عطرية، مادة حافظة: كلوريد بنزالكونيوم، سواغ حتى 1مل من المحلول.

هلام الأنف

المواد الفعالة: مالمات داياميندين 0.25، ملغم، فنيل إفرين 2.5 ملغم. مادة عطرية، مادة حافظة: كلوريد بنزالكونيوم، سواغ حتى 1غم من الهلام.

الخواص والتأثيرات

فيروسيل يجلي الأنف ويجفف الإفرازات مع المحافظة على أداء الأهداب الهزازة والأغشية المخاطية في الأنف.

والفينيل إفرين مركب أميني شبيه بالسيميتاوي. ويفضل تأثيره الانتقائي في المستقبلات الأدرينالية التنبية α_1 في الأنسجة الوريدية الكهفية في أنسجة الأنف المخاطية، فهو قابض خفيف للأوعية يجلي الفراغات الأنفية بسرعة وبلدة طويلة.

أما مالمات داياميندين، فهي مركب مضاد للهيستامين يؤثر في مستقبلات H_1 ، وهو مضاد للحساسية يتسم بالفعالية في الجرعات الصغيرة ودرجة تحمله جيدة.

حرائك الدواء

هذا الدواء يؤثر تأثيراً موضعياً، ولا يرتبط نشاطه بتركيز مكوناته الفعالة في الدم.

دواعي الاستعمال والاستخدام العلاجي

نزلات البرد، التهابات الأنف الحادة والمزمنة، التهاب الأنف الموسمي (حى الكلا) والتهاب الأنف غير الموسمي الناتج عن الحساسية، التهابات الجيوب الأنفية الحادة والمزمنة، الرعاية قبل العمليات الجراحية وبعدها، علاج مساعد في حالات التهاب الأذن الوسطى.

وهلام فيروسيل مفيد بوجه خاص في حالات جفاف الأنسجة المخاطية للأنف، وفي حالات تكوّن قشور أو بعد الرضوح الأنفية للإجراء التجاوي الأنفية أثناء الليل.

الجرعة وإرشادات الاستعمال

نقط الأنف

بعد التمشط جيداً، توضع بضع نقط في كل منخر 3 إلى 4 مرات يومياً. الأطفال من 1 إلى 6 سنوات: نقطة واحدة أو نقطتان. الأطفال فوق 6 سنوات والبالغون: 3-4 نقط. يفضل وضع النقط أثناء الجلوس. وتعال الرأس إلى الوراء فور الاستعمال للمساعدة في تخلل الدواء.

رذاذ الأنف

الأطفال فوق 6 سنوات والبالغون: بعد التمشط جيداً يرش الرذاذ رشة واحدة أو رشتين في كل منخر 3-4 مرات في اليوم. يُمسك الرشاش رأسياً، يُدخل طرف الرشاش في المنخر ويُغلق الطرف الآخر. يُضغظ على الخزان بقوة، ويسحب الطرف من المنخر في كل مرة بدون تحفيف الضغط.

رشاش الجرعات الصغيرة

الأطفال فوق 6 سنوات والبالغون: رشة أو رشتان في كل منخر 3-4 مرات في اليوم (تعطي الرشة الواحدة 140 ملغم في المتوسط).

تتبع الخطوات التالية:

- 1- تمسخت جيداً
- 2- إنزع غطاء الرشاش قبل الاستعمال الأول: شغل مكبس الرشاش عدة مرات لتحضير الرذاذ. وبعدها يصبح الرشاش جاهزاً للاستعمال مباشرة.
- 3- أدخل الرشاش في أحد المنخرين واضغط عليه مع استنشاق الدواء داخل الأنف في الوقت نفسه. تكرر هذه العملية في المنخر الآخر.
- 4- أعد وضع غطاء الرشاش.



إنزع غطاء الرشاش
اسك الرشاش بالطريقة المبينة في الشكل تماماً. اضغط مع الاستنشاق في الوقت نفسه.

هلام الأنف

الأطفال فوق 6 سنوات والبالغون: بعد التمشط جيداً، يوضع هلام فيروسيل في عمق المنخر بقدر الإمكان، 3-4 مرات في اليوم. ويساعد استعمال الهلام قبل النوم في إجلاء مسالك الأنف ليلاً.

(إن هذا دواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالة العرب