



سينيكود

شراب

١٥ ٪ وزن/حجم شراب

للتناول عن طريق الفم فقط

التركيب:

- يحتوي كل ٥ مل من شراب سينيكوند على:
المادة الفعالة: ٧,٥ ملجم بوتاميرات سترات
المواد الإضافية ذات التأثير المعروف: محلول سوربيتول (E-420) ٧٠ ٪، إيثانول ٩٦ ٪
المواد الإضافية الأخرى: جليسيرول، وساكرين
الصوديوم، وحمض البنزويك (E210)، ورائحة الفانيليا
وهيدروكسيد الصوديوم (لضبط pH) وماء مقطر

- يرجى قراءة جميع محتويات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.
- احرص دائماً على استخدام هذا الدواء بالضبط كما هو موضح في هذه النشرة أو بالطريقة التي أخبرك بها الطبيب أو الصيدلي.
- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- توجه للصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة.
- في حالة حدوث أي آثار جانبية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي.
- وذلك يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة

- ما هو شراب سينيكوند وما هي دواعي استخدامه؟
- ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام شراب سينيكوند؟
- كيف يُستخدم شراب سينيكوند؟
- الآثار الجانبية المحتملة
- كيف تُخزن شراب سينيكوند؟
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. ما هو شراب سينيكوند وما هي دواعي استخدامه؟

* يستخدم لعلاج أعراض السعال ذات المصادر المختلفة

- شراب سينيكوند يسكن السعال، بما في ذلك السعال الغير مصاحب للبلغم، الناجم عن نزلات البرد. ويمكن أيضاً استخدام شراب سينيكوند لعلاج نوبات السعال الحادة متعددة الأسباب بوصفة طبية فقط.
- يمكن استخدام سينيكوند شراب للأطفال من عمر ٣ سنوات وأكثر.
- * يجب أخذ الاتي بالاعتبار:
 - التدخين يجعلك تُسعل، لذا بإمكانك دعم تأثير شراب سينيكوند عن طريق الإقلاع عن التدخين.
 - نظراً لأن الشراب مُحلي بالسكربين والسوربيتول، فيمكن أيضاً تناوله لدى المصابين بداء السكري.

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام شراب سينيكوند؟

أ. تجنب استخدام سينيكوند شراب في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة بوتاميرات سترات أو تجاه أي من المواد الإضافية المعطاة وفقاً للتركيب.
- تعاني أنت أو طفلك من مرض وراثي (نادر) المعروف بالحساسية المفرطة للفركتوز، مما يؤثر على التمثيل الغذائي للسكر. ونظراً لأن الشراب مُحلي، فإنه يحتوي على سوربيتول، وهو سكر ينتج الفركتوز عند هضمه.

ب. التحذيرات والاحتياطات

- إذا كان السعال لديك أو لدى طفلك مصحوباً ببلغم، أي أنه ينتج كمية كبيرة من المخاط، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول شراب سينيكوند. يعمل شراب سينيكوند على إخماد منعكس السعال، الذي يعزز تراكم المخاط داخل الأنابيب القصصية. مما يزيد من خطورة عدوى المسالك التنفسية (مثل الالتهاب الرئوي) وقد يؤدي هذا أيضاً إلى تقلص خطير في الأنابيب القصصية (التشنج القصبي). وبالتالي يجب عليك عدم تناول أية أدوية للسعال من شأنها تقليل لزوجة المخاط في الأنابيب القصصية (الأدوية الطاردة للبلغم والأدوية المذيبة للبلغم) في نفس الوقت الذي تتناول فيه شراب سينيكوند.
- يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة استمرار السعال لأكثر من ٧ أيام أو إذا ساءت الأعراض وأ/أو صاحبها ارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور طلع جلدي أو صداع مستمر، فيجب استشارة طبيب لتحديد وجود حالة مرضية أساسية إذا لزم الأمر.
- يحتوي شراب سينيكوند على ٢٨٤ ملجم من السوربيتول في كل مل. السوربيتول هو مصدر للفركتوز. ويجب على المرضى الذين يعانون من مرض وراثي نادر المعروف بالحساسية المفرطة للفركتوز عدم تناول هذا الدواء. قد يسبب السوربيتول اضطرابات الجهاز الهضمي ويكون له تأثير ملين.
- يحتوي شراب سينيكوند على إيثانول (١١,٧٣ ملجم/٥ مل).
- يحتوي نقط سينيكوند على أقل من ١ مل مول صوديوم (٢٣ ملجم) في الجرعة، مما يعني أنه تقريباً خالي من الصوديوم
- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت أنت أو طفلك تعانيان من أي أمراض أخرى، أو حساسية أو إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان أي أدوية أخرى تستخدمانها خارجياً (. بما في ذلك تلك التي يتم تناولها دون وصفة طبية)
- يجب أن يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق

ج. تناول الأدوية الأخرى:

يجب تناول أي دواء طارد للبلغم أو منيب للبلغم بشكل مصاحب لهذا الدواء (انظر «التحذيرات والاحتياطات الخاصة بالاستخدام»).

لا تتوفر دراسات محددة بشأن التفاعلات. وبناءً على اعتبارات أساسية، لا يمكن استبعاد احتمالية زيادة تأثير المواد المثبطة للجهاز العصبي المركزي والتي يتم تناولها تزامنياً مع هذا الدواء، بما في ذلك الكحول حيث يُعتقد أن آلية عمل كبت السعال تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

د. الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملاً أو ترضعين طبيعياً، فيجب عدم تناول شراب سينيكوند خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. لم يتم تقييم سلامة الاستخدام أثناء الحمل والرضاعة في دراسات محددة.

الحمل

ينبغي تجنب استخدام شراب سينيكوند خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وقد أظهرت الدراسات الإنجابية على الحيوانات عدم وجود أي خطر على الجنين. إلا أنه لم يتم إجراء أي دراسات خاضعة للمراقبة على النساء الحوامل. وبالتالي لا يوصى بتناول شراب

سينيكود خلال فترة الحمل إلا عند الضرورة بشكل واضح بناءً على استشارة الطبيب.

الرضاعة

لم تتم دراسة مرور سينيكوند في حليب الثدي، لذا ينبغي عدم استخدام المنتج خلال الرضاعة الطبيعية.

هـ. القيادة واستخدام الآلات

يمكن لشراب سينيكوند أن يسبب التعب، وقد يؤثر على القيادة وتشغيل الآلات. يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق.

٣. كيف يُستخدم شراب سينيكوند؟

ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك:

يستخدم سينيكوند شراب للأطفال من عمر ٣ سنوات وأكثر

الفئة العمرية	الجرعة الموصى بها
الأطفال من ٣ إلى ٦ سنوات	٥ مل ٣ مرات يومياً
الأطفال من ٦ إلى ١٢ سنوات	١٠ مل ٣ مرات يومياً
المراهقون من سن ١٢ إلى ١٨ عاماً	١٥ مل ٣ مرات يومياً
البالغون	١٥ مل ٤ مرات يومياً

- قم بمعايرة الشراب باستخدام المكيال المُدرج المرفق بالدواء.
- قم بشطف وتجفيف المكيال المُدرج بعد كل استعمال وقبل أن تستخدمه شخص آخر.
- للتناول عن طريق الفم فقط
- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها
- يبلغ الحد الأقصى لمدة العلاج دون وصفة طبية ٧ أيام
- يفضل تناوله قبل الوجبات.
- إذا تناول طفلك كمية زائدة من شراب سينيكوند، فأخبر الطبيب على الفور
- ينبغي استخدام أقل جرعة فعالة ولأقصر وقت ممكن.
- احرص دائماً على إعطاء الجرعة وفقاً لهذه النشرة أو على النحو الذي يحدده الطبيب. إذا كنت تعتقد أن تأثير هذا الدواء ضعيف للغاية أو قوى للغاية. تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.

تجاوز الجرعة

يمكن لتجاوز الجرعة من شراب سينيكوند بشكل عارض أن يتسبب في الأعراض التالية: النعاس، والغثيان، والتقيؤ، والإسهال، وفقدان التوازن، وانخفاض ضغط الدم. ويجب تقديم المساعدة الطارئة المعتادة: غسيل المعدة، الفحم المنشط، والمراقبة، والعلاج اللازم للوظائف الحيوية. لا يوجد ترياق محدد معروف. يتم علاج الجرعة الزائدة حسب الحالة السريرية، وإذا لزم الأمر، بعد استشارة مركز مكافحة السموم القومي، حيثما أمكن.

٤. الآثار الجانبية المحتملة:

قد يؤدي استخدام شراب سينيكوند إلى الآثار الجانبية التالية:

اضطرابات الجهاز العصبي: غير شائع (١,٠ ٪ إلى ١,٠ ٪): دوار ونعاس ودوخة خفيفة.
اضطرابات الجهاز الهضمي: غير شائع (١,٠ ٪ إلى ١,٠ ٪): غثيان وإسهال.

الجلد: نادر (٠,٠١ ٪ إلى ١,٠ ٪): الطفح، الشرى.

إذا لاحظت آثاراً جانبية غير موصوفة هنا، فيجب إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٥. كيف تُخزن شراب سينيكوند؟

- يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
- لا يخزن في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية يجب حمايته من الحرارة.
- لا تستخدم الدواء بعد أنتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العبوة الخارجية والمملصق الداخلي.
- الدواء صالح حتى آخر يوم من شهر تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. العبوة والمعلومات الأخرى:

شراب سينيكوند شراب مُحلي شفاف عديم اللون برائحة الفانيليا

العبوة ٢٠٠ مل

يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات

صنع من قبل: جي أس كي كونسيومر هيلث كير أس إيه آر إل ، نيون سويسرا.

الشركة المالكة لحق التسويق: جي أس كي كونسيومر هيلث كير شوايز آيه جي سويسرا.

العلامات التجارية مملوكة أو مرخصة لصالح جي أس كيه

تاريخ المراجعة : يونيو ٢٠٢٠

GDS v1.0 dated July2018

SmpC date of revision August 2019

هذا الدواء

- هذا الدواء عبارة عن منتج يؤثر على صحتك واستخدامه خلافاً للتعليمات يُعرضك للخطر.
- اتبع وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي صرف الدواء بدقة.
- الطبيب والصيدلي هما أهل خبرة بالدواء وفوائده ومخاطره.
- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر العلاج دون استشارة الطبيب.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب