

التركيب:
يحتوي كل ١ مل (= ٢٢ نقط) من سينيكود على:

المادة الفعالة: ١ ملجم بوتاميرات سيترات
المواد الإضافية ذات التأثير المعروف: حمول سوربيتول ٧٠٪ (E-420)، إيثانول ٩٦٪
المواد الإضافية الأخرى: جلسرين، وساكارين الصوديوم، حمض البترونيك (E-210) (مادة حافظة)، ورائحة الفانيليا، وهيدروكسيد الصوديوم بنسبة ٣٪، وماء مقطر

يرجى قراءة جميع تحذيرات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.
احرص دائماً على استخدام هذا الدواء بالضغط كما هو موضح في هذه النشرة أو بالطريقة التي أشرح بها الطبيب أو الصيدلي.
- استحق هذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

- توجه للتصديق إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة.
- في حالة حدوث أي آثار جانبية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي. وذلك يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

١. ما هي نقط سينيكود وما دواعي استخدامها؟
٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام نقط سينيكود؟
٣. كيف تُستخدم نقط سينيكود؟
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيف تُحزن نقط سينيكود؟
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

* ما هي نقط سينيكود وما دواعي استخدامها؟

* تُستخدم لعلاج أعراض السعال ذات المصادر المختلفة

نقط سينيكود تسكن السعال، بما في ذلك السعال الغير مصاحب للبلغم، الناجم عن نزلات البرد. ويمكن أيضاً استخدام نقط سينيكود لعلاج نوبات السعال الحادة متعددة الأسباب بوصفة طبية فقط. يمكن استخدام نقط سينيكود بوصفة طبية مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وأكثر، ونظراً للمحتوى المنخفض للمادة الفعالة، فإنه غير مناسب للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن ١٦ عاماً.

* يجب أخذ الآتي بالاعتبار:

- نظراً لأن نقط الفم سينيكود مُحلي بالساكرين والسوربيتول، فيمكن أيضاً إعطاؤها للأطفال المصابين بداء السكري

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام نقط سينيكود؟

أ. تجنب استخدام نقط سينيكود في الحالات التالية:

- يعاني طفلك من حساسية تجاه مادة بوتاميرات سيترات أو تجاه أي من المواد الإضافية المعطاة وفقاً للترتيب
- يعاني طفلك الحساسية المفرطة للفركتوز (سبب محتوى السوربيتول، ينتج السكر الفركتوز أثناء تحوله للأضي)

ب. التحذيرات والتحذيرات

- إذا كان السعال لدى طفلك مصحوباً بالبلغم، بما في أنه ينتج كمية كبيرة من المخاط، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل إعطاء نقط سينيكود لطفلك. تعمل نقط سينيكود على إخماد منعكس السعال، الذي يعزز تراكم المخاط داخل الأنابيب القصبية. مما يزيد من خطورة عدوى المسالك التنفسية (مثل التهاب الرئوي) وقد يؤدي هذا أيضاً إلى تقلص خطير في الأنابيب القصبية (التشنج القصبي). وبالتالي يجب عدم إعطاء طفلك أية أدوية للسعال من شأنها تقليل لزوجة المخاط في الأنابيب القصبية (الأدوية الطاردة للبلغم والأدوية المنوية للبلغم) في نفس الوقت الذي تستخدم فيه نقط سينيكود بالنسبة للأطفال الأقل من سنتين، يجب عدم استخدام هذا الدواء إلا بوصفة من الطبيب
- يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة استمرار السعال لأكثر من ٧ أيام.
- تحتوي نقط سينيكود على سوربيتول (E-420). ويجب على المرضى الذين يعانون من مرض وراثي نادر يعرف بالحساسية المفرطة للفركتوز عدم تناول هذا الدواء.
- تحتوي نقط سينيكود على إيثانول (٢,٨١ جم/مل).
- أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان طفلك يعاني من أي أمراض أخرى، أو حساسية أو يتناول أي أدوية أخرى أو يستخدمها حالياً (عما في ذلك تلك التي يتم تناولها دون وصفة طبية)
- يجب أن يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق

ج. تناول الأدوية الأخرى:

يجب تجنب تناول أي دواء طارد للبلغم أو مذيّب للبلغم بشكل مصاحب لهذا الدواء (انظر «التحذيرات والأحذيات الخاصة بالاستخدام»).

لا تتوفر دراسات محددة بشأن التفاعلات. وبناءً على اعتبارات أساسية، لا يمكن استبعاد احتمالية زيادة تأثير المواد النشطة للجهاز العصبي المركزي والتي يتم تناولها تزامنياً مع هذا الدواء، بما في ذلك الكحول، حيث يُعتقد أن آلية عمل كبت السعال تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

د. الحمل والرضاعة الطبيعية والحصولية

تعد نقط سينيكود غير مناسبة لعلاج السعال لدى البالغين. إذا كنت حاملاً أو ترضعين طبيعياً، وقد تناولت هذا الدواء عن طريق الخطأ، فيجب إبلاغ الطبيب كإجراء احترازي

هـ. القيادة واستخدام الآلات

يمكن لنقط سينيكود أن تسبب التعب، وقد تؤثر على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات. يجب أن يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق.

٣. كيف تُستخدم نقط سينيكود؟

ما لم يذكر الطبيب خلاف ذلك:

ينبغي إعطاء نقط سينيكود للأطفال أقل من سنتين بناءً على وصفة طبية فقط.

الجرعة الموصى بها	الفئة العمرية
١٠ نقط ٤ مرات يومياً	الأطفال من عمر شهرين إلى سنة
١٥ نقطة ٤ مرات يومياً	الأطفال الصغار من سنة إلى ثلاث سنوات
٢٥ نقطة ٤ مرات يومياً	الأطفال أكبر من ٣ سنوات

- للتناول عن طريق الفم فقط

- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها

- يبلغ الحد الأقصى لمدة العلاج ٧ أيام

- يفضل تناوله قبل الوجبات.

- إذا تناول طفلك نقط زائدة من سينيكود، فأخبر طبيبك على الفور.

- حافظ دائماً على إعطاء الجرعة وفقاً لهذه النشرة أو على النحو الذي يحدده الطبيب. إذا كنت

تعتقد أن تأثير هذا الدواء ضعيف للغاية أو قوي للغاية، فتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.

تحذير الجرعة

يمكن لتجاوز الجرعة من نقط سينيكود بشكل عارض أن تسبب في الأعراض التالية: غثاس، وغثيان، وفيء وإسهال وفقدان التوازن وانخفاض ضغط الدم.

ويجب تقديم المساعدة الطارئة للعادة: غسيل المعدة، الفحم المنشط، والمراقبة والعلاج اللازم للوظائف الحيوية. لا يوجد ترياق محدد معروف.

٤. الآثار الجانبية المحتملة:

قد يؤدي استخدام نقط سينيكود إلى الآثار الجانبية التالية:

اضطرابات الجهاز العصبي: غير شائع (٠,١ - ١٪): دوام، وغثاس.

اضطرابات الجهاز الهضمي: غير شائع (٠,١ - ١٪): غثيان، وإسهال.

الجلد: نادر (٠,٠١ - ٠,١٪): طفح، وشرى.

إذا لاحظت آثاراً جانبية غير موصوفة هنا، فيجب إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٥. كيف تُحزن نقط سينيكود؟

- يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

- لا يتحرن في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية يجب حمايته من الحرارة

- لا يُستخدم البعد اقتضاء فترة صلاحيته «EXP» المبينة على العبوة

٦. العبوة والمعلومات الأخرى:

نقط سينيكود حلول على شفاف عديم اللون برائحة الفانيليا

العبوة ٢٠ مل

يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات



غرض التصنيع بواسطة:

نوفارتيس كونسويمير هيلث سا إيه،
نيون، سويسرا.

تاريخ المراجعة: مايو ٢٠١٦

الإصدار: ٢٦ يونيو ٢٠١٤ S١٢-01

هذا الدواء

أ. هذا الدواء عبارة عن منتج يؤثر على صحتك واستخدامه خلافاً للتعليمات يُعرضك للخطر.
ب. تبع وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي صرف الدواء بدقة.
ج. احتفظ بالصيدلي هذا أصل الخثرة بالدواء، ووقود الالتهاب ومخاطره.
د. لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
هـ. لا تكرر العلاج دون استشارة الطبيب.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدالوج العرب