

# سينيكود

نقط

٥٠٪ وزن/حجم نقط الهم (للطفال)

للتناول عن طريق الفم فقط

التركيب:

يحتوي كل ١ مل (= ٢٢ نقطة) من سينيكود على:

المادة الفعالة: ٥ ملجم بوتاميرات سيترات  
المواد الإضافية ذات التأثير المعروف: جلوسول ٧٠٪ (E-420)، إيثانول ٩٦٪  
المواد الإضافية الأخرى: جليسرول، وساكارين الصوديوم، حمض البنزويك (E-210) (مادة حافظة)، ورائحة الفانيليا، وهيدروكسيد الصوديوم بنسبة ٢٠٪، وماء مقطر

يرجى قراءة جميع تحذيرات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

احرص دائماً على استخدام هذا الدواء بالضبط كما هو موضح في هذه النشرة أو بالطريقة التي أخبرك بها الطبيب أو الصيدلي.

احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

– توجه للصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة.

– في حالة حدوث أي آثار جانبية، أخبر الطبيب أو الصيدلي. وذلك يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

١. ما هي نقط سينيكود وما دواعي استخدامها؟

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام نقط سينيكود؟

٣. كيف تستخدم نقط سينيكود؟

٤. الآثار الجانبية المحتملة

٥. كيف تخزن نقط سينيكود؟

٦. تحذيرات العيوب ومعلومات أخرى

\* ما هي نقط سينيكود وما دواعي استخدامها؟

١. تستخدم لعلاج أعراض السعال ذات المصادر المختلفة

نقط سينيكود تسكن السعال، بما في ذلك السعال الغير مصاحب للبلغم، الناجم عن نزلات البرد. ويمكن أيضاً استخدام نقط سينيكود لعلاج نوبات السعال الحادة متعددة الأسباب بوصفها طيبة فقط. يمكن استخدام نقط سينيكود بوصفها طيبة مع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين شهرين وأكبر. ونظراً للمحتوى المنخفض للمادة الفعالة، فإنه غير مناسب لمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن ١٧ عاماً.

\* يجب أخذ الآتي بالاعتبار:

نظراً لأن نقط الهم نقط سينيكود تحللى بالساكرين، والسيوريتول، فيمكن أيضاً إعطائها للأطفال المصابين بداء السكري

٢. ما الذي يحتاج إلى معرفته قبل استخدام نقط سينيكود؟

أ. تجنب استخدام نقط سينيكود في الحالات التالية:

– يعاني طفلك من حساسية تجاه مادة بوتاميرات سيترات أو تجاه أي من المواد الإضافية المغطاة وفقاً للتركيب  
– يعاني طفلك الحساسية المفرطة للفركتوز (بسبب محتوى السيوريتول)، ينتج السكر الفركتوز أثناء تحوله (الأيضي)

ب. التحذيرات والاحتياطات

– إذا كان السعال لدى طفلك مصحوباً بالبلغم، أي أنه ينتج كمية كبيرة من المخاط، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل إعطاء نقط سينيكود لطفلك. تعمل نقط سينيكود على إخماد منعكس السعال، الذي يعزز تراكم المخاط داخل الأنابيب القصية. مما يزيد من خطورة عدوى السعالك التنفسية (مثل الانتهاب الرئوي) وقد يؤدي هذا أيضاً إلى تقليل خطر في الأنابيب القصية (التهنق القصي). وبالتالي يجب عدم إعطاء نقط سينيكود لأدوية السعال من شأنها تقليل لزوجة المخاط في الأنابيب القصية (الأدوية المطردة للبلغم والأدوية اللدنية للبلغم) في نفس الوقت الذي تستخدم فيه نقط سينيكود بالنسبة للأطفال الأقل من سنتين، يجب عدم استخدام هذا الدواء إلا بوصفه من الطبيب  
– يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة استمرار السعال لأكثر من ٧ أيام إذا ساءت الأعراض وألوا صاحبها ارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور طلع جلدي أو صداع مستمر، فيجب استشارة طبيب لتحديد وجود حالة مرضية أساسية إذا لزم الأمر.  
– تحتوي ١٠ نقط من هذا الدواء على ٧١ ملجم من السيوريتول. ويجب على المرضى الذين يعانون من مرض وراثي نادر المعروف بالحساسية المفرطة للفركتوز عدم تناول هذا الدواء.  
– قد يسبب السيوريتول اضطراب لامتصاص فيتامينات الجوز الهضمي ويمكن له تأثير ملين.

– تحتوي نقط سينيكود على إيثانول (٢٨١ ملجم/١٠ مل)  
– يحتوي نقط سينيكود على أقل من ميليول صوديوم (٢٢ ملجم) في الجرعة مما يعني أنه تقريباً بدون صوديوم  
– أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان طفلك يعاني من أي أمراض أخرى، أو حساسية أو يتناول أي أدوية أخرى أو يستخدمها خارجياً (عما في ذلك تلك التي يتم تناولها دون وصفة طبية)  
– يجب أن يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق

ج. تناول الأدوية الأخرى:

يجب تجنب تناول أي دواء طارد للبلغم أو منيب للبلغم بشكل لهذا الدواء (انظر «التحذيرات والاحتياطات الخاصة بالاستخدام»).

لا تتوفر دراسات محددة بشأن التفاعلات. وبناءً على اعتبارات أساسية، لا يمكن استبعاد احتمالية زيادة تأثير المواد المنشطة للجهاز العصبي المركزي والتي يتم تناولها تزامنياً مع هذا الدواء، بما في ذلك الكحول، حيث يعتقد أن كمية أقل ثبتت السعال تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

د. الحمل والرضاعة الطبيعية والحسوبة

تعتمد نقط سينيكود غير مناسبة لعلاج السعال لدى البالغين. إذا كنت حاملاً أو ترضعين طبيعياً، وقد تولدت هذا الدواء عن طريق الخطأ، فيجب إبلاغ الطبيب كإجراء احترازي

هـ. القيادة واستخدام الآلات

يمكن لنقط سينيكود أن تسبب النعاس، وقد تؤثر على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات. يجب أن يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق.

٣. كيف تستخدم نقط سينيكود؟

ما لم يذكر الطبيب خلاف ذلك:

ينبغي إعطاء نقط سينيكود للأطفال أقل من سنتين بناءً على وصفة طبية فقط.

الجرعة الموصى بها	الفئة العمرية
١٠ نقط ٤ مرات يومياً	الأطفال من عمر شهرين إلى سنة
١٥ نقطة ٤ مرات يومياً	الأطفال الصغار من سنة إلى ثلاث سنوات
٢٥ نقطة ٤ مرات يومياً	الأطفال أكبر من ٣ سنوات

– للتناول عن طريق الفم فقط

– لا تتجاوز الجرعة الموصى بها

– يبلغ الحد الأقصى لمدة العلاج دون وصفة طبية ٧ أيام

– يفضل تناوله قبل الوجبات.

– ينبغي استخدام أقل جرعة فعالة ولأقصر وقت ممكن

– إذا تناول طفلك نقط زائدة من سينيكود، فأخبر طبيبك على الفور.

– احتفظ دائماً على إعطاء الجرعة وفقاً لهذه النشرة أو على النحو الذي يحدده الطبيب. إذا كنت تعتقد أن تأثير هذا الدواء ضعيف للغاية أو قوي للغاية، فتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.

تجاوز الجرعة

يمكن لتجاوز الجرعة من نقط سينيكود بشكل عارض أن يتسبب في الأعراض التالية: نعاس، وغثيان، وفي، وإسهال وفقدان التوازن وانخفاض ضغط الدم.

يجب تقديم المساعدة الطارئة المعتادة: غسيل المعدة، الفحم النشط، والمراقبة والعلاج اللازم للوظائف الحيوية. لا يوجد تفاعل محدد معروف.

يتم علاج الجرعة الزائدة حسب الحالة السريرية، وإذا لزم الأمر، بعد استشارة مركز مكافحة السموم القومي، حيثما أمكن.

٤. الآثار الجانبية المحتملة:

قد يؤدي استخدام نقط سينيكود إلى الآثار الجانبية التالية:

اضطرابات الجهاز العصبي: غير شائع (١٠-١٠٪): دوخة، نعاس ودوخة خفيفة  
اضطرابات الجهاز الهضمي: غير شائع (١٠-١٠٪): غثيان، وإسهال.

الجلد: نادر (١٠-١٠٪): طفح، وحرق.

إذا لاحظت آثاراً جانبية غير موصوفة هنا، فيجب إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٥. كيف تخزن نقط سينيكود؟

– يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

– لا يخزن في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية يجب حمايته من الحرارة

– لا تستخدم الدواء بعد انتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العبوة الخارجية والمصطب الداخلي  
الدواء صالح حتى آخر يوم من شهر تاريخ انتهاء الصلاحية

٦. العبوة والمعلومات الأخرى:

نقط سينيكود يحلوى محلى شفاف عديم اللون برائحة الفانيليا

العبوة ٢٠ مل

يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات

العلامات التجارية مملوكة أو مرخصة لصالح شركة جي أس كيه

صنع من قبل: جي أس كيه كونسويمير هيلث كير إيه إل، نيون سويسرا

الشركة المالكة لخلق التسويق: جي أس كيه كونسويمير هيلث كير شوايز إيه جي، سويسرا

تاريخ المراجعة: ديسمبر 2020  
GDS v1.0 dated July 2018  
SmpC date of revision August 2019

هذا الدواء

أ. هذا الدواء عبارة عن منتج بترى صحتك واستخدامه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.  
ب. اتبع وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي صرف الدواء بدقة.  
ج. الطبيب والصيدلي هما معاً الحرة الدواء، وهو اللد ومخاطره.  
د. لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.  
هـ. لا تكرر العلاج دون استشارة الطبيب.

يخفف بعداً عن متناول الأطفال.

لمجلس وزراء الصحة العرب  
لغاد الصيدالة العرب