

فينوروتون فورت Venoruton® forte أقراص

علاج الاضطرابات الوريدية

الخصائص/الاستعمال للمعالجة

ما هو Venoruton forte وما هي دواعي استعماله؟

يحتوي Venoruton forte على مادة أورثو – (بيتا – هيدروكسي إيثيل) – روتوسيد O-(β-hydroxyethyl)-rutoside التي تساعد على استعادة الوظائف العادية لأصغر الأوعية الدموية، والأوعية الشعرية. عن طريق زيادة مقاومة جدار الوعاء الشعري وتخفيض نفاذيته. وعند المرضى الذين يعانون من الدوالي وبعض الاضطرابات الأخرى في أوردة الساقين، تفقد هذه الأوعية الصغيرة كميات كبيرة من الماء، مما يؤدي إلى تورم الكاحلين. ويعمل Venoruton forte على تقليص التورم وتخفيف الأعراض المرتبطة به بصورة عامة، مثل المغص والشعور بالألم والتقل والتعب في الساقين. وبالإمكان استعمال forte Venoruton كذلك للباسور وفقاً لمشورة الطبيب. وفي حالة الباسور، يؤدي Venoruton forte إلى تخفيف سريع ودائم لاحتقان الطبقة المخاطية في الشرج، وتخفيف بعض الأعراض كالوجع والنز والحكة والنزف. كما يمكن استعمال المستحضر وفقاً لمشورة الطبيب في حال الشعور بالمضاعفات الجانبية التي تلي المعالجة بالأشعة، وهي بعض الحالات المرضية لشبكية العين (مثل اعتلال الشبكية السكري).

معلومات إضافية

ماذا يجب أن أعرف أيضاً؟

من أجل تخفيف أعراض الدوالي، من المفيد أن ترفع رجليك في فترات متكررة أثناء النهار إذا أمكن ذلك، وأن ترفع مستوى القدمين عن السرير. كما أن من المستحسن ارتداء ملبوسات مطاطية (وهي عادةً الجوارب).

موانع الاستعمال

متى يجب عليّ أن أمتنع عن استعمال Venoruton forte؟

يجب أن لا تستعمل Venoruton forte إذا كانت لديك حساسية ضد المكوّن النشط O-(β-hydroxyethyl)-rutoside أو ضد أي مواد ماثلة. وسيعلم طبيبك ما الذي ينبغي عمله في هذه الحالة.

التدابير الوقائية

ما هي التدابير الوقائية التي يجب أن أتخذها عند استعمال Venoruton forte؟

إذا التزمت بمعدل الجرعة الموصى بها، لن تكون هناك أي تدابير وقائية ينبغي عليك اتخاذها، ولكن قبل استعمال Venoruton forte قم بإبلاغ الطبيب إذا كنت تشكو من أي نوع من الأمراض الأخرى، وخاصة إذا كانت لديك حساسية ضد أدوية أخرى، أو إذا كنت تتناول أصلاً أية أدوية أخرى (عما في ذلك الأدوية التي تأخذها من دون وصفة طبيب).

الحمل/الإرضاع

هل يمكن استعمال Venoruton forte أثناء فترة الحمل أو الإرضاع؟

هناك قاعدة عامة تقضي بأن لا تتناولي أية أدوية أثناء فترة الحمل أو الإرضاع من دون أن تستشير طبيبك أولاً. وبالنسبة لدواء Venoruton forte يجب أن لا تستعمليه في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل. وإذا كان تناول Venoruton forte ضرورة لا بد منها، ينبغي أن لا تبدي تناوله حتى الشهر الرابع من الحمل. ولا حاجة لأية تدابير وقائية خاصة لكي تتخذ أثناء فترة الإرضاع.

الجرعة/طريقة الاستعمال

كيف يتم استعمال Venoruton forte؟

يتم تناول قرص واحد من Venoruton forte مرتين في اليوم أثناء وجبات الطعام. وتخف الأعراض بصورة عامة خلال أسبوعين. ومن المستحسن أن تحافظ على هذه الجرعة حتى تختفي الوذمة والأعراض بشكل تام. ويمكن عندئذ وقف العلاج (ويستمر التحسن عادة لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع بعد انتهاء العلاج) وبالإمكان استئنافه بمجرد ظهور الأعراض من جديد.

حافظ على مستوى الجرعة المذكورة في هذه النشرة أو التي يصفها لك الطبيب. وإذا شعرت بأن فاعلية الدواء ليست كافية، أو أنها أقوى من اللازم، قم باستشارة الطبيب.

وفي حال الخضوع للمعالجة الإشعاعية أو إذا كنت تشكو من مرض في شبكية العين، عليك باتباع نصيحة الطبيب.

المضاعفات الجانبية

ما هي المضاعفات الجانبية لدواء Venoruton forte؟

إن الأدوية الفعالة قد تسبب بعض المضاعفات الجانبية. وقد تم الإبلاغ في بعض المناسبات عن مضاعفات جانبية بسيطة (كالتفاعل الجلدي، والاضطرابات البسيطة في الجهاز الهضمي، والصداع وتورّد الوجه وحماؤتها). وتختفي هذه المضاعفات بسرعة بمجرد وقف العلاج.

ملاحظات خاصة

ماذا يجب عليّ أن أعرف أيضاً؟

إذا استمرت الأعراض المرضية بالرغم من استعمال Venoruton forte، يجب عليك أن تستشير طبيبك. وينبغي حفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال. ويحفظ هذا الدواء في مكان جاف لا تزيد حرارته على ٣٠ درجة مئوية. ويجب أن لا يُستعمل الدواء بعد الستاريخ المبيّن على العلبة بجانب كلمة: EXP.

وإذا كنت بحاجة لأية معلومات إضافية، استشر الطبيب أو الصيدلي، إذ أن لديهما معلومات مفصلة يتم إرسالها للاختصاصيين العاملين في المجال الطبيّ.

التركيب

يحتوي القرص الواحد من Venoruton forte على ٥٠٠ ملليغرام من مادة O-(β-hydroxyethyl)-rutoside كما يحتوي على أسوغة (مواد مضافة لتجعل الدواء سائغاً).

كيفية عرض الدواء

تحتوي العلبة على ٣٠ قرصاً.

نوفارتيس كونسيومر هيلث ش م نيون – سويسرا

تاريخ المراجعة الأخيرة للمعلومات

آب/أغسطس ١٩٩٨

NOVARTIS