

سبازمو-كانيولاز®

توليفة مضادة للتقلصات

التركيب

يحتوي القرص ذو الطبقتين:

المواد الفعالة:

الكتلة المركزية: سبازمو ٠.٩ ملغ و وحدة FIP، مسحوق بنكرياتين مكافئ أميلاز ٢١٠٠ وحدة أوروبية، لبياز ١٢٠٠ وحدة أوروبية، بروتياز ٨٠ وحدة أوروبية؛ دايامتكون ٢٠ ملغم؛ ديهيدروكولات الصوديوم ٢٠ ملغم. الطبقة الخارجية: هيدروكلوريد متيكتسين ١ ملغم؛ مسحوق بيبسين ١٢٠ وحدة أوروبية؛ دايامتكون ٢٠ ملغم؛ هيدروكلوريد حمض غلوتاميك ١٠٠ ملغم؛ سواغ. سواغ: مادة ملونة E ١٢٧.

الخواص والتأثيرات

تحتوي الطبقة الخارجية من القرص هيدروكلوريد متيكتسين، وهو مادة تخليقية تظل مفعول جاز العصب السمبثاوي وتبسط شدة الحركة المعدية المعوية؛ وهيدروكلوريد حمض الغلوتاميك الذي يطلق حمض الهيدروكلوريك في المعدة، والبيبتين وهو الأنزيم الرئيسي لحل البروتين في العصارة المعدية. وتحتوي الكتلة المركزية للقرص المواد الأخرى التالية: ديهيدروكولات الصوديوم التي تنشط إفراز الصفراء؛ والبنكرياتين الذي يحتوي أنزيمات هضم البروتينات والكربوهيدرات والدهون؛ وأنزيم السليولاز الذي يحلل السليولوز، ويقاوم التخمر البكتيري وتكوين الغازات في الأمعاء.

ويحتوي كل من الطبقة الخارجية والكتلة المركزية من القرص دايامتكون، وهو مادة نشيطة السطح ذات تأثير قوي مضاد للرغوة تمنع الانتفاخ.

حرائك الدواء

تتكون أقراص سبازمو-كانيولاز الثنائية الطبقات من طبقة خارجية تذوب بسرعة وكتلة مركزية تقاوم العصارة المعدية (أنظر التركيب). ويفضل هذا الأسلوب، تحدث مختلف المكونات تأثيرها العلاجي الكامل في المكان المطلوب بالضبط في القناة الهضمية حيث يكون تأثيرها ضرورياً. المتيكتسين: هيدروكلوريد المتيكتسين يمتص بالكامل تقريباً من القناة المعدية المعوية. وتصل ذروة التركيز في البلازما بعد ٤-٢ ساعات. ويستقلب المتيكتسين بسرعة وبالكامل؛ وهو يخرج عن طريق البراز بشكل خاص (نحو ٨٠٪)، وتخرج نسبة قليلة منه (٢٠٪ تقريباً) في البول، بصورة رئيسية في شكل نترات وكبريتات، وكبريتات ثنائية الميثيل، ومشتقات فينولية. ولم تكتشف أي نواتج استقلاب أكثر سمية أو نشاطاً من الناحية الدوائية من المتيكتسين نفسه. ونصف العمر في البلازما ٤-٦ ساعات، ويتم الإخراج بنسبة ٥٥-٧٠٪ خلال ٢٤ ساعة.

دواعي الاستعمال/طريقة الاستعمال

حالات تهيج القولون المصحوبة بانتفاخ، وإحساس بأوديماء، وآلم بطني منتشر شبيه بالمغص. الانتفاخ المصاحب لنقص الأنزيمات وبلغ الهواء بسبب التخمر أو التعفن. عسر الهضم نتيجة للاضطرابات الصفراوية والاضطرابات الهضمية العصبية المنشأ.

الجرعات/إرشادات الاستعمال

يبلغ قرص واحد كاملاً قبل كل أكلة. في حالة الآلم البطني الحاد يؤخذ قرصان معاً.

قيود الاستعمال

نواهي الاستعمال

فرط الحساسية لأي من المكونات.

(كما هو الحال في جميع مضادات إفراز الكولين): الغلوكوما الضيقة الزاوية. تضخم البروستاتا المصحوب باضطرابات التبول، استرخاء الأمعاء، شدة ضعف العضلات. انسداد القناة الصفراوية (مرض الصفراء الإسدادية)، الإلتهاب الكبدي الحاد، والاضطرابات الكبدية الوظيفية الأخرى، التجمع الصيدي في الحوصلة الصفراوية، الغيوبة الكبدية.

احتياطات

ليست هناك احتياطات معينة مطلوبة في حالة الاستعمال وفقاً للإرشادات.

الحمل، الإرضاع الطبيعي

لم تجر دراسات محكومة في الحيوانات أو الحوامل. وبالتالي، يجب ألا يستعمل الدواء إلا إذا كانت الفائدة المحتملة أكبر من الخطر المحتمل على الجنين. وغير معروف إذا كان الدواء ينتقل إلى لبن الأم.

الأثار الجانبية غير المرغوبة

قد تجر دراسات محكومة في الحيوانات أو الحوامل. وبالتالي، يجب ألا يستعمل الدواء إلا إذا كانت الفائدة المحتملة أكبر من الخطر المحتمل على الجنين. وغير معروف إذا كان الدواء ينتقل إلى لبن الأم.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

لم تسجل حتى الآن أي تفاعلات مع الأدوية الأخرى.

فرط الجرعة

تحدث الجرعات الزائدة تفاعلات سمية من النوع الأتروبيني. ولوحظت أيضاً زيادة الحركة المعوية والإخراج. وتزول هذه الأعراض بعد وقف العلاج.

ملاحظات أخرى

ملحوظة

الرائحة القوية نسبياً التي تتصف بها الأقراص طبيعية؛ ومنشؤها الأنزيمات الطبيعية التي يحتويها الدواء. ينبغي حفظ سبازمو-كانيولاز، شأنه شأن جميع الأدوية، بعيداً عن متناول الأطفال.

التخزين

لا يستعمل الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المبين على العلبة (EXP). يحزن دون ٢٥° س. يحفظ بعيداً عن الرطوبة والضوء.

العوات

عبوة بها ٢٠ قرصاً ذو طبقتين.

نوفارتيس كونسيومير هيلث ش م

نيون - سويسرا

تاريخ تحديث المعلومات: أبريل/نيسان ١٩٩٤

(ان هذا دواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدالة العرب

(THIS IS A MEDICAMENT)

- a. Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- b. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use, and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- c. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- d. Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- e. Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medication out of reach of children

Council of Arab Health Ministers

Union of Arab Pharmacists