

## إنسولاتارد®

١٠٠ وحدة دولية/مل

**معلق للحقن داخل زجاجة**

الإنسولين البشري (الحصص النووي الريبوزي الريبوسومي منزوع الأكسجين rDNA)

**يرجى قراءة هذه النشرة بكاملها بعناية قبل البدء في تناول الإنسولين**.

- انتظف يهذه النشرة، فرمًا نقاشاً لغرائزها مرة أخرى في وقت لاحق
- إذا كانت لديك استفسارات أخرى فتوجه بها إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.

• هذا الدواء مصنف، لك فقط لا تعطه لأي شخص آخر. فقد يسبب له ضرراً حتى إذا كان يعاني من نفس أعراض المرض لديك.

- لا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مفرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي.

### ١. ماهو إنسولاتارد® وماهي دواعي استخدامه

**إنسولاتارد® هو إنسولين بشري يستخدم لعلاج السكري.** إن داء السكري هو مرض لا يستطيع الجسم فيه إنتاج كمية من الإنسولين تكفي للتحكم في سكر الدم.
إنسولاتارد® هو إنسولين طويل المفعول. هذا يعني أنه يبدأ في خفض سكر الدم لديك بعد حوالي ساعة ونصف من تناوله، ويستمر مفعوله لمدة ٢6 ساعة تقريباً. عادة ما يتم إعطاء إنسولاتارد® مع منتجات إنسولين ذات مفعول سريع.

### ٢. قبل أن تستخدم إنسولاتارد®

لا تستخدم إنسولاتارد®

❖ في مضخات الإنسولين.

❖ إذا كنت تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) للإنسولين البشري أو أي

من مكونات إنسولاتارد® (انظر ٧ لمعلومات إضافية).

❖ إذا كنت تشفيته في يده نقص السكر في الدم (انظر ٤ ما الذي يجب فعله في الطوارئ).

❖ عند تشكل أو فقد الغطاء الواقي، خزني كل زجاجة على غطاء وافي محمي ضد التعرض. إذا كانت الزجاجة ليست في حالة جيدة عندما حصلت عليها، أعماها إلى الصيدلية.

❖ في حالة تخزين إنسولاتارد® بشكل غير صحيح أو جُمعيده (انظر ٤ كيفية تخزين إنسولاتارد®).

❖ إذا كان الإنسولين المتعاد جُويله **لمعلق** لايبدو **أبيض متجانس وغائم**.

### قبل استخدام إنسولاتارد®

❖ **الخصص الملصق** تتأكد من أن هذا هو نوع الإنسولين الصحيح.

❖ **انزع الغطاء الواقي**.

**توخّ أحرص بشكل خاص مع إنسولاتارد®:**

❖ **إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد**، أو في العدة الكظرية أو الخيمامية أو الدرقية.
❖ **إذا كنت تتناول الكحول**، انتبه لأعراض الهبوط. ولا تتناول الكحول مطلقاً على عده خابوية.
❖ **إذا كنت تمارس التمارين بشكل أكثر من المعتاد**، أو إذا كنت ترغب في تغيير نظامك الغذائي المعتاد، حيث أن هذا قد يؤثر على مستوى السكر في الدم لديك.

❖ **إذا كنت مريضاً**، يمكنك الإستمرار في تناول الإنسولين واستشر طبيبك.
❖ **إذا كنت مسافراً للخارج**، إلى مناطق زمنية يكن أن تؤثر على احتياجاك من الإنسولين وأوقات الحقن. استشر طبيبك إذا كنت تخطط لهذا النوع من السفر.

### استخدام أوعية أخرى

بعض الأوعية تؤثر على الطريقة التي يعمل بها الجلوكوز في الجسم، وقد يؤثر هذا على جرعة الإنسولين.
مدرج أدناه أهم الأوعية المشائعة التي يمكن أن تؤثر على العلاج بالإنسولين. أخبر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي إذا كنت تتناول في الوقت الحالي أو تناولت مؤخراً أي أوعية أخرى. ويضم ذلك الأوعية التي يتم الحصول عليها من وصفة طبية، ويوجه خاص. ينبغي عليك إخبار طبيبك إذا كنت تستخدم أي دواء من الأوعية المدرجة أدناه والتي من الممكن أن تؤثر على مستوى السكر في الدم لديك.

❖ قد يتغير احتياجاك من الإنسولين إذا كنت تستخدمه بالتزامن مع:
أوعية أخرى لعلاج السكري: مضخات اللوزامين أكسيميداز (MIAO).
حاصرات بيتا مثبطة الأثير المحل للأيكوستاتين (ACE).
حمض الأستييل ساليسيلك، الستيرويدات الستيرويدية، السلفوناميدات، موانع الحمل الفموية، أوية التيرابيد، الكورتيكويدات القشرية، العلاج بهرمون الدرقية، المثاكية الأوية، هرمون النمو، دازولان، أو كورتكوريدات لانريتيد.

❖ مركبات الفلوراوبوليمين (يكون فئة من الأوية الحضادة للسكري التي يتم تناولها عن طريق الفم وتستخدم لعلاج مرض التهاب القولون)،

بعض الأدوية المضامين منذ فترة طويلة بالتوافق الثاني من السكري وأمراض القلب أو سكتة سابقة. ويتم علاجهم مركبات الثيرالوبولين ديون بالتزامن مع الإنسولين يمكن أن يصادوا بفشل في القلب. أخبر طبيبك بحدوث أي تصاب بعلامات فشل القلب مثل ضيق التنفس غير المعتاد أو الزيادة السريعة في الوزن أو التورم الموضعي (الوذمة).

### الحمل والرضاعة

ليس هناك قيود على العلاج بإنسولاتارد® أثناء الحمل أو الرضاعة. يرجى استشارة طبيبك.

### القيادة واستخدام الآلات:

إذا كنت تقوم بالقيادة أو استخدام أدوات أو الآلات، انتبه لعلامات الهبوط. تكون قدرتك على التركيز أو التفاعل أقل خلال الهبوط. لا تقوم مطلقاً بالقيادة أو استخدام الآلات إذا شعرت باقتارب الهبوط. ناقش مع طبيبك عما إذا كان يستطيعك القيادة أو استخدام الآلات إذا كنت تصاب بالكثير من نوبات الهبوط أو إذا كان ينعذر عليك اكتشاف الهبوط.

## ٣. كيفية استخدام إنسولاتارد®

خُدت مع طبيبك أو الممرضة عن احتياجاك من الإنسولين. اتبع نصائحهم بعناية. إذا قام طبيبك بتحويلك من نوع آخر أو من ماركه لأخرى من الإنسولين، فقد يتطلب الأمر تعديلاً جرعتك بواسطة الطبيب.
يتمح فغياص مستوى السكر في الدم بانتظام.

### كيفية استخدام الإنسولين

يتم تعاطي إنسولاتارد® عن طريق الحقن خُت الجلد. لا تتم مطلقاً بحقن الإنسولين مباشرة في الوريد أو العضلة.
فم دائماً بتغيير مكان الحقن في نفس المنطقة، وذلك لتقليل خطر تكون كتلانات أو تنقر الجلد (الآثار الجانبية المحتملة). أفضل الأماكن لُحقن نفسها هي: الأذراع، الجزء الأمامي من السُخذ أو أعلى الذراع.

## طريقة حقن إنسولاتارد® بمفرده أو كخليط مع الإنسولين سريع المفعول

❖ **تأكد من استخدام المحقن الصحيح مع مقياس الوحدات المقابل لُحقن الإنسولين.**

❖ **استحب الهواء إلى الحقن**، بنفس جرعة الإنسولين التي تحتاجها.

❖ **اتبع تعليمات الطبيب أو الممرضة.**

❖ **قبل حقن الإنسولين مباشرة، قم بفرق الزجاجة بين يديك حتى يصبح السائل أبيض متجانس وغائم.** تكون إعادة تكوين المعلق أسهل إذا وصل الإنسولين لدرجة حرارة الغرفة.

❖ **قم بحقن الإنسولين خُت الجلد.** استخدم تقنية الحقن التي يوصلك بها الطبيب أو الممرضة.
❖ **احتفظ بإبرة خُت الجلد لمدة ١ نواٍ على الأقل** للتأكد من الحصول على الجرعة الكاملة.

## ٤. ما الذي يجب فعله في الطوارئ

إذا حدث **لديك هبوط**

يعني الهبوط أو يصبح مستوى سكر الدم لديك منخفضاً جداً.
العلامات التحذيرية من الهبوط قد تأتي بشكل مفاجئ ويمكن أن تضم ما يلي:
العرق البارد، شحوب وبرودة الجلد، الصداع، زيادة سرعة ضربات القلب، الشعور بالمرض، الشعور بالوجع الشديد، تغيرات مؤقتة في الإحساس، الوذمة، النعب أو الضعف غير المعتاد، العصبية أو الارتعاش، الشعور بالقلق، الشعور بالتشنؤن، صعوبة التركيز.
إذا أصبت بأي من هذه العلامات، تناول أقراص الجلوكوز أو وجبة خفيفة على كمية كبيرة من السكر، الخلويات، البسكويت، عصير الفواكه، ثم تحصل على الراحة.

❖ **لا تستخدم أي إنسولين** إذا كنت تشعر باقتارب الهبوط.

احصل مع أقراص الجلوكوز أو الخلويات أو البسكويت أو عصير الفواكه، لاستخدامها في حالة الهبوط.

❖ **أخبر أقرب أصدقائك وزعمالك المقربين** بأنه في حالة فقدك الوعي، فإنه يجب عليهم خويل وضعية قلبك بشكل صحيح على الجانب وعلى المشورة الطبية على أن يوصلك بها الطبيب أو الممرضة.
❖ **إعدادك أن ألعطمة أو مشروبات**، حيث قد يسبب ذلك لك الاختناق.

❖ **في حالة عدم علاج نقص السكر الشديده** فقد يسبب تلفاً مالم مؤقتاً أو دائماً، وقد يؤدي إلى الوفاة.

❖ **إذا كنت مصاباً بهبوط**، أي إلى فقدك الوعي، أو إذا أصبت بكثير من نوبات الهبوط، خُدت إلى طبيبك، قد تكون بحاجة لتعديل الجرعة أو وقت تناول الإنسولين أو الطعام أو التمارين.

### استخدام الجلوكاجون

قد تسترد وعيك بشكل أسرع بعد فقدان الوعي إذا تم حقنك بهرمون الجلوكاجون بواسطة شخص على علم بطريقة استخدامه.
إذا تم حقنك بالجلوكاجون، فسوف خُتاح إلى الجلوكوز أو وجبة غنية بالسكر، مجرد استعادتك للوعي.
إذا لم تستجب للعلاج بالجلوكاجون، فيجب علاجك بالمستشفى. اطلب المشورة الطبية بعد حقن الجلوكاجون. ويجب عليك معرفة السبب وراء إصابتك بالهبوط لتجنب الإصابة بأخرى من نوبات الهبوط.

### سبب الهبوط

يحدث الهبوط إذا انخفض مستوى السكر في الدم لديك إلى مستويات منخفضة جداً، وقد يحدث ذلك:

- إذا استخدم جرعة كبيرة من الإنسولين.
- إذا تناولت كمية قليلة من الطعام أو لم تتناول إحدى الوجبات.
- إذا مارست التمرينات بشكل أكثر من المعتاد.

### إذا ارتفع مستوى السكر في الدم لديك

قد يحدث ارتفاع في مستوى سكر الدم لديك (يسمى هذا ارتفاع سكر الدم).

**العلامات التحذيرية** تظهر بشكل تدريجي وتتضمن هذه العلامات: زيادة التبول، الشعور بالعطش، فقد الشهوية، الشعور بالمرض (الغثاوان أو القيء)، الشعور بالدوخة أو التعب، الإحمرار، جفاف الفم، الجلد.

جفاف الفم ورائحة الفمركبة (الأسيتون) في الأنفاس.

❖ **إذا أصبت بأي من هذه الأعراض**، قم باختبار مستوى السكر في الدم، وقم باختبار البول الخاص بالكيتونات.
يحدث بعد ذلك يطلب المشورة الطبية على الفور، قد تكون هذه العلامات هي علامات حالة شديدة الخطورة، تنصح المُحاضر الكيوني المتسكري، إذا لم يتم علاج هذه الحالة فقد تؤدي إلى غيبوبة سكر، وقد تؤدي إلى الوفاة.

### أسباب زيادة سكر الدم

- نسيان استخدام الإنسولين
- تكرار استخدام جرعة إنسولين أقل من الجرعة التي تحتاجها
- الإصابة بعيوى أو حمى
- تناول الأدوية بأكثر من المعتاد
- ممارسة التمرينات بشكل أقل من المعتاد.

## ٥. الآثار الجانبية المحتملة

على غرار جميع الأوعية، قد يسبب إنسولاتارد® آثاراً جانبية على الرغم من أنها لا خُدت جميع الأشخاص.

### الآثار الجانبية الشائعة جداً

(أكثر من شخص واحد بين كل ١٠ أشخاص)

❖ انخفاض سكر الدم. انظر النشرة الصححية الواردة في ٤ ما الذي يجب فعله في الطوارئ.

### الآثار الجانبية غير الشائعة

(أقل من شخص واحد بين كل ١٠٠ شخص)

التغيرات في موضع الحقن (الحثل الشحمي).

التسحيج الدهني خُت الجلد في موضع الحقن قد يمتد لتفاعلات في موضع الحقن (الضمور الشحمي) أو تزداد سماكته (التضخم الشحمي). إن تغيير موضع الحقن في كل مرة تقوم فيها بالحقن يمكن أن يساعد على تقليل حدوث خطر هذه التغييرات بالجلد.
إذا لاحظت تغيراً بالجلد أو زيادة سماكته في موضع الحقن، فآخبر طبيبك أو الممرضة، هذه التفاعلات قد تصبح أشد خطورة، أو قد تسبب تغيراً في امتصاص الإنسولين إذا قامت بالحقن في هذا الموضع.

علامات الحساسية. قد خُدت تفاعلات في موضع الحقن (الاحمرار، التورق، الحكة) (تفاعلات الحساسية الموضعية)، عادة ما تختفي هذه التفاعلات بعد أسابيع قليلة من تناول الإنسولين. استشر طبيبك إذا لم تختفي.
اطلب المشورة الطبية على الفور:

- إذا امتدت علامات الحساسية لأجزاء أكبر من الجسم، أو
- إذا شعرت فجأة بأنك لست على ما يرام، وحدت لديك: بدء التعرق، بدء الشعور بالمرض (القيء)، صعوبة التنفس، زيادة سرعة ضربات القلب، الشعور بالدوخة.

اعتلال الشبكية. اعتلال الشبكية مرض العين يتعلق بمرض السكري وقد يؤدي إلى فقد الإبصار.
إذا كنت مصاباً باعتلال الشبكية المتسكري، وحدت خُصن في مستويات سكر الدم لديك بشكل سريع جداً، فقد تسوء حالة اعتلال الشبكية.
اطلب طبيبك بخصوص ذلك، تومر المفاسل.
عندما تبدأ في تناول الإنسولين، قد يحدث احتجاز للماء قد ما يسبب حدوث تورم حول الركبئين والمعامل الأخرى عادة ما يخفنى قليلاً سريعاً.

### الآثار الجانبية النادرة جداً

(أقل من شخص واحد بين كل ١٠,٠٠٠ شخص)

**مشاكل في الإحمرار**. عندما تبدأ لأول مرة في العلاج بالإنسولين، فقد يحدث اضطراب في الإحمرار، لديك وكل هذا الإحضرار عادة ما يكون مؤقتاً. الاعتلال العصبي المؤلم (ألم بسبب تلف العصب).
إذا حدث خُصن في مستوى سكر الدم لديك بشكل سريع جداً، فقد تشعر بألم **معتق بالأعصاب**، ويسمى ذلك الاعتلال العصبي المؤلم الحاد وعادة ما يكون مؤقتاً.

تفاعلات الحساسية الخطيرة. لمستحضر إنسولاتارد® أو أحد مكوناته يطلق عليها تفاعلات الحساسية الجهازية، أخطر التحذيرات الواردة في ٤ ما الذي يتم فعله في الطوارئ:

❖ إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مفرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي.

## ٦. كيفية تخزين إنسولاتارد®

يحفظ ببعد في متناول ومراى الأطفال. لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحيه المون على الشريط والعلبة بعد الرمز "EXP".
تغير تاريخ انتهاء الصلاحيه إلى آخر يوم من ذلك الشهر.

**إنسولاتارد® الذي يتم استخدامه بعد** يجب تخزينه في التلاجة عند درجة حرارة بين ٢-٨ درجة مئوية، بعيداً عن مركز وحدة التبريد. لا جُمد الدواء.

**إنسولاتارد® الذي قيده الإستخدام** أو يعمل كاحتياطي يجب عدم تخزينه في التلاجة، بعد إخراج الزجاجة من التلاجة، ويوصى بتكررها حتى تصل لدرجة حرارة الغرفة قبل إعادة خويل الإنسولين إلى معلق. وفقاً لتعليمات الاستخدام للمرة الأولى، يمكنك حملها معك وحفظها في درجة حرارة الغرفة (أقل من ٢٥ درجة مئوية)، تصل لحد ٤ إلى ٦ أسابيع و٤ لمدة ٤ أسابيع في درجة مئوية أقل من ٢٠ درجة مئوية.

❖ **تعد دائماً بتخزين الزجاجة في العبوة** الكرتونية الخارجية عند عدم استخدامها، ولك من أجل حمايتها من الضوء.

يجب حماية إنسولاتارد® من زيادة الحرارة والضوء.

ينبغي عدم التخلص من الأدوية بعد المياه الصرف الصحي أو التفتابان المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد في حاجة لاستخدامها، تساعد هذه التدابير على الحفاظ على البيئة.

## ٧. معلومات إضافية

### محتويات إنسولاتارد®

• **الإداة الفعالة** في الإنسولين البشري المصنوع عن طريق التكنولوجيا الحيوية المؤتلفة، إنسولاتارد، هو معلق إنسولين متجانس (NPH) يحتوي كل ١ مل على ١٠٠ وحدة دولية من الإنسولين البشري. خزني كل زجاجة على ١٠ مل تكافئ ١,٠٠٠ وحدة دولية.

• **المكونات الأخرى** كلوريد الزنك، الجليسيرول، ميثاكريلول، الفينول، سوسيوم فوسفات ثنائي الهيدرات، هيدروكسيد الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك، بروتامين سلفات، ماء للحقن.

### شكل إنسولاتارد® ومحتويات العبوة

يأتي معلق الحقن في شكل معلق مائي أبيض غير رائق.

يتم التزويد به في بواتق حقن على ١ ٠ و ٥ زجاجات خزوي على ١٠ مل (قد يتم خنص العبوات مع جميع الأحجام في الأسواق).

Marketing authorisation holder: <p>Novo Nordisk A/S <p>Novo Allé <p>DK-2880 Bagsvaerd <p>Denmark</p></p></p></p>
Manufactured by: <p>Novo Nordisk <p>Production SAS <p>45 Avenue d'Orléans <p>F-28000 Chartres <p>France</p></p></p></p></p>

### للإبلاغ عن أعراض جانبية

المرکز الوطني للتحقق والسلامة الدوائية
هاتف: +966-11-2057662
للتواصل بالادارة والتنسيق للتحقق وإدارة الأزمات، هاتف: +966-11-2038222
تحويل: 2356-2340-2334-2353-2354-2317-2356
الهاتف الجانبي: 8002490000
بريد الإلكتروني: npc.drug@sdfa.gov.sa
الموقع الإلكتروني: www.sdfa.gov.sa/npc

تمت مراجعة النشرة في نوفمبر/ 2016/

إنسولاتارد® هو علامة تجارية ممتلكها شركة

نوفو نورديسك آيه/ إس الدانمارك