

نوفارتس

هايپوتيرز[®] جل للعين

التركيب

المادة الفعالة، ريتينول بالينيات
السواغ: كبريت، ٩٨٠، سيتريمييد كمادة حافظة، سواغ لعمل جل حتى ١ جرام.

الشكل الصيدلاني وكمية المادة الفعالة في كل وحدة

هايپوتيرز[®] جل للعين، ريتينول بالينيات، ١٠٠٠ وحدة دولية/ جرام

دواعي الاستعمال / الاستخدامات الممكنة

كعلاج مساعداً لحماية القرنية في حالات:

- جفاف العين لُحْتَلَف الأسباب (مثل متلازمة شوجرين، التهاب القرنية الشللي العصبي، التهاب القرنية الناتج عن التعرض).
- تهيج الملتحمة والقرنية بسبب نقص طبقة الدموع الواقية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

البالغون

وفقاً للمتطلبات القرنية، فإن الجرعة المعتادة هي نقطة واحدة ثلاث مرات يومياً إلى نقطة واحدة كل ساعة. لم تُجرَ حتى الآن أبحاث منهجية على الاستعمال والأمان في الأطفال والمراهقين.

موانع الاستعمال

التهاب القرنية الحاد أو من مكونات هايپوتيرز.

التحذيرات والاحتياطات

ملاحظة للأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة

لا ينبغي استعمال هايپوتيرز أثناء ارتداء العدسات اللاصقة. يتم خلع العدسات قبل الاستعمال ولا يُعاد ارتداؤها إلا بعد مرور ٣٠ دقيقة على الأقل.

التأثيرات الدوائية

في حالة استعمال دواء آخر بالعين، يتم استعماله قبل هايپوتيرز بـ ٥-١٠ دقائق على الأقل. ويجب دائماً أن يكون هايپوتيرز هو الدواء الذي يوضع أخيراً.

الحمل والإرضاع

لا توجد دراسات مفصلة في الحيوانات أو النساء الحوامل. لذلك يجب توخي الحذر عند استعمال المستحضر الدوائي في النساء الحوامل أو المرضعات.

التأثير على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات

قد تحدث ضبابية في الرؤية لفترة قصيرة عقب الاستعمال. يجب أن يوضع ذلك في الاعتبار عند تشغيل الآلات أو قيادة السيارة.

الأثار المناوئة

قد يحدث إحساس حارق خفيف لفترة قصيرة عقب الاستعمال. وقد تحدث أيضاً تفاعلات حساسية مفردة.

تجاوز الجرعة

لم يتم الإبلاغ عن أي حالات لتجاوز الجرعة.

الخواص والمفعول

آلية المفعول - الأثار الدوائية - الفاعلية الإكلينيكية

نظراً لطول فترة احتمازه، فإن هايپوتيرز جل للعين يصلح للاستعمال كبدائل للدموع سواء في حالات نقص إفراز الدموع، أو في أشكال "جفاف العين" التي تكون فيها طبقة الدموع غير كافية بسبب ضعف توعية الدموع بما يؤدي إلى زيادة إفرازها. تؤدي زيادة اللزوجة إلى تقوية التأثير الغرواني الواقى من خلال التزليق الفيزيائي. تؤدي إضافة فيتامين أ، الذي يقاوم علامات جفاف الظهارة القرنية، إلى تدعيم المفعول العلاجي.

فيتامين أ (ريتينول) لازم لتشغيب الطبيعي للخلايا الظهارية. يؤدي نقص ريتينول إلى اعتماد الخلايا الكأسية، وضمور الخلايا الظهارية، وتكاثر الخلايا القاعدية للملتحمة.

الحركات الدوائية

تم إثبات أن ريتينول ينفذ بشكل جيد عبر القرنية عند استعماله موضعياً في العين السليمة للأرنب. لا يمكن إعطاء أي تصريحات عن مدى النفاذية، أو عن التوزيع والاحتجاز، في عين الإنسان.

البيانات قبل الإكلينيكية

لا توجد أي بيانات خاصة بالمستحضر ذات دلالة على الاستعمال.

معلومات أخرى

العمر البري

عند تخزينه بدون فتح، يمكن استعمال هايپوتيرز[®] جل للعين حتى تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المطبوع على العبوة والأنبوبة. بعد فتح الأنبوبة، لا يجوز استعمال المستحضر لأكثر من شهر واحد.

احتياطات خاصة بالتخزين

قبل فتح الأنبوبة لأول مرة، يجب حفظ هايپوتيرز[®] جل في الثلجة (٢-٨°م). بعد فتح الأنبوبة لأول مرة، يظل هايپوتيرز[®] ثابتاً في درجة حرارة الغرفة (١٥-٢٥°م) لمدة ٣٠ يوماً.

تعليمات خاصة بالاستعمال والتداول

اغلق الأنبوبة جيداً بعد الاستعمال. لا تلمس طرف الأنبوبة.

أحجام العبوات

أحجام العبوات مُختصة بالبلد.

الصانع

انظر العلبة الخارجية.

آخر مراجعة للمعلومات: ديسمبر ٢٠٠٣

تاريخ الموافقة (على النص): ١٥ يناير ٢٠٠٤

(م) = علامة تجارية مسجلة

نوفارتس فارما، شركة مساهمة، بازل، سويسرا.

هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحته، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يُعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الخياران بالدواء وينبغي حذرهما.
- لا تطلع من تلقاء نفسك مدة العلاج المخصصة لك.
- لا تكسر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

حَفَظَ الْأَدْوِيَةَ بَعِيداً عَن مَتَنَاوِلِ أَيْدِي الْأَطْفَالِ

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالوج العرب