

Valsartan/Hydrochlorothiazide arrow®



80 mg / 12,5 mg

160 mg / 12,5 mg

160 mg / 25 mg

comprimé pelliculé

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice

1. Qu'est-ce que VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé contient deux substances actives appelées valsartan et hydrochlorothiazide. Ces deux substances aident à contrôler la pression artérielle élevée (hypertension).

Le valsartan appartient à la famille des antagonistes de l'angiotensine II qui aident à contrôler l'hypertension artérielle. L'angiotensine II est une substance présente dans l'organisme, qui stimule la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Ceci entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

L'hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques thiazidiques.

L'hydrochlorothiazide augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par une des substances administrée seule.

L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition de ces pathologies.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan, à l'hydrochlorothiazide, aux dérivés des sulfamides (des substances apparentées chimiquement à l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW.
- Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW en début de grossesse - voir rubrique Grossesse et allaitement).
- Si vous avez une maladie du foie sévère.
- Si vous avez une maladie rénale sévère.
- Si vous avez des difficultés pour uriner.
- Si vous êtes sous dialyse (rein artificiel).
- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est inférieur à la normale ou si votre taux sanguin de calcium est supérieur à la normale malgré un traitement.
- Si vous souffrez de crises de goutte.

Si l'une de ces situations s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Faites attention avec VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé :

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin si :

- Vous prenez des médicaments éparpilleurs de potassium, des suppléments potassiques, des substituts de sel contenant du potassium ou d'autres médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang tels que l'héparine. Votre médecin pourra avoir besoin de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.
- Votre taux sanguin de potassium est faible.
- Vous présentez des diarrhées ou vomissements sévères.
- Vous prenez de fortes doses de diurétiques.
- Vous avez une maladie cardiaque sévère.
- Vous présentez une sténose (rétrécissement) des artères du rein.
- Vous avez reçu récemment une transplantation rénale.
- Vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostérone. L'utilisation de VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW est déconseillée si vous êtes dans ce cas.
- Vous avez une maladie du foie ou des reins.
- Vous présentez une fièvre, une éruption cutanée et des douleurs articulaires, qui peuvent être des signes de lupus érythémateux disséminé (LED, une maladie auto-immune).

- Vous êtes diabétique, si vous souffrez de la goutte ou si vous avez des taux sanguins élevés de cholestérol ou de graisses.
- Vous avez développé des réactions allergiques en prenant d'autres médicaments antihypertenseurs de cette classe (antagonistes des récepteurs à l'angiotensine II) ou si vous êtes allergique ou asthmatique.

Ce médicament peut augmenter la sensibilité de la peau au soleil. Parlez-en à votre médecin avant de vous exposer au soleil ou aux lumières de bronzage (UV). L'utilisation de VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW chez l'enfant et l'adolescent (de moins de 18 ans) est déconseillée.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte (ou que vous êtes susceptible de le devenir). VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse et allaitement).

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'effet du traitement peut être influencé si VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW est pris avec certains autres médicaments. Il peut être nécessaire de changer la dose, de prendre d'autres précautions, et dans certains cas d'arrêter un des médicaments. Ceci concerne particulièrement les médicaments suivants :

- le lithium, un médicament utilisé pour traiter certains types de maladies psychiatriques,
- les médicaments qui affectent ou peuvent être affectés par le taux sanguin de potassium, tels que le digoxine, un médicament utilisé pour réguler le rythme cardiaque, certains médicaments neuroleptiques,
- les médicaments qui peuvent augmenter la quantité de potassium dans votre sang, tels que les suppléments potassiques, les substituts de sel contenant du potassium, les médicaments éparpilleurs de potassium, l'héparine,
- les médicaments qui peuvent diminuer la quantité de potassium dans votre sang, tels que les corticostéroïdes, certains laxatifs,
- les diurétiques, les médicaments utilisés pour traiter la goutte tels que l'allopurinol, la vitamine D thérapeutique et les suppléments de calcium, les médicaments utilisés pour traiter le diabète (antidiabétiques oraux ou insuline),
- les autres médicaments qui font baisser la pression artérielle, tels que les bêta-bloquants ou la méthildopa, ou les médicaments qui resserrent les vaisseaux sanguins ou stimulent le cœur, tels que la noradrénaline ou l'adrénaline,
- les médicaments qui augmentent le taux de sucre dans le sang, tels que le diazoxide,
- les médicaments anticancéreux tels que le méthotrexate ou le cyclophosphamide,
- les médicaments utilisés pour soulager la douleur (antalgiques),
- les médicaments utilisés pour traiter l'arthrite,
- les médicaments destinés à détendre les muscles (myorelaxants) tels que la tubocurarine,
- les médicaments anti-cholinergiques tels que l'atropine ou le biperidène,
- l'amantadine (un médicament utilisé en prévention de la grippe),
- la cholestyramine et le colestipol (des médicaments utilisés pour traiter l'hyperlipidémie [taux de graisses élevé dans le sang]),
- la ciclosporine, un médicament utilisé pour empêcher le rejet de l'organe après une transplantation,
- certains antibiotiques (tétracyclines), anesthésiques et sédatifs,
- la carbamazépine, un médicament utilisé pour traiter les états épileptiques.

Aliments et boissons

Vous pouvez prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW avec ou sans aliments.

Évitez de consommer de l'alcool avant d'avoir parlé à votre médecin. L'alcool peut provoquer une diminution plus importante de votre pression artérielle et/ou augmenter le risque de vertiges ou d'évanouissement.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

- **Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte (ou que vous êtes susceptible de le devenir).** Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW avant d'être enceinte ou dès que vous apprendrez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW. Ce médicament est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.
- **Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer l'allaitement.** VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW est déconseillé chez les femmes qui allaitent car l'hydrochlorothiazide est excrété dans le lait maternel. Votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

baïsser la pression artérielle.
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par une des substances administrée seule.
 L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition de ces pathologies.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan, à l'hydrochlorothiazide, aux dérivés des sulfamides (des substances apparentées chimiquement à l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW.
- Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW en début de grossesse - voir rubrique Grossesse et allaitement).
- Si vous avez une maladie du foie sévère.
- Si vous avez une maladie rénale sévère.
- Si vous avez des difficultés pour uriner.
- Si vous êtes sous dialyse (rein artificiel).
- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est inférieur à la normale ou si votre taux sanguin de calcium est supérieur à la normale malgré un traitement.
- Si vous souffrez de crises de goutte.

Si l'une de ces situations s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Faites attention avec VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé :

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin si :

- Vous prenez des médicaments épargneurs de potassium, des suppléments potassiques, des substituts de sel contenant du potassium ou d'autres médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang tels que l'héparine. Votre médecin pourra avoir besoin de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.
- Votre taux sanguin de potassium est faible.
- Vous présentez des diarrhées ou vomissements sévères.
- Vous prenez de fortes doses de diurétiques.
- Vous avez une maladie cardiaque sévère.
- Vous présentez une sténose (rétrécissement) des artères du rein.
- Vous avez reçu récemment une transplantation rénale
- Vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostérone. L'utilisation de VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW est déconseillée si vous êtes dans ce cas.
- Vous avez une maladie du foie ou des reins.
- Vous présentez une fièvre, une éruption cutanée et des douleurs articulaires, qui peuvent être des signes de lupus érythémateux disséminé (LED), une maladie auto-immune.

- psychiatriques,
- les médicaments qui affectent ou peuvent être affectés par le taux sanguin de potassium, tels que la digoxine, un médicament utilisé pour réguler le rythme cardiaque, certains médicaments neuroleptiques,
- les médicaments qui peuvent augmenter la quantité de potassium dans votre sang, tels que les suppléments potassiques, les substituts de sel contenant du potassium, les médicaments épargneurs de potassium, l'héparine,
- les médicaments qui peuvent diminuer la quantité de potassium dans votre sang, tels que les corticoïdes, certains laxatifs,
- les diurétiques, les médicaments utilisés pour traiter la goutte tels que l'alloprinol, la vitamine D thérapeutique et les suppléments de calcium, les médicaments utilisés pour traiter le diabète (antidiabétiques oraux ou insuline),
- les autres médicaments qui font baisser la pression artérielle, tels que les bêta-bloquants ou la méthildopa, ou les médicaments qui resserrent les vaisseaux sanguins ou stimulent le cœur, tels que la noradrénaline ou l'adrénaline,
- les médicaments qui augmentent le taux de sucre dans le sang, tels que le diazoxide,
- les médicaments anticancéreux tels que le méthotrexate ou le cyclophosphamide,
- les médicaments utilisés pour soulager la douleur (antalgiques),
- les médicaments utilisés pour traiter l'arthrite,
- les médicaments destinés à détendre les muscles (myorelaxants) tels que la tubocurarine,
- les médicaments anti-cholinergiques tels que l'atropine ou le bupirénone,
- l'amantadine (un médicament utilisé en prévention de la grippe),
- la cholestyramine et le colestipol (des médicaments utilisés pour traiter l'hyperlipidémie (taux de graisses élevé dans le sang)),
- la ciclosporine, un médicament utilisé pour empêcher le rejet de l'organe après une transplantation,
- certains antibiotiques (tétracyclines), anesthésiques et sédatifs,
- la carbamazépine, un médicament utilisé pour traiter les états épileptiques.

Aliments et boissons

Vous pouvez prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW avec ou sans aliments.

Évitez de consommer de l'alcool avant d'avoir parlé à votre médecin. L'alcool peut provoquer une diminution plus importante de votre pression artérielle et/ou augmenter le risque de vertiges ou d'évanouissement.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien ayant de prendre tout médicament.

- **Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte (ou que vous êtes susceptible de le devenir).** Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW. Ce médicament est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.
- **Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer l'allaitement.** VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW est déconseillé chez les femmes qui allaitent car l'hydrochlorothiazide est excrété dans le lait maternel. Votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Avant de conduire un véhicule, d'utiliser des outils ou des machines ou d'effectuer toute autre activité nécessitant de la concentration, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW. Comme avec beaucoup d'autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW peut, dans de rares cas, entraîner des sensations vertigineuses et affecter la capacité à se concentrer.

3. COMMENT PRENDRE VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW COMPRIMÉ PELICULÉ ?

Prenez toujours VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW comme votre médecin vous l'a indiqué afin d'obtenir les meilleurs résultats et réduire le risque d'effets indésirables. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. D'autres dosages sont disponibles.

Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne remarquent souvent aucun signe de la présence de cette maladie. De nombreuses personnes peuvent se sentir plutôt normales. C'est pourquoi il est d'autant plus important que vous respectiez les rendez-vous avec le médecin, même si vous vous sentez bien. Votre médecin vous dira combien de comprimés de VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW vous devez prendre. En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus élevée ou plus faible.

- La dose habituelle de VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW est un comprimé par jour.
- Vous ne devez pas modifier la dose ou arrêter de prendre les comprimés sans l'avis de votre médecin.
- Ce médicament doit être pris à la même heure chaque jour, en général le matin.
- Vous pouvez prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW avec ou sans aliments.
- Avez le comprimé avec un verre d'eau.

Si vous avez pris plus de VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Si vous avez des sensations vertigineuses sévères et/ou des évanouissements, allongez-vous et consultez immédiatement votre médecin. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, consultez votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé :

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, ne prenez pas la dose oubliée si le moment de votre prochaine prise est proche. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé :

L'arrêt de votre traitement par VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW peut entraîner une aggravation de votre hypertension. N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ces effets indésirables peuvent survenir à certaines fréquences définies ci-dessous :

- Très fréquent : affecte plus de 1 utilisateur sur 10
- Fréquent : affecte 1 à 10 utilisateur(s) sur 100
- Peu fréquent : affecte 1 à 10 utilisateur(s) sur 1 000
- Rare : affecte 1 à 10 utilisateur(s) sur 10 000
- Très rare : affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000
- Indéterminée : la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles

Certains effets indésirables peuvent être graves et nécessitent une prise en charge médicale immédiate :

Vous devez immédiatement consulter votre médecin en cas de symptômes d'angioedème, tels que :

- Gonflement du visage, de la langue ou du pharynx
- Difficultés à avaler
- Urticaire et difficultés à respirer

Les autres effets indésirables incluent :

Peu fréquent

- Toux
- Pression artérielle basse
- Étourdissements
- Déshydratation (avec les symptômes suivants: soif, bouche et langue sèches, uriner peu fréquemment, urines sombres, peau sèche)
- Douleurs musculaires
- Fatigue
- Sensations de picotements ou d'engourdissement
- Vision trouble
- Bruits (par exemple sifflements, bourdonnements) dans les oreilles.

Très rare

- Sensations vertigineuses
- Diarrhées
- Douleurs articulaires.

Fréquence indéterminée

- Difficultés respiratoires
- Diminution importante du débit urinaire
- Taux faible de sodium dans le sang (accompagné parfois de nausées, de fatigue, de confusion, de malaise et de convulsions)
- Taux faible de potassium dans le sang (accompagné parfois de faiblesse musculaire, de spasmes musculaires et d'anomalies du rythme cardiaque)
- Taux faible de globules blancs dans le sang (avec des symptômes tels que fièvre, infections cutanées, mal de gorge ou aphtes dans la bouche dus à des infections, faiblesse)

- Augmentation du taux de bilirubine dans le sang (ce qui peut, dans des cas sévères, entraîner un jaunissement de la peau et des yeux)
- Augmentation du taux d'urée et de créatinine dans le sang (qui peut indiquer une fonction rénale anormale)
- Augmentation du taux d'acide urique dans le sang (ce qui peut, dans des cas sévères, provoquer des crises de goutte)
- Syncope (évanouissement).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW, COMPRIMÉ PELICULÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Valsartan/hydrochlorothiazide après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas conserver dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité.

Ne pas utiliser, si vous remarquez que la boîte est endommagée ou présente des signes d'altération.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont : le Valsartan 80 mg et l'Hydrochlorothiazide 12,5 mg pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, Lauril sulphate de sodium, hydroxypropylcellulose, silice colloïdale anhydre, hydroxypropylcellulose peu substituée (LH-21), stéarate de magnésium.

Pelliculage : Opdary II 85F64732 rose contenant : alcool polyvinyle, dioxyde de titane (E171), macrogol 3350, talc (E553b), oxyde de fer jaune (E172), rouge allura (E129), oxyde de fer noir (E172)

Qu'est-ce que VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé oval légèrement orangé avec VH1 sur une face et «>» sur l'autre face.

Les comprimés sont conditionnés sous plaquettes thermoformées en Aluminium.

Boîte de 30 ou 90 comprimés.

Que contient VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont : le Valsartan 160 mg et l'Hydrochlorothiazide 12,5 mg pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, Lauril sulphate de sodium, hydroxypropylcellulose, silice colloïdale anhydre, hydroxypropylcellulose peu substituée (LH-21), stéarate de magnésium.

Pelliculage : Opdary II 85F66815 marron contenant : alcool polyvinyle, dioxyde de titane (E171), macrogol 3350, talc (E553b), oxyde de fer rouge (E172), rouge allura (E129), oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer noir (E172)

Qu'est-ce que VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé ovale rouge foncé avec VH2 sur une face et «>» sur l'autre face.

Les comprimés sont conditionnés sous plaquettes thermoformées en Aluminium.

Boîte de 30 ou 90 comprimés.

Que contient VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont : le Valsartan 160 mg et l'Hydrochlorothiazide 25 mg pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont : Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, Lauril sulphate de sodium, hydroxypropylcellulose, silice colloïdale anhydre, hydroxypropylcellulose peu substituée (LH-21), stéarate de magnésium.

Pelliculage : Opdary II 85F66775 marron contenant : alcool polyvinyle, dioxyde de titane (E171), macrogol 3350, talc (E553b), oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer noir (E172)

Qu'est-ce que VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé marron ovale avec VH3 sur une face et «>» sur l'autre face.

Les comprimés sont conditionnés sous plaquettes thermoformées en Aluminium.

Boîte de 30 ou 90 comprimés.

Titulaire/Exploitant

ARROW GENERIQUES

26, AVENUE TONY GARNIER
69007 LYON

Fabricant

ARROW PHARM (MALTA) LIMITED
HF 62, HAL FAR INDUSTRIAL ESTATE
BIRZEBBUGIA, BBG 3000, MALTE

ARROW GENERIQUES

26, AVENUE TONY GARNIER
69007 LYON

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Septembre 2011

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Affsaps (France). www.affsaps.fr

Cette notice est également disponible gratuitement en braille et en caractères agrandis, auprès de HandicapZéro sur simple demande au 0800.39.39.51 ou sur pharmabraille.fr

