

## سيبركس بلس

أقراص مغلفة

اسم الشركة: شركة المهن الطبية للأدوية

الاسم التجاري للمستحضر: سيربركس بلس أقراص مغلفة.

الاسم العلمي: سيربراميسين و ميترونيدازول

التركيب: كل قرص ذو كسوة غشائية يحتوى على:

- مواد فعالة: سيربراميسين ٣٧٩ مجم تكافىء سيربراميسين

١,٥ مليون وحدة دولية ميترونيدازول ٢٥٠ مجم

- مواد غير فعالة: كروسكاربيلوز صوديوم، ثانى

أوكسيد السيلikon الغروى، بولى سوربات، ستيارات

الماغنيسيوم، ميكروكريستاللين سليولوز، هيدروكسى

بروبيل ميثيل سليولوز، بولى إيثيلين جلوكول، ٦٠٠، ثانى

أوكسيد النيتانيوم، تلك مضاد للرغوة.

الشكل الصيدلاني: أقراص ذات كسوة غشائية.

التأثير الفارماكولوجي: سيربراميسين مركب مضاد

الميكروبات من مجموعة الماكروبلد. ترتبط هذه المادة

بالريبيوزومات في الخلية مما ينبع عنه تثبيط تكوين

البروتين وبالتالي يوقف نمو الخلية البكتيرية. ويعتبر

سيربراميسين أساساً مثبط لنمو البكتيريا كما أن له تأثير

قاتل البكتيريا الأكثر حساسية في التركيزات العالية.

ميترونيدازول مضاد قاتل فعال للبكتيريا اللاهوائية

والطفيليات عن طريق اختزال الخلية البكتيرية مما يؤدي إلى تثبيط

الميترونيدازول داخل الخلية البكتيرية مما يؤدي إلى تثبيط

تكوين الحمض النووي وبالتالي يمنع تكوين خلية

الميكروب.

الحركة الدوائية:

سيربراميسين لا يمتص بصورة كاملة وتصل الاتاحة عن

طريق الفم إلى ٣٣-٣٩% من المجرعة. تناول الدواء مع

الأكل يقلل الإتاحة الحيوية بنسبة ٥٠% لذلك يجب تناوله

على معدة خالية. يترك السيربراميسين بنسبة عالية في

أنسجة وسائل الجسم. نصف عمره في الدم يتراوح ٥-٥,٥

ساعات ويصل إلى ذروة التركيز بعد ٤-٤ ساعات.

يتم الأيض عن طريق الكبد ويتم الإخراج أكثر من

٨٠% من الجرعة عن طريق العصارة المرارية وحوالي ٤-

٤% عن طريق البول.

ميترونيدازول يتم أبعده في الكبد ويتم إخراجه بنسبة

٢٠% عن طريق البول وحوالي ٦-٦% عن طريق

البراز. ٨٠% من الجرعة يتمتص ويصل إلى أعلى تركيز

في البلازم بعد ساعة واحدة. ويتذكر في جميع أنسجة

وسائل الجسم يصل نصف العمر في ٨-٦ ساعات.

نقل الإتاحة الفعلية للغقر بتناول الطعام.

دواعي الاستخدام: سيربركس بلس يستخدم في الحالات

الآتية:

الحالات الحادة والمزمنة من التهابات الفم والأسنان مع وجود تجمعات صديدية حول الأسنان وكذلك التهابات اللثة.

عدوى الجهاز التنفسى العلوى: التهاب الحلق واللوزتين والجيوب الأنفية والأذن الوسطى.

الوقاية من، وعلاج العدوى المحتمل حدوثها بعد العمليات الجراحية للفم والأسنان.

**الجرعة والاستعمال:**

يجب أن تؤخذ الأقراص على معدة خاوية مرتين يومياً. موضع الاستعمال:

حالات الحساسية لمركبات الميترونيدازول والسيربراميسين.

**الأعراض الجانبية:** طفح جلدي، أرتيكاريا، حكة جلدي، فىء، عثيان، إسهال وقد يحدث في بعض الحالات ارتفاع إنزيمات الكبد.

**التفاعلات الدوائية:**

عند تناول الكحوليات مع الميترونيدازول يحدث تأثير مماثل لتأثير الدايسيلفيراوم كما يزيد الدواء من تأثير بعض مضادات التجلط التي تؤخذ عن طريق الفم.

**الحمل والرضاعة:**

لا يستخدم المستحضر للأئم أثناء الحمل أو الرضاعة إلا إذا كانت الفائدة تفوق الخلورة على الجنين أو الطفل.

**الاحتياطات والتحذيرات:**

- خل وظائف مكونات الدم ، مثل حالات قلة عدد خلايا الدم البيضاء.

- حالات الفشل الكلوي أو الفشل الكلوي الشديدة لمنع

زيادة تركيز الميترونيدازول وناتج أبعده في الدم (إذا ينصح بتنقیل الجرعة)، أمراض الجهاز العصبي ونوبات الصرع.

- يجب تجنب تناول المواد الكحولية والأدوية التي تحتوى على الكحول خلال فترة العلاج ولمرة ٤٨ ساعة على الأقل بعد آخر جرعة.

- في حالة استمرار العلاج لأكثر من ١٠ أيام، ينصح

بإجراء الفحوصات والتحاليل المعملية اللازمة.

**العبوة والتغليف:**

علبة كرتون تحتوى على ٢ شريط (AL/PVC) بكل

منها ١٠ أقراص مغلفة + نشرة داخلية.

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°C في مكان جاف.

**تعليمات للمريض:**

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

**إنتاج:**

شركة المهن الطبية للأدوية

أبو سلطان - الإسماعيلية - مصر

