

فامكس®

أموكسيسيلين / حامض الكلافلاتيك
مسحوق للحقن داخل الوريد

تأثيرات غير مرغوب فيها :

- رود الفعل تتطابل انتهاها خاصه :

رود فعل ارجية: ظفح جلدي

التهاب الاروية الدموية الذي قد يظهر في شكل بقع حمراء او ارجوانية على الجلد، والتي قد تؤثر ايضاً على اجزاء اخرى من الجسم،

حمى وآلام المفاصل والعقد في الرقبة والابط والفخذ، في بعض الأحيان تزوم الوحة او الحقق (ندمة وآلامية)، مما يتسبب في صعوبات في الجهاز التفصي.

ازعاج جفني مصحوب بالانخفاض في ضغط الدم.

اذا احسست بحدى هذه الاعراض استشر طبيبك في الحال. يجب / يطلب انتهاها خاصه .

التيات الاعفاء الغلطية: التهاب الاعفاء الغليظة، مما قد يسبب اسهالاً مائي مصحوب بدم و مخاط، الام في المعدة او الحمى.

اذا كنت تعاني من هذه الاعراض، استشر طبيبك في اقرب وقت ممكن.

اثار جانبية شائعة: يمكن ان تؤثر على اقل من 1 من كل 10 شخاص:

التلاع (مرض سببه الفطريات، المبيضات، التي تتطور في المهبل او الفم او طيات الجلد)، الامساك

تأثيرات جانبية غير مألوفة: قد تؤثر على اقل من 1 من كل 100 شخص:

- ظفح جلدي، حكة،

- طفح يزداد مع حكة ،

- غثيان، خاصة عند تجاذب الجرعة.

اذا تعرضت انت او مطلقك لاثار جانبية، فاستعمل فامكس® قبل وجبات الطعام.

- تقي، عسر اضطر، دوخة وصداع

تأثيرات جانبية غير شائعة يمكن اكتشافها عن طريق فحوصات الدم:

زيادة بعض القيميات التي يتضمنها الكبد

اثار جانبية نادرة: يمكن ان تؤثر على اقل من 1 من كل 1000 شخص:

- ظفح جلدي، يمكن ان يشكل بثور تبقيع صفيحة (بعض سواده مرکبة محاطة بمنطقة اكثر شحوب، مصحوبة بحلقة داكنة حولها : حمامي عدية الاشكال).

اذا لاحظت اي من هذه الاعراض، اتصل بطبيبك على وجه السرعة.

- تورم او اصفرار على طول الوريد، الذي قد يصبح حساساً للغاية عند اللمس.

الاثار الجانبية الشائعة التي يمكن اكتشافها عن طريق فحوصات الدم:

- انخفاض عدد الصفائح الدموية.

- انخفاض خلايا الدم البيضاء.

الاثار الجانبية ذات القرد الغير معروفة:

- رود فعل ارجية (اظهر اعلاه)،

- التهاب الاماء الغليظة (اظهر اعلاه)،

- التهاب الششاء الواقي المحيط بالدماغ (التهاب السحايا العقين)،

- تفاعلات جانبية خطيرة:

- ظفح موس مع تقرارات وتشير الجلد، خاصة حول الفم والعنق والعنين وفي منطقة الأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنز جونسون)، وشكل اكبر خطورة، مسؤول عن تمزق كبير للجلد (اكثر من 30% من مساحة سطح الجسم) :

متلازمة ايلال،

- ظفح احمر كثيف مع بثور صغيرة تتحوّل على بشرة الجلد الفقاعي او التقريري.

- ظفح جلدي حرشفي موس مع كل متغير على بثور تحت الجلد (ظفح جلدي باكستاني).

اذا واجهت اي من هذه الاعراض، اتصل ب الطبيب على الفور.

- التهاب الكبد

- اليرقان الناجم عن زيادة في مستوى البيليروبين في الدم (مادة منتجة في الكبد)، مما يعطي اللون الاصفر للجلد ولبايض العين،

- التهاب الكلى،

- طول وقت تختى الدم،

- تشنجات (ادى الاشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من فامكس® او يعانون من مشاكل في الكلى).

رود فعل سلبية يمكن اكتشافها عن طريق فحوصات الدم او البول:

- انخفاض كبير في عدد خلايا الدم البيضاء،

- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي)،

- بوارات في البول.

نظراً لوجود الوتايسيلوم، إمكانية التهاب وريدي او احسان بالدم في موضع الحقن.

يجب اعلام الطبيب او الصيدلي في حالة ظهور تأثيرات اخرى غير مرغوب فيها و مقلقة غير مذكورة في هذه النشرة.

المقدار و طريقة الاستعمال:

المقادير العادلة:

- البالغون والأطفال الذين وزنهم 40 كغم فأقصى مفعلاً :

فامكس® 1 غ/ 100 مل، فامكس® 2 غ/ 200 مل،

فامكس® 500 مل/ 50 مل

فامكس® 1 غ/ 200 مل

فامكس® 1 غ/ 200 مل

الجرعة العادلة

1 غ/ 100 مل مع كل 8 ساعات

1 غ/ 200 مل مع كل 8 ساعات

الجرعة القصوى

1 غ/ 100 مل مع كل 8 ساعات

1 غ/ 200 مل مع كل 8 ساعات

في حالة العدوى الخطيرة المخولة قد ترتفع الجرعة إلى حدو 2 غ/ 200 مع اقصى كل 8 ساعات.

1 غ/ 100 مع الجرعة الى 2 غ/ 200 مع قبل التدخل الجراحي عد

اعطاء مخدر، قد تختلف الجرعة تبعاً لوع

und التدخل، قد يكرر طبيبك استعمال اذا استمر

الاستعمال اذا استمر التدخل اكتر من ساعه واحدة.

الاطفال الذين وزنهم أقل من 40 كغم :

تعدم الجرعات على وزن الطفل بالكلغ

فامكس® 1 غ/ 100 مل، فامكس® 2 غ/ 200 مل،

فامكس® 500 مل/ 50 مل

فامكس® 1 غ/ 200 مل

فامكس® 1 غ/ 200 مل

الاطفال الذين اعمارهم 3 اشهر او اقل

الجسم كل 8 ساعات

الاطفال الذين اعمارهم 3 اشهر او وزنهم

الجسم كل 12 ساعه

اول من 4 كغم

المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى والكبد:

- في حال وجود مشاكل في الكلى، من الممكن اعطاء جرعة مختلفة، قد يصف لك الطبيب جرعة مختلفة او دواء آخر.

- في حال حدوث مشاكل في الكبد، سيرافق طبيبك عن كتب وستكون فحوصات الدم اقل انتظاماً.

طريقة الاستعمال:

- هذا الدواء صالح للحقن داخل الوريد فقط، لا يحقن داخل العضلة.

- بعد تحضير محلول الدواء يجب استعماله في الحال.

- يجب مزج المحلول الدوائي بعاء الماء الحار او مخلوط كلوريد الصوديوم بنسبة 0.9%.

- الحقن الارواني، يمكن استعمال محلول حار夠ان او زفاف.

- لا ينصح بمزج هذا الدواء مع مضادات الاتهاب الستيروائية او الامينو كلوكوربيات.

- لا يحقن اكتر من 2 غ/200 مع غير الحقن الارواني.

اتيه الطلاق الشالية والمدة الزئنية المذكورة في الجدول حرفاً :

فامكس® 1 غ/ 100 مل، فامكس® 2 غ/ 200 مل،

فامكس® 500 مل/ 50 مل

فامكس® 1 غ/ 200 مل