

# CLODO®

Clopidogrel (Bisulphate)

## ACTION

Le clopidogrel, principe actif des comprimés de Clodo, appartient à une classe de substances appelées anti-agrégant plaquettaires. Les plaquettes sont des très petits éléments circulant dans le sang, de taille inférieure à celles des globules rouges et blancs, et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation, les anti-agrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé thrombose).

Clodo est utilisé pour éviter la formation de caillots sanguins (thrombus) dans les vaisseaux sanguins (artères) devenus rigides. Cette maladie également appelée athérothrombose peut conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

## INDICATIONS

On vous a prescrit Clodo pour empêcher la formation de caillots sanguins et réduire le risque de survenue de tels événements graves car:

- Vous avez des artères qui sont rigidifiées (aussi connu sous le nom d'athérothrombose), et
- Vous avez déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une artériopathie des membres inférieurs, ou
- Vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou "d'infarctus du myocarde" (crise cardiaque). Dans ce cas, votre médecin doit également vous prescrire de l'acide actéylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments utilisée pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, mais aussi pour prévenir la formation de caillots sanguins).

## DOSAGE AND ADMINISTRATION

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle est d'un comprimé de Clodo 75 mg par jour, à prendre par voie orale pendant ou en dehors des repas. Vous devez prendre votre traitement régulièrement et tous les jours au même moment de la journée. Par ailleurs, si vous avez été victime d'une douleur thoracique grave, votre médecin pourra vous prescrire 300 mg de Clodo (4 comprimés à 75 mg en une seule fois) pour débuter le traitement.

## Si vous oubliez de prendre Clodo:

Si vous oubliez de prendre un comprimé de Clodo, mais si vous en apercevez dans les 12 heures suivantes, prenez votre comprimé immédiatement et prenez le suivant simplement le suivant à l'heure habituelle. Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous auriez oubliée de prendre.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Clodo:

- Si vous êtes hypersensibles (allergiques) au clopidogrel ou à l'un des autres composants.
- Si vous avez une maladie actuellement responsable d'un saignement tel qu'un ulcère de l'estomac.
- Si vous souffrez d'insuffisance hépatique sévère.
- Si vous allaitez.

## MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous s'applique à votre cas, vous devez en avertir votre médecin avant de prendre Clodo:

- Si vous avez un risque hémorragique tel que:
- Une maladie qui peut provoquer un saignement interne (comme un ulcère de l'estomac).
- Des troubles de la coagulation favorisant des hémorragies internes (saignement au sein d'un tissu, d'un organe ou d'une articulation).
- Une blessure grave récente.
- Une intervention chirurgicale récente (y compris dentaire).
- Une intervention chirurgicale (y compris dentaire) prévue dans les 7 jours à venir.
- Si vous prenez d'autres médicaments.
- Si vous présentez une maladie du foie ou des reins.

Clodo n'est pas destiné aux enfants ou aux adolescents de moins de 18 ans.

## Grossesse

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous êtes enceinte, vous devez en avertir votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Clodo. Si vous débutez une grossesse pendant un traitement par Clodo, consultez immédiatement votre médecin traitant.

## Allaitement

Si vous allaitez, vous ne devez pas prendre Clodo.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Clodo ne devrait pas modifier votre aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

### **Interactions médicamenteuses**

Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de Clodo ou vice-versa. Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

La prise de warfarine (médicament utilisé pour diminuer la coagulation du sang) n'est pas recommandée lors d'un traitement par Clodo.

Vous devez informer avec précision votre médecin si vous prenez un anti-inflammatoire non-stéroïdien, médicament utilisé habituellement pour traiter les maladies douloureuses et/ou inflammatoires des muscles ou des articulations, ou si vous prenez de l'héparine, autre médicament utilisé pour diminuer la coagulation du sang.

Si vous avez eu une douleur thoracique grave (angor instable ou crise cardiaque), Clodo peut vous être prescrit en association avec de l'acide acétylsalicylique, substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Une utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg sur une période de 24 heures) ne doit généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin.

### **EFFETS SECONDAIRES**

Comme tous les médicaments, Clodo est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Les saignements sont les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec Clodo: Ecchymose, hématome, saignement de nez, sang dans les urines, hémorragie gastrique ou intestinale. Dans de rares cas, des hémorragies oculaires, cérébrales, pulmonaires ou articulaires ont également été rapportées. Les autres effets indésirables rapportées avec Clodo sont:

- Diarrhée, douleur abdominale, constipation, nausée, vomissement, digestion difficile ou brûlure d'estomac.
- Vertige, céphalée, baisse de tension, confusion, hallucinations.
- Problèmes cutanés tels qu'éruptions et démangeaison cutanée, réactions allergiques généralisées.
- Douleur articulaire, fièvre, troubles du goût.

Prenez contact immédiatement avec votre médecin en cas de survenue de:

- Fièvre, signes d'infection ou fatigue importante qui pourraient être en rapport avec de rares diminutions de certains globules sanguins.
- Jaunisse car des cas de troubles hépatiques ont été très rarement rapportés.

### **En cas de survenue d'un saignement prolongé sous Clodo**

Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut demander un peu plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez rien constater d'anormal. Toutefois, en cas de doute, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.

### **SURDOSAGE**

Si vous avez pris plus de Clodo que vous n'auriez dû, contactez votre médecin ou le service d'urgences le plus proche en raison du risque de saignement.

### **STOCKAGE**

Conserver en dessous de 25°C.

### **PRESENTATIONS**

*Comprimés:*

Clodo 75: Clopidogrel (Bisulphate) 75 mg

*Excipients:* Mannitol, Cellulose Microcristalline, Hydroxypropylcellulose, Polyéthylèneglycol, Huile Végétale Hydrogénée, Instacoat Universal IC-U-3164 (Marron).

#### **CECI EST UN MEDICAMENT**

- Un médicament est un produit qui affecte la santé, son administration sans avis médical peut être dangereuse.
- Suivre strictement la prescription médicale et les instructions du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent le médicament, ses bienfaits et ses risques.
- Ne pas interrompre le traitement prescrit.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

