

اقرأ كل ما بهذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ بتناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، اسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تعامل معه.
- هذا الدواء تم وصفه خصيصاً لك (أو لطفلك). لا تعطيه للآخرين. فقد يضرهم حتى لو كانت أعراضهم هي نفس أعراضك.
- إذا لاحظت أن أياً من الآثار الجانبية لهذا الدواء أصبحت جسيمة، أو لاحظت ظهور أي أعراض جانبية تم ترد في هذه النشرة، فضلاً أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

هذه النشرة تحتوي على ما يلي:

1. ما هو لوريبيز وفيه يستخدم.
2. ما يجب مراعاته قبل استخدام لوريبيز.
3. كيفية تناول لوريبيز.
4. الأعراض الجانبية المحتملة الحدوث.
5. كيفية حفظ لوريبيز.
6. معلومات إضافية.

#### 1. ما هو لوريبيز وفيه يستخدم

لوريبيز هو مستحضر دوائي يحتوي على مادتين فعالتين هما: لوراداتين وسودايفيدرين. لوراداتين هو مضاد للهستامين قوي طويل المفعول ثلاثي الحلقة له تأثير اختياري مضاد لمستقبلات H1 الظرفية. أما كبريتات السودايفيدرين، فهو واحد من فلويدات الأيفيدرا الموجودة في الطبيعة وهو مضيئ للأوعية الدموية يعطي بالقم، وينتج عنه أثر تدريجي مزيل للاحتقان ولكنه ممنع، فيسهل انكماش الغشاء المخاطي المحتقن في مناطق الجهاز التنفسي العليا. وتتم إزالة الاحتقان من الغشاء المخاطي للتسهيل التنفسي من خلال مفعوله على الأعصاب الودية (السمبثاوية).

لوريبيز يخفف من الأعراض المصاحبة لحساسية الأنف (حى القش) مثل:

- احتقان الأنف والجيوب الأنفية.
- العطس.
- سيلان الأنف.
- حكة في العيون مع زيادة الدموع.

لوريبيز يحتوي على مزيج من دوائين هما: لوراداتين (مضاد للهستامين) و سودايفيدرين (مزيل للاحتقان).

مضادات الهيستامين تساعد على تقليل أعراض الحساسية بمنع تأثير مادة تسمى الهيستامين. ينتج الهيستامين في الجسم كرد فعل لوجود أجسام غريبة يتحسس لها الجسم. مزيلات الاحتقان تقوم بتضييق الأوعية الدموية. وهذا يؤدي إلى تصفية الأنف غير جيدة التنهوية أو المسدودة.

قد يقوم طبيبك المعالج أو الصيدلي بوصف لوريبيز لسبب آخر. اسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي إذا كانت لديك أي أسئلة حول سبب وصف لوريبيز لك.

#### 2. ما يجب مراعاته قبل تناول لوريبيز

لا تتناول لوريبيز في الحالات الآتية:

- إذا كنت مصاباً بالحساسية تجاه لوريبيز أو أي من المكونات المذكورة في نهاية هذه النشرة.

لا تتناول لوريبيز إذا كان لديك حالياً أو مسبقاً أي من الحالات الطبية الآتية:

- المياه الزرقاء.
- صعوبة في التبول.
- ارتفاع شديد في ضغط الدم.
- أمراض الأوعية الدموية الشديدة.
- فرط نشاط الغدة الدرقية.

لا يتم تناول لوريبيز إذا كنت حالياً تتناول أو مارلت في خلال 14 يوم من التوقف عن تناول مثبطات أو كسبيديز أحادي الأمين وهي أدوية تستخدم في علاج الاكتئاب.

بالنسبة ل لوريبيز أقراص:

لا تعطي لوريبيز أقراص إلى الأطفال الأقل في العمر من 12 سنة.

بالنسبة ل لوريبيز شراب:

لا تعطي لوريبيز شراب إلى الأطفال الأقل في العمر من 6 سنوات.

لا تتناول لوريبيز بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة.

لا تتناول لوريبيز إذا كانت العبوة مزمرة أو ظهر عليها علامات العيب.

قبل البدء في تناول هذا الدواء، أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كانت لديك حساسية من:

- أي أدوية أخرى.
- أي مكونات أخرى، مثل بعض أنواع الطعام أو المواد الحافظة أو الصبغات.
- أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك حالياً أو مسبقاً أي من الحالات الطبية، وبخاصة الآتي ذكراها:
- مشاكل في العين (مثل ارتفاع ضغط العين أو المياه الزرقاء).
- قرحة المعدة.
- انسداد معوي.
- البروستاتا أو مشاكل المثانة البولية.
- مرض في القلب.
- مرض السكري.

- إذا كنت تبلغ من العمر 60 سنة أو أكثر، وذلك لأن كبار السن قد يكونوا أكثر حساسية لتأثيرات هذا الدواء.

إذا كنت لم تجرب طبيبك المعالج أو الصيدلي عن أي من الأعراض السابقة، أخبرهم قبل تناول لوريبيز.

يعتبر السودايفيدرين المتواجد في لوريبيز كمنشط من قبل الهيئات الرياضية. لا ينصح باستخدامه في الرياضيين المتنافسين.

تتناول أدوية أخرى

أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى، وذلك يتضمن الأدوية اللاوصفية التي قمت بشرائها من الصيدلية أو من السوق المركزي أو من متجر الأغذية الصحية.

بعض الأدوية لا يجب تناولها مع لوريبيز. وذلك يتضمن:

- أدوية القلب وضغط الدم.
- مثبطات أو كسبيديز أحادي الأمين، والأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب.
- مضادات الحموضة.
- كاؤولين.

هذه الأدوية من الممكن أن تتأثر ب لوريبيز، أو من الممكن أن تؤثر على كيفية عمله. من الممكن أن تحتاج إلى جرعات مختلفة من الدواء الخاص بك، أو من الممكن أن تحتاج إلى تناول أدوية مختلفة. سوف يقوم بصحبتك طبيبك المعالج أو الصيدلي.

تناول لوريبيز مع الطعام

لا يهم تناول لوريبيز قبل أو بعد الطعام.

الحمل والرضاعة

لا تتناولى الدواء إذا كنت حاملاً أو تقومين بالرضاعة الطبيعية إذا لم تقومين بمناقشة المخاطر والفوائد المتضمنة مع طبيبك أو الصيدلي.

القيادة واستخدام الآلات

كن متأكداً من معرفتك عن مدى رد فعلك تجاه لوريبيز قبل قيادتك للسيارة أو تشغيل الماكينات، من غير المرجح أن يتسبب لك لوريبيز في النعاس. إذا كنت في حالة من النعاس، لا تقود السيارة أو تقوم بالعمل مع الآلات.

#### 3. كيفية تناول لوريبيز

بالنسبة ل لوريبيز أقراص:

الجرعة الموصي بها من لوريبيز أقراص في البالغين والأطفال أكبر من 12 سنة هي قرص واحد كل 12 ساعة.

لا يستخدم في الأطفال الأقل في العمر من 12 سنة.

قم ببلع القرص بالكامل مع كوب من الماء. لا تقم بسحق أو كسر أو مضغ القرص قبل بلعه.

بالنسبة ل لوريبيز شراب:

البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6-12 سنة (وزن الجسم أكثر من 30 كجم): تكون الجرعة هي 5 مل (ملعقة صغيرة واحدة) مرتين يومياً (كل 12 ساعة).

لا تعطي للأطفال الأقل في العمر من 6 سنوات.

استشر طبيبك المعالج إذا لم تتحسن لديك الأعراض خلال 7 أيام أو إذا كانت الأعراض مصحوبة بحمي.

تأكد من تناول لوريبيز بالظبط كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي.

إذا لم تقم باتباع تعليماتهم، قد لا تتعافى من أعراضك.

لا تقم بتناول لوريبيز أكثر مما أوصى به طبيبك أو الصيدلي.

إذا نسيت أن تتناول لوريبيز

إذا كان الوقت هو تقريبا وقت الجرعة التالية، قم بنخطي الجرعة التي نسيتهها وقم بتناول الجرعة التالية في وقتها.

خلاف ذلك، تناول الجرعة حالما تتذكر، وبعد ذلك قم بتناول دوائك كالمعتاد. لا تقم بتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة النسيه.

إذا تناولت لوريبيز أكثر مما يجب (جرعة مفرطة)

اتصل في الحال بطبيبك للاستشارة أو توجه إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى، إذا اعتقدت أنك أنت أو أي شخص آخر قد تناول الكثير من لوريبيز. قم بذلك حتى ولو لم تظهر أي أعراض من عدم الراحة أو التسهم. فقد تكون هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

أثناء تناولك لوريبيز

أشياء من الواجب أن تفعلها

أخبر جميع الأطباء وأطبآء الأسنان والصيدالة الذين يقومون بعلاجك أنك تتناول لوريبيز.

أخبري طبيبك أو الصيدلي في حالة ما أصبحت حاملاً أثناء تناولك لوريبيز.

أشياء من الواجب ألا تفعلها

لا تقم بإعطاء لوريبيز لأي شخص آخر، حتى ولو تشابهت أعراضهم مع أعراضك.

لا تستخدمه في علاج أي شكاي أخرى إذا لم يقل طبيبك أو الصيدلي ذلك.

توقف عن تناول لوريبيز 48 ساعة قبل إجراء أي اختبار جلدي للحساسية.

مضادات الهيستامين من الممكن أن تتداخل مع نتائج الاختبارات الجلدية.

#### 4. الأعراض الجانبية محتملة الحدوث

أخبر طبيبك أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن إذا لم تشعر أنك على ما يرام أثناء تناولك لوريبيز.

يساعد لوريبيز معظم الناس المصابين بالحساسية، ولكن من الممكن أن يكون له بعض الآثار الغير المرغوب فيها في بعض الناس.

مثل باقي الأدوية، من الممكن أن يتسبب لوريبيز في بعض الآثار الجانبية. في حالة ظهورها، فهي في الأغلب تكون ثانوية ومؤقتة. ومع ذلك، من الممكن أن يكون بعض منها خطير ويحتاج إلى الرعاية الطبية.

معظم الآثار الجانبية الغير مرغوب فيها الملحوظة مع لوريبيز تكون خفيفة إلى متوسطة. تتضمن:

- مشاكل في النوم.

- جفاف الفم.

- الصداع.

- النعاس.

- الاضطراب.

- الدوخة.

- التعب.

من الممكن أن تظهر آثار جانبية أخرى غير مرغوب فيها في بعض الناس ممن يتناولون لوريبيز.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا قمت بملاحظة أي آثار أخرى.

لا تتزعج من هذه القائمة من الآثار الجانبية المحتملة الحدوث.

فقد لا يحدث لك أي منها.

#### 5. كيفية حفظ لوريبيز

بالنسبة ل لوريبيز أقراص:

قم بحفظ الأقراص في العبوة الخاصة بها في مكان جاف حتي ميعاد تناولها.

إذا قمت بأخذ الأقراص خارج العبوة فهذا قد يتسبب في عدم حفظها جيداً.

لا تحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

بالنسبة ل لوريبيز شراب:

احفظ الزجاجية في مكان جاف وبارد.

لا تحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

لا تقم بحفظ هذا الدواء أو أي أدوية أخرى في الحمام أو قرب المغسلة.

لا تقم بترك الدواء في السيارة في الأيام الحارة أو على حافة الشباك.

احفظ الأقراص بحيث لا يمكن للأطفال الوصول إليها.

سوف تنتهي صلاحية هذا الدواء بعد 30 يوماً من فتح العبوة للمرة الأولى.

إذا أخبرك طبيبك أو الصيدلي بأن تتوقف عن تناول لوريبيز أو إذا تجاوزت الأقراس تاريخ الصلاحية، اسأل الصيدلي عما يجب القيام به مع الأقراس المتبقية.

#### 6. معلومات اضافية

شكل لوريبيز ومكونات العبوة

بالنسبة ل لوريبيز أقراص

قرص لوريبيز دائري، مشطوف الحافة، غير مصقول ذو طبقة ثنائية، مرقش على الجانب الوردي الملون، ومنقوش ب «115» و سطوح أبيض عادي على الجانب الآخر.

عبوات الأقراص: 14 قرصاً لكل عبوة.

حاويات الأقراص: شرائط شفافة حرارية من مادة البني في سي/ البي في دي سي مع غطاء من رقائق الألومنيوم الثابت.

بالنسبة ل لوريبيز شراب

شراب عديم اللون إلى مصفر ذو طعم ورائحة الفواولة المميزة، خلي من أي مواد غريبة. عبوات الشراب: زجاجة كهرمانية اللون مزودة بغطاء مقاوم لعبت الأطفال سعة 100 مللي/عبوة.

#### علام يحتوي لوريبيز

بالنسبة ل لوريبيز أقراص:

المادة الفعالة هي: لوراداتين 5 ملجم وكبريتات السودايفيدرين 120 ملجم.

المكونات الأخرى هي: لاكتوز سريع التذوق ن اف، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز كيه- 4م، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز كيه- 4م، براكربلين البوتاسيوم، ستيارات ماغنسيوم، فركتوز، بولي إيثيلين جلايكول 1500(اس بي)، إيدينات ثنائي

الصوديوم، حمض الستريك الألماني، سيرات صوديوم لامائية، بنزوات صوديوم، محلول سوربيتول 70% غير ميلور، بروبيلين جلايكول، سائل نكهة الفواولة، سكر اللوز و ماء منقي.

بالنسبة ل لوريبيز شراب:

المادة الفعالة هي: لوراداتين 5 ملجم وكبريتات السودايفيدرين 60 ملجم.

المكونات الأخرى: فركتوز، بولي إيثيلين جلايكول 1500(اس بي)، إيدينات ثنائي الصوديوم، حمض الستريك الألماني، سيرات صوديوم لامائية، بنزوات صوديوم، محلول سوربيتول 70% غير ميلور، بروبيلين جلايكول، سائل نكهة الفواولة، سكر اللوز و ماء منقي.

#### المصنع ومالك الحقوق التسويقية

صنع بواسطة:

#### الدوائية

مصنع الأدوية بالفصيم

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

المملكة العربية السعودية

تمت الموافقة على هذه النشرة بتاريخ نوفمبر 2016.

#### الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

- المركز الوطني للتنظف والسلامة الدوائية:

فاكس: +966 11 2057662

للإنصال بالإدارة التنفيذية للتنظف و إدارة الأزمات.

هاتف: 11 2038222 +966 بحويلة: 2356-2353-2345-2344

2340

الهاتف المجاني: 8002490000

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.a.gov.sa

الموقع الإلكتروني: www.sfta.gov.sa/npc

2340

2340

2340

2340

2340

2340

2340

2340

2340

2340

2340

2340

2340

#### إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وضرره.

- لا تقم بتدقة العلاج المحدد لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدالة العرب