

بروكتسينالار

مرهم، تحاميل



مستحضرات جلدية (مزيج من كورتيكونيد موضعي ومدر موضعي)

التركيب:

للرهم: فليوسينولون أسيتونيد ار. ملغم، ليوكالين هيدروكلوريدي ٢٠ ملغم، بروبيلين غليكول ٧٠ ملغم، مواد حافظة، بروبيل الباراамиدروكسي بنزوات (اي ٦٦) ٥٪ ملغم، مثليل البارااميدي بكتي بنزوات (اي ٣٨) ٥٪ ملغم، سواغات بكتية كافية حتى ١ غم.

التحميم: فليوسينولون أسيتونيد ار. ملغم، ليوكالين هيدروكلوريدي ٤٠ ملغم، سواغات بكتية كافية لتحميلية واحدة.

الصفات المميزة والقائمة:

يتمتع الفليوسينولون أسيتونيد - الكورتيكونيد الموضعي في مستحضر بروكتسينالار - بتأثيرات مضادة للالتهاب والحساسية والحكمة والتنفس.

تقسم الكورتيكونيدات الموضعية عادة إلى أربع زمرة: شديدة الفعالية، فعالة، متوسطة الفعالية، ضعيفة الفعالية.

يصنف مستحضر بروكتسينالار في زمرة الكورتيكونيدات متوسطة الفعالية، تساهم مادة الليغنووكالين في زيادة القدرة المخففة للألم للمستحضر وذلك باعتبار أنها مدر موضعي.

المركبات الدوائية:

لم تجر حتى الان تحريرات حول الحركيات الدوائية للمواد الفعالة الجمجمة في مستحضر بروكتسينالار ومع ذلك فإنه من المعلوم أن درجة الامتصاص الجلدي للكورتيكونيدات تعتمد بشكل رئيسي على طريقة التطبيق مثل المعالجة مع ترك المنطقة مكشوفة أو تغطيتها بضماد كريم وعلى المنطقة المعالجة ودرجة الرطوبة في الجلد وشكل خاص على حالة العامة للجلد.

لدى معالجة متلوعين اصحاب امداده ٢٣اسبوع بتطبيق ١٥ غ من كريم فليوسينولون أسيتونيد (بنسبة ٤٪، ٪٢٥، ٪٤٠)، يومياً على مساحة من جلد الظهر تساوي ١٢٠٠ سم^٢، حدث نقص في انترالج ١٧-كوتسيونيدات في البول حتى ٣٪. وبالتالي فإن تأثيرات العامة للفليوسينولون أسيتونيد المطبق موضعي لا تذكر اذا ما استعمل حسب التعليمات.

ان الاستعمال طويل المدى او المبالغة بجرعات اعلى من تلك التي ينصح بها اماماً قد تؤدي الى حدوث التأثيرات العامة للكورتيكونيدات.

اذا اقرضنا حدوث امتصاص كامل للفليوسينولون أسيتونيد من تمرين بروكتسينالار يومياً او ١ غ من الرهم مرتين يومياً فان هذا يعادل جرعة ٢٪، ملغم فليوسينولون أسيتونيد يومياً. سبب كان ولично، لم الاظتن اية تأثيرات جانبية عامة في الانسان بعد اعطاء ٤ ملغم فليوسينولون أسيتونيد يومياً ولجنة سعدين يومياً عن طريق الفم.

وعل اقتراض حدوث امتصاص كامل لجرعة الليغنووكالين فإن التراكيز الاعظمي في البلازما سيكون اقل من اد. مكم/مل لكل ١ غ من الرهم واقل من ٤.٠ مكم/مل للتحميمية الواحدة، ومع ذلك فإن التراكيز التي تقل عن ١ مكم/ل ليس لها اية تأثيرات عامة. الحصول على تأثير مضاد لاضطراب النظم، يجب ان يصل مستوى الليغنووكالين في البلازما الى ٥-١٥ مكم/مل (كرابون)، ونتيجة لذلك فإن خطر حدوث التأثيرات الجانبية العامة يظل محدوداً.

الاستطبابات:

البواسير الداخلية والخارجية، الاكزيما الشرجية، التهاب المستقيم، الحكة الشرجية، المعالجة قبل وبعد العمليات الجراحية.

الجرعات والتطبيقات:

قبل استعمال مستحضرات بروكتسينالار وبعد كل تغوط يجب تنظيف منطقة الشرج بشكل تام وذلك بواسطة الماء الدافئ وقطعة من قماش ناعم (ترمى بعد الاستعمال) دون استعمال الصابون ان امكن ذلك.

يطبق مرهم بروكتسينالار ٣-٢ مرات يومياً ويدهن بطف على الجلد. يمكن تطبيق الرهم ايضاً ضمن المستقيم وذلك باستعمال لادة التطبيق للوجدة ضمن العلبة.

تدخل تحاميل بروكتسينالار في المستقيم صباحاً ومساءً بعد التغوط.

مدة الاستعمال:

تعتمد مدة الاستعمال على حالة السريرية وهي لا تتجاوز عادة ٣-٢ اسبوع. وانما تطلب المعالجة فترات اطول من ذلك يجب فحص الريض واتخاذ القرار حول الاستمرار بالمعالجة او تكرارها.

دواعي حصر الاستعمال:

مضادات الاستطباب، يجب عدم استعمال بروكتسينالار في امراض الجلد السليلة او الزهرية ولكنك في حال اصابة المنطقة بأمراض اولية ذات منشاً فطري او جرثومي او فيروسي.

في حال معرفة وجود عدم تحمل لأي من مركبات الرهم او التحاميل او حبوب اعراض عدم تحمل اثناء المعالجة، يجب عدم استعمال المستحضر للسبب لتلك الاعراض او اي افات المعالجة به. لا توجد تجارب كافية على استعمال مستحضرات بروكتسينالار لدى الرضع او صغار الاطفال لذا لا يجوز استعمال هذه المستحضرات لهم.

الاحتياطات: كما هي الحال بالنسبة لجميع الكورتيكونيدات الموضعية فإن الاستعمال المديد قد يؤدي إلى ضمور في الجلد او المخاطيات.

الحمل/الرضاع:

الحمل من الدرجة ج:

لقد بذلت التجارب على الحيوانات ان الاستعمال الموضعي للكورتيكوستيرونيدات الفعالة يؤدي الى تشوّه الجنين، ولكن لم تجر تجارب مماثلة على الانسان.

ان استعمال الكورتيكوستيرونيدات الموضعية اثناء الحمل يجب ان يقتصر على الحالات التي تكون الفوائد المركبة فيها اكبر من الخطر للختل على الجنين، ولا يجوز استعمالها على منافق واسعة من الجلد او بكينيات كبيرة او لفترات طويلة اثناء الحمل.

التأثيرات الجانبية:

في حالات افرادية وفي بدمي المعالجة قد يحدث حسن بالحركة في منطقة التطبيق وقد يحصل في حالات نادرة تهيج موضعي، حكة، ردود فعل تحسّسية وانتانات ثانوية بعد استعمال بروكتسينالار. لا يمكن الجزم بعدم حدوث ضمور في الجلد في المنطقة للالمعالجة في حال استعمال المستحضر لفترات طويلة.

لغير اخرى، لا يجوز حفظ تحاميل بروكتسينالار في درجات حرارة اعلى من ٣٠ مئوية حتى ولو كان ذلك لفترات قصيرة.

العيوب:

مرهم بروكتسينالار: اثنيب سعة ١٥ غ.

تحاميل بروكتسينالار، علبة تحوى على ١٠ تحاميل.

لوزعون والمصنعين: جرونتال فارما آج، ٨٧٥٦ ميتلودي

تاریخ للعلمات: شباط ١٩٩٥

ن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتليميات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتليميات الصيدلاني الذي صرف لك الدواء.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبران بالأنوية وينتفضا وضررها.
- لا تقطع منه العلاج المحددة لك من ق法师 نفسه.
- لا تكرر استعمال الدواء دون استشارة طبيبك.
- احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب.

schwarz

Name:	GI Procto-Synalar Salbe, Supp.	Größe:	160 x 260 mm	Material:	Dünndruck 60 g
	7 pt	Faserlauf:	260 mm	Sprache:	en.ar.
Artikel-Nr.:	700496 (Duplikat)	Druckfarbe:	schwarz	Code:	17
Klass.-Nr.:	50/018/046	Flattermarken:	209	Datum:	06.11.2006
Bez. der Vorgängerdatei:	700496	Leistungsindex:	AHA/X3	RZ geprüft:	Böhmer
Vorgängerdatei gelöscht:	nein				