

ريدكيس®

تادالافيل

أقراص مثقلة ١٠، ٢٠ و ٤٠ ملغم

كيفية التزويد،

ريدكيس® ٢٠، كل قرص مثقل يحتوي على ٢٠ ملغم تادالافيل، في عبوة تحتوي على ٥ و ٢٠ أقراص.
ريدكيس® ١٠، كل قرص مثقل يحتوي على ١٠ ملغم تادالافيل، في عبوة تحتوي على ٤ و ٢٠ أقراص.
ريدكيس® ٥، كل قرص مثقل يحتوي على ٥ ملغم تادالافيل، في عبوة تحتوي على ٣٠ قرص.

المكونات: كل قرص يحتوي على ريدكيس® مثيل سيلولوز، الصوديوم، سيلولوز دقيق البلور، لوزيل سلفات الصوديوم، بيويدون ٣٠، إستراتات المغنيسيوم، أكسيد الحديد الأصفر، وأبداي ٢. أيضا.

الشكل الصيدلاني،

أقراص مثقلة، للإستعمال عن طريق الفم.

الجموعه الدوائية،

دواء يستعمل لعلاج عدم القدرة على الإنجاب، التصنيف العلاجي: G04BE08.

الاستقطابات،

عدم القدرة على الإنجاب: هذا عندما لا يمكن للرجل الحصول، أو الاحتفاظ بصلابة قضيب مناسبة للنشاط الجنسي.
أظهر ريدكيس® بشكل كبير تحسين القدرة على حصول الرجل على صلابه قضيب مناسبة للنشاط الجنسي.

يعمل ريدكيس® عن طريق مساعدة الأوعية الدموية في القضيب على الاسترخاء، وبالتالي يسمح لتدفق الدم إلى القضيب وذلك بعد التحفيز الجنسي. ونتيجة لهذا يحسن وظيفة الإنجاب، لن يساعدك ريدكيس® إذا لم يكن لديك مشاكل في الإنجاب.

من المهم أن تلاحظ أن ريدكيس® لا يعمل إذا لم يكن هناك تحفيز جنسي. انت وشريكك بحاجة إلى الانخراط في العلاقة. تماماً كما لو كنت لم تتناول دواء لعدم القدرة على الإنجاب.

ريدكيس® ٥ ملغم فقط،

علاج الأعراض والأعراض المسببة للشاشة المسماة تضخم البروستات الحميد، هذا يحصل عندما تضخم غدة البروستات مع تقدم العمر. وتتضمن الأعراض صعوبة في بدء التبول، شعور بعدم تفريغ المثانة تماماً وزيادة تكرار الحاجة للتبول حتى قبل الليل. يحسن ريدكيس® من تدفق الدم إلى البروستات، ويرخي عضلات البروستات والمثانة والتي يوسعها عند قتل من أعراض تضخم البروستات الحميد. أظهر ريدكيس® تحسن في هذه الأعراض الجدية في وقت قصير بعد أسبوع – أسبوعين من بدء العلاج.

الجرعة وطريقة تناول الدواء،

دائماً، تناول ريدكيس® تماماً كما أخبرك طبيبك. يجب عليك مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

أقراص ريدكيس® تستخدم في الرجال فقط، و عن طريق الفم. يجب تناول أقراص ريدكيس® كاملة مع بعض الماء. يمكن تناول ريدكيس® مع أو بدون الطعام.

للمعالج عدم القدرة على الإنجاب،

ريدكيس® ١٠ و ٢٠ ملغم، قرص واحد من ريدكيس® ١٠ قبل النشاط الجنسي، إذا كان تأثير هذه

الجرعة ضعيف جداً، قد يزيد طبيبك الجرعة لتصل إلى ٢٠ ملغم. أن أقراص ريدكيس® للاستخدام عن طريق الفم. يمكن أن تؤخذ أقراص ريدكيس® ١٠ و ٢٠ ملغم قبل النشاط الجنسي بـ ٣٠ دقيقة على الأقل. قد تستمر فعالية ريدكيس® ١٠ و ٢٠ ملغم لغاية ٣٦ ساعة بعد تناول الأقراص.

لا تأخذ ريدكيس® أكثر من مرة واحدة يومياً. وريدكيس® ١٠ و ٢٠ ملغم للاستخدام قبل النشاط الجنسي التلويح و لا يؤسسى به للاستخدام اليومي المستمر.

ريدكيس® ٥، قرص واحد من ريدكيس® ٥ يؤخذ مرة واحدة يومياً. في نفس الوقت تقريبا من اليوم.

لا تتناول ريدكيس® أكثر من مرة واحدة يومياً.

عند أخذ ريدكيس® ٥ مرة واحدة يومياً، هناك يتيج لك الحصول على إنجاب عندما تكون محفز جنسيا عند أي نقطة زمنية خلال الـ ٢٤ ساعة بعد تناول ريدكيس® ٥. قد تكون مفيدة للرجال الذين يتوهمون شاملاً جنسيا يومياً أو أكثر في الأسبوع.

من المهم أن تلاحظ أن ريدكيس® لا يعمل إذا لم يكن هناك تحفيز جنسي. انت وشريكك بحاجة إلى الانخراط في العلاقة. تماماً كما لو كنت لم تتناول دواء لعدم القدرة على الإنجاب.

للمعالج تضخم البروستات الحميد

فقط ريدكيس® ٥،

الجرعة الموصى بها هي قرص واحد من ريدكيس® ٥ ملغم، يؤخذ مرة واحدة يومياً في نفس الوقت تقريبا من اليوم. إذا كان لديك تضخم بروستات حميد مصحاحا لعدم القدرة على الإنجاب، تبقى الجرعة قرص واحد من ريدكيس® ٥ مرة واحدة يومياً. لا تأخذ ريدكيس® ٥ أكثر من مرة واحدة يومياً.

في حال نسبت أخذ جرعتك من ريدكيس® ٥، خذ الجرعة حين تذكرها ولكن لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المفقودة. يجب عدم أخذ ريدكيس® ٥ أكثر من مرة واحدة يومياً.

موانع الاستقطابات،

لا تأخذ ريدكيس® إذا:

- كنت تعاني من حساسية ضد تادالافيل أو أي من المكونات الأخرى لريدكيس®.
- كنت تأخذ أي شكل من أشكال النترات المضوية أو معطيات أكسيد النتريك مثل أميل النترات. "النترات" هي مجموعة من الأدوية المستخدمة في علاج الذبحة الصدرية. قد تين أن تادالافيل يزيد من تأثير هذه الأدوية. أخبر طبيبك إذا كنت تأخذ أي شكل من أشكال النترات أو كنت غير متأكد.
- كنت تعاني من أمراض قلب خطيرة أو أصيب بنوبة قلبية مؤخراً خلال الأيام ٩٠ الماضية.
- أصبت بسكتة دماغية مؤخراً خلال الأشهر ٦ الماضية.
- كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم أو تعاني من ارتفاع ضغط الدم غير المتضبط.
- كنت قد أصبت بقشعريرة الحساسية بسبب اعتلال عصبي بصري دماغي أمامي غير شيرياتي (NAION)، وهي حالة تؤثر على "سكتة بالعين".

- كنت تتناول محفزات أو مثبطات سيكلير، مثل وول سيجويت مع مثبطات إنزيم فوسفوديستريز النوع الخامس، بما فيهم تادالافيل. يقع هذا التناول المتزامن، حيث أنه قد يؤدي إلى انخفاض من عرضي . وريدكيس®، دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (أي ارتفاع ضغط الدم في الرئتين) وارتفاع ضغط الدم الرئوي. الاستدادي التجليبي المزمن (أي ارتفاع ضغط الدم في الرئين الثاني لتجلب الدم). أظهرت مجلطات إنزيم فوسفوديستريز النوع الخامس من تادالافيل، زيادة التأثير الخافض للضغط لهذا الدواء. إذا كنت تتناول وريدكيس® أو لست متأكد من ذلك استشر طبيبك.

تحذيرات واحتياطات خاصة للإستعمال،

تحدث إلى طبيبك قبل أخذك ريدكيس®.
يجب أن تكون على علم بأن النشاط الجنسي ينطوي على مخاطر محتملة للمرضى المصابين بأمراض القلب لأنه ينطوي ضمنها انخفاضاً على قلبك، إذا كان لديك مشكلة في القلب، فليكن أن تخبر طبيبك.

فقط مع ريدكيس® ٥؛

حيث أن تضخم البروستات الحميد و سرطان البروستات قد تكون لهم نفس الأعراض، سيقيم طبيبك بالتفحص من وجود سرطان البروستات قبل بدء علاج تضخم البروستات الحميد باستخدام تادالافيل. تادالافيل لا يعالج سرطان البروستات.
قبل أخذك لأقراص، أخبر طبيبك إذا كان لديك:
- فقر الدم المتجلي (خلل في خلايا الدم الحمراء).
- المايلوما المتعددة (سرطان نخاع العظم).

- لوكيميا (سرطان الدم).

- أي تشوه في القضيب.

- مشكلة خطيرة في الكبد.

- مشكلة خطيرة في الكلى.

- من غير المعروف ما إذا كان تادالافيل فعال في المرضى الذين:

- خضعوا لعملية جراحية في الحوض

- إستئصال كل أو جزء من غدة البروستات، والتي تقع فيها أعصاب البروستات (استئصال البروستات الجذري غير العصبي).

- إذا واجهت تضخم مجاز في الغدة أو قناتها، توقف عن تناول ريدكيس® واتصل بطبيبك على الفور.

لا يؤسسى باستخدام ريدكيس® من قبل النساء والأطفال والمراهقين دون سن ١٨ عاماً.

الخصوبة،

عندما علاج الكلاب، لوحظ انخفاض في نمو الحيوانات المنوية في الخصيتين. لوحظ تناقص في الحيوانات المنوية لدى بعض الرجال. من غير المرجح أن تؤدي هذه الآثار إلى فقدان الخصوبة.

القيادة وإستعمال الآليات،

عائش بعض الرجال الذين تناولوا تادالافيل في الدراسات السريرية من حدوث دوخة. تحقق بعناية كيف تتفاعل مع الدواء قبل القيادة وإستعمال الآلات.

يحتوي ريدكيس® على الكافور. إذا كان لديك تعصب لبعض السكريات، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا العلاج.

الإستعمال خلال فترتي الحمل والرضاعة،

تادالافيل ليس محسناً للاستخدام من قبل النساء.

التداخلات الدوائية،

يرجى إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

يجب عدم تناول ريدكيس® إذا كنت تأخذ النترات. حيث أن بعض الأدوية قد تتأثر بالرديكيس®، أو قد تؤثر هي بدورها على ريدكيس®. أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ بأفمل:
- مثبطات مضخات أمي (يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض البولية المسببة لتضخم البروستات).

- أدوية أخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

- ريدكيس®

- مثبطات ٥ ألفا ريداكيتز (تستخدم لعلاج تضخم البروستات الحميد)

- أدوية مثل نيتروجليزول (لإزالة التهابات الأنفخية) ومثبطات إنزيم البروتياز لعلاج عدوى الإيدز أو فيروس نقص المناعة المكتسبة.

- الفينوباربيتال، الفينيتوين وكاربامازيبين (أدوية مضادة للتشنج).

- ريفاميسين، الأريثروميسين، كلاريثروميسين أو إيتراكونازول.

- أدوية أخرى لعلاج عدم القدرة على الإنجاب.

الأشياء والتحول،

قد يؤثر عسر الكبد على فعالية ريدكيس® ويجب أن يؤخذ بعذر. تحدث إلى طبيبك لأزيد من المعلومات. شرب الكحول قد يخفض ضغط الدم بشكل مؤقت. إذا كنت قد تناولت أو خملت لتناول ريدكيس® فإنه يجب عليك تجنب الإفراط في شرب الكحول (مستوى الكحول في الدم من ٠,٨٪ أو أعلى)، حيث أن هذا قد يزيد من خطر حدوث دوخة عند الوفوف.

الآثار الجانبية غير الشريفة بها، مثل جميع الأدوية، فإن ريدكيس® قد يسبب آثار جانبية، وإن كانت لا تصيب الجميع. هذه الآثار عادة ما تكون خفيفة إلى متوسطة في شديتها.

إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية، أوقف استخدام العلاج واطلب المساعدة الطبية على الفور:

- ضلالت الحواسيس بما في ذلك الطعم المعدني (آثار جانبية غير شائعة).

- ضلالت البصر، لا تستخدم النترات وكل ما طلب مساعدة طبية فورية (آثار جانبية غير شائعة).

- الإنجاب افتقرت إلى طويلة، وربما مؤلمة بعد تناول تادالافيل (تأخر الحدوث).

إذا كان لديك مثل هذه الآثار، والتبص، والتي يستمر بشكل مستمر لأكثر من ٤ ساعات يجب عليك الاتصال بالطبيب فوراً.

- فقدان مفاجئ للرؤية (تأخر الحدوث).

تم الإبلاغ عن آثار جانبية أخرى:

آثار جانبية شائعة (١ من ١٠ إلى ١٠٠ مرير)

صداع، ألم في العضلات، آلام في الصدر، والذراعين والساقين، إحمراء الوجه، إحتقان الأنف، عسر الهضم، إرتجاع.

آثار جانبية شائعة (١ من ١٠ إلى ١٠٠ مرير)

الدوخة، ألم في العانة، عدم وضوح الرؤية، ألم في العين، زيادة التعرق، صعوبة في التنفس، نزف القضيب، وجود دم في السائل المنوي / أو البول، شعور بقوة ضربات القلب، سرعة دقات القلب، ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض ضغط الدم، نزيف الأنف، طنين في الأذنين.

آثار جانبية نادرة (١ من ١٠٠ إلى ١٠٠٠٠ مرير)

إغماء، نوبات مصحبة وفقدان ذاكرة عابر، تورم في الجفون، إحمراء في العينين، انخفاض أو فقدان السمع المفاجئ، الشرى (يرفع حمراء وحكة على سطح الجلد).

وتنادوا ما تم الإبلاغ عن نوبات قلبية وسكتة دماغية في الرجال الذين يتناولون تادالافيل. ولكن معظم هؤلاء الرجال قد عانوا من مشاكل في القلب قبل تناول هذا الدواء. وتنادوا ما تم الإبلاغ عن تضشان أو فقدان جزئي، وموت أو دائم للبصر في إحدى أو كتنا العينين. وقد تم الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية الاضافيه النادرة الحدوث والتي لم تشاهد في التجارب السريرية. في الرجال الذين يتناولون تادالافيل، وتشمل هذه الآثار:

الصداع النصفي، تورم في الوجه، تفاعلات الحساسية الخطرة التي يؤدي إلى تورم في الوجه أو الحلق، طفح جلدي خطير، بعض المضغروبات التي تؤثر على تدفق الدم إلى العينين، عدم انتظام ضربات القلب، الذبحة الصدرية، موت مفاجئ للقلب. تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية، الذبحة والإسهال بشكل متكرر أكثر في الرجال الذين يتناولون تادالافيل بمر اكبر من ٧٥ سنة.

الإفراط في الجرعة،

إذا تناولت ريدكيس® أكثر مما يجب: أخبر الطبيب بذلك.

الخواص الدوائية،

ينتمي ريدكيس® إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات إنزيم فوسفوديستريز نوع ٥. يعمل ريدكيس® بعد التحفيز الجنسي عن طريق المساعدة في إسترخاء الأوعية الدموية في القضيب، والسماح بتدفق الدم إلى القضيب، ونتيجة لهذا تم تحسين وظيفة الإنجاب.

ظروف التخزين،

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ °م.

Dimensions: 15 x 24 cm

Pantone Black C

Prep Date: June 2019
F-Remed-IDC-UM-H041

هذا دواء

- استمعرض بوزور على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات بما يخص
- ابع بقاء وصفه الطبيب وبعثه للاستعمال المنصوص عليها وبعثها للصيادلة الذي صرفها لك
- الى الطبيب والصيادلة هما الذين يجران البعاه وبعثه وصربه
- لا تضع دمه العلاج الجوده لك من لغاه نفسك.
- لا تحرق صرفه، ادمه يوم وصفه طبيه.
- اخذ صرفه بعينها عن متناول الأطفال.

ضلعى وراء الحصة العبريه

فاده الصيادلة العبريه

PHARMA

Total Quality

حركة التلقم للصناعات الدوائية، صellan - الأردن