

## 135 ملجم في صورة أقراص مغلفة بطبقة رقيقة 200 ملجم في صورة كبسولات ممتدة المفعول مبيبرين هايدرو كلورايد

- أولاً كل ما يهذه النشرة بمثابة دليل أن تبدأ تناول هذا الدواء
- استفظ هذه النشرة، وقد تحتاج إلى قراءتها مرّة أخرى.
  - إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، اسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.
  - هذا الدواء ليس بوصفه مثلاً، لا يمكن للأخرين، فقد يفرضهم حتى لو كانت أعراضهم هي نفس أعراضك.
  - إذا لاحظت أن من الآثار الجانبية هذا الدواء أصبحت حساسية، أو لاحظت ظهور أي أعراض جانبية لم ترد في هذه النشرة، فضلاً عن طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

### أهم النشرة تحوي على ما يلي:

1. ما يجب معرفته و يجب استخدامه
  2. ما يجب مراعاته قبل تناول فبرين
  3. كيفية تناول فبرين
  4. الأعراض الجانبية المحتملة الحادوث
  5. كيفية حفظ فبرين
  6. معلومات إضافية
- أدوية النشرة تحوي على ما يلي:
1. ما هو فبرين و يجب استخدامه
  2. ما يجب معرفته و يجب استخدامه
  3. كيفية تناول فبرين
  4. الأعراض الجانبية المحتملة الحادوث
  5. كيفية حفظ فبرين
  6. معلومات إضافية

يحوي فبرين على مبيبرين هايدروكلورايد، وهو ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مضادات الشنج تستخدم هذا الدواء لعلاج أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، ومشاكل مماثلة مثل القولون المزمن، والإسماك الشنجية، والتهاب القولون المخاطي والتهاب القولون الشنجي.

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة جداً والتي تتسبب تشنج وآلام في الأمعاء.

الأعراض عادة من أربوع عظمى طويل الأمد، يمر الغذاء خلاله بحيث يتم هضمه. إذا بدأت الأمعاء في التشنج والضغط بإحكام جداً، مما يؤدي إلى الشعور بالألم، الطريقة التي يحل هذا الدواء، يتم من خلال التخفيف من تشنج الأمعاء وألم وأعراض أخرى من القولون العصبي.

**أهم أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) ما يلي:**

- آلام وتشنج في المعدة.
- الشعور بالانتفاخ ووجود بياح.
- وجود إسهال (مع أو بدون الإمساك).
- براز صلب صلب مثل الكرية أو مثل الشرطيف الصغير (البراز).
- قد تختلف هذه الأعراض من شخص لأخر.

تحدث في أغلب الحالات إذا كانت هذه الأعراض لا تتحسن بعد فترة من الوقت، إذا ظهرت أعراض جديدة أو كنت تشعر بالقلق إزاء الأعراض الخاصة بك

قد يساعد النظام الغذائي الخاص بك وأسلوب الحياة أيضاً في علاج القولون العصبي:

تغيير النظام الغذائي الخاص بك بحيث يمدد على طريقة تأثير القولون العصبي IBS عليك. إذا وجدت أن بعض الأطعمة تزعجك، تجنبها.

فمن الطبيعي أن يأكل منها، وإذ نابع نظام غذائي على الألياف قد يساعد، ولكن أسأل الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

يعد بعض الناس أن تعلم الاسترخاء يمكن أن يساعد على تخفيف أعراضهم من القولون العصبي IBS. قد أنه قد من المفيد أن تستلقي بضع دقائق كل يوم للاسترخاء.

**1. ما يجب معرفته قبل تناول فبرين**

انتبه عند تناول فبرين في الحالات الآتية:

- إذا كان لديك حساسية من مبيبرين هايدروكلورايد أو أي من المكونات الأخرى (انظر فرقة 6 للحصول على قائمة المكونات).
- إذا كان أي من أعراضك يتعلق بحمل، لا تناول هذا الدواء وتحدث مع طبيبك أو الصيدلي.
- ينهي توشي الحظر عند تناول فبرين في الحالات الآتية:

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الدواء إذا:

- ظهرت عندك أعراض جديدة أو أصبحت الأعراض أكثر سوءاً.
- إذا كنت لديك مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلى.
- إذا كان أي مما سبق يتعلق بحملك (إذا كنت غير متأكد)، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

تناول فبرين مع الطعام والشراب

يمكنك شرب البيرة الخمر في حين كنت تتناول فبرين.

تناول أدوية أخرى

يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو أخذت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

الحمل والرضاعة الطبيعية

يجب عليك التحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول فبرين إذا كنت حاملاً أو قد تنصبي حاملاً. ليس هناك سوى معلومات محدودة بشأن سلامة مبيبرين أثناء الحمل. قد يصبح طبيبك بالتوقف عن تناول فبرين قبل أن تنصبي حاملاً أو في أقرب وقت تعلمين فيه أنك حاملاً. لا ينبغي استخدام فبرين أثناء الرضاعة الطبيعية.

قيادة واستخدام الآلات

ليس من المرجح أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات.

**2. ما يجب معرفته قبل تناول فبرين**

معلومات هامة حول مكونات بعض أقراص فبرين 135 ملجم المغلفة بطبقة رقيقة

أقراص فبرين 135 ملجم المغلفة بطبقة رقيقة تحوي على لاكتوز. إذا قال الطبيب أنك لا تستطيع تحمل أو هضم بعض السكريات (لديك تعصب لبعض السكريات)، تحدث مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

**3. كيفية تناول فبرين**

تناول دوائي فبرين كما أخبرك طبيبك. يجب عليك التحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

- حاول أن تتناول فبرين قبل الوجبة بمرتين فقط - معهن وليس تزيد أعراضهم بعد الأكل.
- ابتلع قرص أو كبسولة فبرين كاملة مع ماء. لا تقضم القرص أو الكبسولة.

الكيفية التي ينبغي تناولها من فبرين

أقراص فبرين 135 ملجم المغلفة بطبقة رقيقة:

- البالغين وكبار السن:
- تناول 1 قرص 3 مرات يومياً
- يمكن خفض عدد أقراص إذا كنت تشعر بتحسن الأعراض الخاصة بك
- لا تأخذ أكثر من 3 أقراص يومياً.
- كبسولات فبرين 200 ملجم ممتدة المفعول:
- البالغين وكبار السن:

الجرعة العادية كدواء كبسولة واحدة مرتين في اليوم

لا تعطي فبرين للأطفال ولرعايا الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً

**4. الأعراض الجانبية المحتملة الحادوث**

معظم الناس ليس لديهم مشاكل، ولكن قد يحدث لبعض الأشخاص الجانبية (الأعراض غير المرغوب أو وودو التعلل).

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض الجانبية الخطيرة توقف عن تناول فبرين واستشر الطبيب فوراً:

- صعوبة في التنفس، تورم في الوجه والرقبة واللسان أو الحلق (حساسية شديدة)
- أعراض أخرى تفلن تكون خطيرة. إذا كانت تزحمك تحدث إلى الصيدلي:
- الطفح الحاد، حكة جوارح في الجلد
- إذا أصبح أي من الأعراض الجانبية شديدة، أو لاحظت أي أعراض جانبية غير المذكورة هنا، من فضلك أخبر الصيدلي أو الطبيب.

**5. كيفية حفظ فبرين**

- تحفظ الدواء بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
- لا تستعمل أقراص فبرين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة والشرط بعد « EXP ».
- تحفظ فبرين في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.
- تحفظ في عبوة الأصلية

يجب عدم التخلص من الأدوية في مياه الجريان أو قمامة المنزل. أسأل الصيدلي كيف التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة لها. لأن هذه الإجراءات تستعمل على حماية البيئة.

**6. معلومات إضافية**

**علام تجنوبي فبرين:**

أقراص فبرين 135 ملجم المغلفة بطبقة رقيقة:

يجوي كل قرص مغلف بطبقة رقيقة على 135 ملجم مبيبرين هايدروكلورايد كدواء فعالة

كبسولات فبرين 200 ملجم ممتدة المفعول:

تحوي كل كبسولة ممتدة المفعول على 200 ملجم مبيبرين هايدروكلورايد كدواء فعالة

**والكبريات الأخرى هي:**

أقراص فبرين 135 ملجم المغلفة بطبقة رقيقة:

لاكتوز 200 BP، تلك الشذرة، بوفويدون 30، تلك مغنى وماغنسيوم سيترات

المواد المغلفة:

بوليسيرات 480، تلك مغنى، ثاني أكسيد التيتانيوم درجة فلراما، بولي إيثيلين جلايكول 6000 MW، وهيدروكسي بربويل سيثيل سييليلوز.

كبسولات فبرين 200 ملجم ممتدة المفعول:

السواغ:

جلايكول كابت-فبرين 200 ملجم

شكل وخصائص عبوة فبرين:

أقراص فبرين 135 ملجم المغلفة بطبقة رقيقة:

أقراص بيضاه إلى مائلة للنباح مستديرة، ذاتية الشاوية مغلفة بطبقة رقيقة (179 على جانب واحد وخال من الخرفعة على الجانب الآخر).

تحوي كل عبوة على 30 قرص مغلف بطبقة رقيقة

كبسولات فبرين 200 ملجم ممتدة المفعول:

حجم رقم 6، كبسولة جيلانتية قوية لها غموم متوسط يرتقال ممتهم وغطاء فبرومي معتم تجنوبي على كبريات صفراء ممتطع. مطبوع على الكبسولة « VERINE 200 mg » على كلا الجانبين.

تحوي كل عبوة على 30 كبسولة ممتدة المفعول

**مالك الحقول التسويقية والمنتج**

**الدوائية**

صنع الأدوية بالتحصيم

الشركة السعودية للخدمات الدوائية والمستلزمات الطبية.

المملكة العربية السعودية

**تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ يونيو 2014.**

©فيرين® علامة تجارية  
34VE951

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

– المركز الوطني للتبليغ والسلامة الدوائية:  
فاكس: +966 11 2057682  
للتواصل بالأدوية التسمية للتبليغ وإدارة الأزمات.  
هاتف: +966 11 2038222  
مخبرية: 2344-2345-2317-2356-2353-2340

اتفاق الحجابي: 8002490000  
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfga.gov.sa  
الموقع الإلكتروني: npc.afsfa.gov.sa/npc

**إن هذا الدواء**

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعد خطراً.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإسعال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

الطبيب والصيدلاني هما الحريان بالأدواء ويضعونه وفهرده.

لا تقطع الدواء المجدد لك من تلقاء نفسك.

لا تحزر صرف الأدوية بدون وصفة طبية.

**لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال**

عيس وزراء الصحة العرب  
وإخاء الصيدالة العرب