

Composition

Albothyl est un produit de condensation d'acide métacrésolsulfonique et de formaldéhyde.

Lg de Concentré contient 360 mg of d'Albothyl
 1 Ovule contient 90 mg of d'Albothyl
 1 Gél contient 18 mg of d'Albothyl

Mécanisme d'action

Albothyl agit sélectivement au niveau des tissus morts ou pathologiquement altérés, provoquant leur coagulation et leur élimination subséquente. L'épithélium pavimenteux sain n'est pas affecté par Albothyl.

En contact direct avec les germes, Albothyl détruit la flore pathogène mixte dans le vagin (bactéries, trichomonas, champignons) mais préserve, dans une large mesure, les bacilles de Döderlein. Albothyl rétablit l'acidité physiologique du vagin; les plaintes subjectives telles que prurit et leucorrhées décroissent rapidement. De plus Albothyl possède des propriétés bactéricides, fongicides, astringentes et hémostatiques puissantes. La formation de tissu épithélial est favorisée par l'hyperémie réactive qui se produit dans la région traitée et par la stimulation de la granulation du tissu normal. Albothyl ne produit ni sensibilisation ni résistance.

Indications

Gynécologie

Vaginite, leucorrhées vaginales et cervicales (et aussi celles provoquées par les vaginites à trichomonas et les candidoses), ectopies du col utérin avec processus inflammatoires et érosions vraies, cervicites, hémorragie après biopsies et élimination de polypes cervicaux, érosions externes et papillomes de l'urètre, condylomes acuminés, irritations dues au port de pessaires, traitement après électrocoagulation visant à activer la régénération. Prophylaxie des mastites (cautérisation de fissures).

Chirurgie

Albothyl arrête les hémorragies capillaires locales et accélère l'élimination de tissu nécrotique après brûlures et autres lésions.

Dermatologie

Brûlures sévères: nettoyage et stimulation de la régénération. Escarres de décubitus, ulcères cruraux, aphtes, condylomes acuminés etc.

Oto-rhino-laryngologie

Tamponnement d'aphtes, stomatite et gingivite, excès de granulation (prolifération) et polypes après interventions chirurgicales radicales; nécroses, proliférations et eczemas du conduit auditif. Hémorragie après amygdaléctomie et epistaxis (saignement du nez).

Posologie et mode d'emploi

Les présentations différentes d'Albothyl permettent des traitements variés. Le traitement combiné par plusieurs présentations d'Albothyl s'est révélé très efficace.

Albothyl Concentré

Usage vaginal

Appliquer le concentré non dilué surtout pour l'attouchement, fait par le médecin, des lésions tissulaires superficielles et profondes du col utérin ainsi que du canal cervical. Faire l'attouchement 1-2 fois par semaine à l'aide d'un colposcope, d'une pince à pansements et d'un tampon. Avant d'attoucher il est recommandé de nettoyer le canal cervical ainsi que le col utérin pour les débarrasser des mucosités. Ensuite on appuyera un tampon imprégné de concentré sur la lésion, pendant 1-3 minutes, en exerçant une légère pression. Enfin on peut débarrasser le lieu tamponné des résidus de concentré, bien que ce ne soit pas toujours nécessaire. La thérapeutique peut être continuée, pendant les intervalles du traitement par attouchement, par de ovules ou du gel.

Pour les irrigations vaginales il faut diluer Albothyl concentré par 1 à 5 fois son volume d'eau.

Usage externe

En chirurgie et dermatologie (traitement de brûlures ou hémorragie locale), le concentré Albothyl est appliqué directement: moyennant un tampon de coton ou de gaze; l'on peut aussi l'administrer par aerosol.

Albothyl Ovules

Pendant une période de 1 ou 2 semaines, introduire 1 ovule profondément dans le vagin, tous les deux jours avant le coucher. Elles peuvent constituer l'unique médication ou un traitement complémentaire dans les intervalles entre les cautérisations par le concentré Albothyl. Avant l'application, les ovules devraient être trempés dans de l'eau. Il est recommandé d'arrêter le traitement pendant les règles.

Albothyl Gel


Usage externe:

Selon avis du médecin.

Le gel Albothyl est appliquée, par une spatule ou un tampon de gaze, sur la région à traiter.

Usage vaginal avec applicateur:

A la place des ovules on peut aussi appliquer du gel - tous les deux jours pendant une durée de 1 ou 2 semaines. Utilisez l'applicateur compris dans l'emballage pour introduire le gel dans le vagin.



1. Visser l'applicateur (a) sur le tube (b) 1
2. Comprimer le tube (b) afin de remplir l'applicateur.
3. Dévisser l'applicateur et l'introduire profondément dans le vagin.
4. Vider l'applicateur à l'aide du piston (b).
5. Rincer l'applicateur sous l'eau courante après usage.

Remarque

Pendant le traitement par Albothyl, le processus de guérison - à savoir la coagulation désirée et l'expulsion subséquente de tissu nécrotique - est activé énergiquement. L'élimination de ce tissu par le vagin, qui est l'un des caractéristiques de cette préparation - est souhaitable et ne doit pas alarmer la patiente.

Après le traitement gynécologique par Albothyl, la patiente devrait utiliser une bande hygiénique afin de protéger les vêtements et sous-vêtements.

Après l'utilisation, les instruments etc. devraient être immédiatement lavés à l'eau. L'on évitera le contact d'Albothyl avec les vêtements.

Lors de l'application d'Albothyl sur la muqueuse buccale il faut tenir compte de l'influence sur l'émail dentaire à cause de l'acidité prononcée. Pour cela, il est indispensable de se rincer la bouche soigneusement après le traitement à l'Albothyl.

Pendant le traitement il faut éviter le lavage avec des savons irritants et s'abstenir des rapports sexuels. Albothyl doit être conservé à l'abri de la chaleur.

Attention

Pendant le traitement par Albothyl, aucun autre médicament local ne doit être appliqué sur les régions affectées.

Présentation

Albothyl Concentré Flacons de 25 et de 100 ml - Albothyl Gel Tube de 20 g et 50 g (avec applicateur), Tube de 20 g (sans applicateur) - Albothyl Ovules Emballages de 5 et 10 ovules

Byk Guident Konstanz

Allemagne occidentale

3683/AS/HKS51/NOSTAL 17/7.5