

Adenecor[®] 3mg/ml

محلول للحقن

أدينوكور[®] 3 مل/مل

أدينوزين

معلومات تقنية حول إعطاء أدينوكور 3 مل/مل محلول للحقن

الاسم التجاري

أدينوكور

التراكيب النوعية والكمية

تحتوي كل فارورة على 3 ملغ من الأدينوزين في 2 مل (3 مل/مل).
بالنسبة للسراخ، راجع الفقرة لائحة السواخ.

الشكل الصيدلاني

محلول للحقن.

محلول صاف لا لون له.

المقايير وطريقة الإعطاء

أدينوكور مخصص للاستعمال فقط في المستشفى مع تأمين وجود أجهزة للترقية والإنعاش القلبي التنفسي يعطى كبلعة عن طريق الحقن السريع داخل الوريد وفقاً لبرنامج تصاعد الجرعات المذكور أدناه للتأكد من وصول المحلول إلى الدورة الدموية، يجب إعطاء الدواء إما مباشرة داخل الوريد أو من خلال مسار وريدي في حال إعطائه في مسار وريدي يجب حقنه الأكثر قرماً على أن يتم الحقن محقنة ملحية سريعة. يجب استعمال أدينوكور فقط في حال وجود أجهزة لمراقبة القلب.

Adenecor[®] 3mg/ml

محلول للحقن

أدينوكور[®] 3 مل/مل

أدينوزين

اقرأ جيداً هذه الفقرة باكملها قبل استعمال هذا الدواء

احتفظ بهذه النشرة، قد تكون بحاجة لإعادة قراءتها

إن كان لديك أسئلة أخرى، اسأل المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني

في حال تعاقم إحدى التأثيرات غير المرغوبة، أو لاحظت تأثيراً غير مرغوب لم يتم ذكره في هذه النشرة، أبلغ طبيبك أو الصيدلاني بذلك

محتوى هذه النشرة:

1. ما هو أدينوكور وما هي دواعي استعماله

2. قبل استعمالك أدينوكور

3. كيف يعطى أدينوكور

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

5. كيف يحفظ أدينوكور

6. معلومات إضافية

1. ما هو أدينوكور وما هي دواعي استعماله

أدينوكور مادة الأدينوزين.

وهو من زمرة الأدوية التي تسمى "مضادات الانظمة".
يعمل أدينوكور على إعطاء عملية التوصيل الكهربائي بين القسم العلوي والسفلي من القلب. ويقوم بإبطاء معدل ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة التي تسمى الانظمة.

يستعمل أدينوكور:

- خلال التشخيص وهذا يساعد الأطباء على تحديد نوع الانظمة (عدم انتظام معدل ضربات القلب).

- لتبطيع ضربات القلب إن كان المريض يعاني من الانظمة التي تسمى "تسرع القلب الانشعابي فوق البطيني" أو "متلازمة ولف باركنسون وايت".

2. قبل استعمالك أدينوكور

ينبغي عدم أخذ هذا الدواء ويجب إعلام الطبيب في الحالات التالية:
إن كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) للأدينوزين أو غيره من مكونات أدينوكور (الواردة في القسم 6 أتياء) أعراض وجود حساسية تشمل الطفح الجلدي، حرق في البلع أو التنفس، تورم الشفتين أو الوجه أو الحلق أو السان.

إن كنت مصاباً بآثار أو غيرها من اضطرابات التنفس الشديدة،

إن كنت تتناول من انخفاض في ضغط الدم (نقص ضغط الدم).

إن كنت تعاني من قصور في عمل القلب (عدم ضخ كمية كافية من الدم).

إن كنت تشكو من اضطرابات في ضربات القلب وغير مزود بناتظة

إيقاع للقلب (درجة ثانية أو ثالثة من إحصار أديني بطني، متلازمة العقدة الجيبية المريضة).

إذا تم تشخيص متلازمة QT الطويلة إنها عرض قلبي نادر يمكن أن يؤدي إلى تسارع دقات القلب والإغماء.

لا يجب إعطاء هذا الدواء في حال كنت تعاني من إحدى الحالات المذكورة أعلاه في حال ذلك، يجب مراجعة الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني قبل استعمالك أدينوكور.

يجب الاحتراز مع أدينوكور

يجب مراجعة الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني قبل استعمالك أدينوكور في الحالات التالية:

- نظم قلبي غير عادي (رجفان أديني أو فرقة أدينية) وبالتحديد إذا كنت تعاني من "مسار توصيل إضافي".

- اضطراب في القلب حيث يشغل تعريض وإعادة شحن الدفعة الكهربائية في أجزاء من القلب وقتاً أطول من الطبيعي (فترة QT الطويلة).

- نقص حجم الدم ولم يتم معالجته بفعالية كافية بالدواء.

- اضطرابات في جزء من جهازك العصبي المسمى "جهازك العصبي المستقل".

- ضيق الشرايين الأساسية في العنق (الشريان السباتي) هذا يعني أن كمية الدم التي تنسج إلى الدماغ غير كافية (نقص الدمحي الوعائي).

- احتمال التعرض أو سبق التعرض لنواتج أو اختلاجات،

- معوية في التنفس (تنفس قصبي).

- مرض في القلب بسبب ضيق صمامات القلب (أمراض القلب الناتجة عن تضيق الصمام).

- التهاب النضام المحيط بالقلب (التهاب القامور) أو تشكك سائل حول القلب (انصباب تاموري).

- وجود تمزقة من التمسار إلى الجبين في القلب مما يعني أن الدم ينتقل مباشرة من الجهة اليسرى من القلب إلى الجهة اليمنى.

- ضيق الشريان الأيسر الأساسي الذي يغذي القلب بالدم (تضييق ناجي يساري).

لا يجب إعطاء جرعات إضافية إذا حدث لدى المريض إحصار أديني بطني مع جرعة معينة

الجرعة العلاجية

البالغون

- الجرعة الأولى: 3 ملغ تعطى كبلعة سريعة في الوريد (على مدى ثانيتين).

- الجرعة الثانية: إذا لم تزيل الجرعة الأولى تسرع القلب خلال دقيقة أو دقيقتين تعطى جرعة ثانية من 3 ملغ كبلعة سريعة في الوريد.

- الجرعة الثالثة: إذا لم تزيل الجرعة الثانية تسرع القلب خلال دقيقة أو دقيقتين تعطى جرعة ثالثة من 3 ملغ كبلعة سريعة في الوريد.

- ينصح بعدم إعطاء جرعات إضافية أو أكبر حجماً

الأطفال

لا توجد دراسة صيغية حول إعطاء هذا الدواء للأطفال.

تظهر الدراسات غير الصيغية أن فاعلية الأدينوزين كانت مماثلة لدى البالغين والأطفال الجرعات الفعالة لدى الأطفال تراوحت بين 0.0375 و0.25 ملغ/كغ.

المسنون

راجع الجرعات الموصى بها للبالغين

الجرعة الشفوية

يجب تطبيق برنامج الجرعات التصاعدي المذكور أعلاه إلى حين الحصول على معلومات تشخيصية كافية.

طريقة إعطاء الدواء: حقنة سريعة داخل الوريد فقط

- الإصابة بمنزلة قلبية أو قصور قلبي وديم أو القصوع لعملية رذخ قلب خلال العام المنصرم.

- وجود أية مشكلة بسببة في القلب (إحصار أديني بطني أو إحصار العذبة من الدرجة الأولى). قد تتفاقم هذه الحالات مؤقتاً لدى إعطاء أدينوكور.

إذا تراجع معدل دقات القلب لديك إبطاء قلبي شديد، أو في حال توقف التنفس، أو مشكلة في القلب قد تسبب الوفاة (توقف الانقباض)، أو أرجاع حادثة في الصدر (إدخمة)، أو في حال انقباض كبير في ضغط الدم، يجب وقف المعالجة بأدينوكور على الفور. إذا كنت غير واثق من تطابق إحدى هذه الحالات عليك راجع الطبيب أو الممرضة ليل استعمالك أدينوكور.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

يجب إعلام الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي اشتريتها من دون وصفة أو أدوية الأعشاب. بأدينوكور قد يؤثر على معالجة بعض الأدوية الأخرى. وقد تؤثر أدوية أخرى على فعالية أدينوكور.

يجب مراجعة الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أحد ديه الأدوية.

- ديبيريديسول (دواء لتسريع الدم) احرص على إبلاغ الطبيب قد يقرر عدم إعطائك أدينوكور أو تخصيص الجرعة.

- أمينوفيلين أو توفيلين (أدوية تساعد على التنفس).

- كافيون (موجودة أحياناً في الأدوية المضادة للسعال).

استعمال أدينوكور مع الكحول والشراب

يجب عدم تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة والتبوكولاتة والكولا على الأقل قبل 12 ساعة من استعمال أدينوكور.

الحمل والإرضاع

راجع الطبيب قبل استعمال أدينوكور في هاتين الصالتيين.

- الحمل: توقع الحمل أو الثلث بوجود حمل، لا يجب تناول أدينوكور خلال الحمل إلا إذا كانت الضرورة القصوى تحتم ذلك.

- الإرضاع: يفضل عدم تناول أدينوكور خلال الإرضاع.

يجب استشارة الطبيب أو الممرضة قبل تناولك أي دواء في حال الحمل أو الإرضاع.

معلومات مهمة حول بعض مكونات أدينوكور

المسود يوم 3.54 ملغ من المسود يوم في الجرعة الواحدة (7.08 ملغ/2 مل)، يجب أخذها بعين الاعتبار إذا كان المريض يخضع لحماية من المسود يوم.

3. كيف يعطى أدينوكور

- أدينوكور دواء مخصص للإعطاء في المستشفى.

- يتم إعطاءه من قبل الطبيب أو الممرضة بحقنه في الوريد.

- يتم مراقبة حالة القلب وضغط الدم عن كثب.

ما هو حجم جرعة أدينوكور

في حال عدم تذكرك من سبب إعطائك أدينوكور أو إن كانت لديك أسئلة عن حجم الجرعة المعطاة لك، راجع الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني

البالغون (وأحياناً المسنون)

- الجرعة الأولى: 3 ملغ على مدى ثانيتين. يتم إعطائها عن طريق الحقن السريع في الوريد.

- إذا لم تنظم الجرعة الأولى ضربات القلب تعطى جرعة ثانية من 3 ملغ عن طريق الحقن السريع في الوريد.

- إذا لم تنظم الجرعة الثانية ضربات القلب تعطى جرعة ثالثة من 3 ملغ عن طريق الحقن السريع في الوريد.

- يجب أن لا تعطى جرعات إضافية بعد جرعة الـ 3 ملغ

الأطفال

يقرر الطبيب المختص في المستشفى ما إذا كان هذا الدواء ضرورياً وحجم الجرعة.

إذا أعطيت أدينوكور أكثر مما يجب

طالما أن الطبيب أو الممرضة هما من يعطى الدواء إن احتمال حصولك على جرعة مفرطة مستبعد. بعدم الطبيب بدقة كمية الجرعة الضرورية بما أن فترة بقاء أدينوزين في الدم قصيرة، تزول التأثيرات الجانبية للجرعة الزائدة بسرعة عند وقف الحقن. أحياناً قد تشاح إلى خفنة من دواء يسمى سينوفيلين أو توفيلين لمعالجة التأثيرات الجانبية

إذا كان لديك أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، راجع الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

على عرار كافة الأدوية. قد يسبب أدينوكور تأثيرات جانبية إلا أن ذلك لا ينطبق على الجميع. قد تحدث بعض هذه التأثيرات الجانبية أثناء معالجتك بأدينوكور.

حامل رخصة التسويق
sanofi-aventis
One Onslow Street
Guildford, Surrey, GU1 4YS - UK
رقم رخصة التسويق
PL 11723/0005

خصائص صيدلانية
لائحة السواغ
كلوريد الصوديوم
ماء لمستحضر للحقن
التفاعلات الدوائية
بيانات عن التداخلات الدوائية غير متوفرة.
صلاحية الدواء
لا يجب استعمال الدواء بعد انتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العلبة
يجب التخلص من محتويات القارورة التي لم تستعمل في حينها.
احتياطات خاصة بالحفظ
لا يجب تبريد الدواء
يجب حفظه في حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.
طبيعة ومحتويات العلبة
قارورة زجاجية شفافة من النوع الأول مع سدادة مطاطية من
الكلوروبوتيل محكمة الإغلاق بغطاء من الألمنيوم عمود من 6 قوارير
على حامل بلاستيكي في علبة من الكرتون السميك.
تعليمات حول الاستعمال
لا توجد تعليمات

3

حامل رخصة التسويق والمصنع
حامل رخصة التسويق
sanofi-aventis
One Onslow Street
Guildford, Surrey, GU1 4YS - UK
المصنع
SANOFI-AVENTIS, S.A.
Avenida de Leganes, 62
28925 ALCORCON (Madrid)
Spain

لا تحوي هذه النشرة كافة المعلومات عن الدواء، إذا كان لديك
أخرى أو في حال شك، يجب مراجعة الطبيب أو الممرضة.

تاريخ آخر مراجعة لهذه النشرة هو آذار 2009

في حال تفاقم إحدى هذه التأثيرات الجانبية، راجع الطبيب أو
الممرضة. قد تحتاج لإيقاف الحقن.
تزول التأثيرات الجانبية عادة خلال ثوان أو دقائق بعد انتهاء الحقن.
لكن يجب إعلام الطبيب أو الممرضة في حال حدوث أي منها.
تأثيرات شائعة جدا (تصيب أكثر من شخص من بين 10 أشخاص)
- احمرار الجلد مع الاحساس بحرارة،
- تباطؤ ضربات القلب،
- عدم انتظام دقات القلب،
- غلة قلبية تسمى "أحصار أذيني بطيني"،
- مشاكل قلبية وخفيفة قد تسبب الوفاة (سكتة قلبية) أو عدم انتظام
ضربات القلب،
- انقطاع التنفس أو ضيق التنفس،
- ألم أو ضغط في الصدر،
تأثيرات شائعة (تصيب أقل من شخص من بين 10 أشخاص)
- الدوار،
- الغثيان،
- الصداع،
- احساس جلدي غريب كالحروق،
- العصبية
تأثيرات غير شائعة (تصيب أقل من شخص من بين 100 شخص)
- عدم وضوح الرؤية،
- الشعور بنبضات القلب أو الاحساس بسرعتها،
- طعم حديد في الفم،
- التنفس بشكل أسرع أو أعمق من الطبيعية (فرط التهوية)،
- الشعور بضغط في الرأس أو ثقل في الذراعين،
- الانزعاج أو الضعف أو الألم،
- التعرق

تأثيرات نادرة (تصيب أقل من شخص من بين 10 آلاف شخص)
- انقطاع التنفس الشديد أو اضطرابات في التنفس،
- احمرار أو ألم أو تورم في منطقة الحقن،
- الانزعاج خلال الحقن،
- تفاقم فرط ضغط الدم مع ارتفاع الضغط الدماغى،
- نبضات قلب بطيئة جدا أو سريعة أو عدم منتظمة،
- بطن قلب وجع
تأثيرات جانبية أخرى
- الإغماء،
- نوبات (اختلاجات)،
- التقيؤ،
- انقطاع التنفس

في حال ساءت إحدى هذه التأثيرات الجانبية يجب مراجعة الطبيب أو
الممرضة قد تحتاج الأمر لإيقاف الحقن. تزول التأثيرات الجانبية عادة
خلال ثوان أو دقائق بعد انتهاء الحقن. لكن يجب إعلام الطبيب أو
الممرضة في حال حدوث أي منها.
في حال لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة عليك
بمراجعة الطبيب أو الممرضة.

5. كيف يحفظ أدينوكور
يحفظ الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني بهذا الدواء في مكان آمن بعيداً
عن متناول الأطفال وبصرهم يجب عدم استعمال أدينوكور بعد انتهاء
مدة الصلاحية المدونة على العلبة
يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر المذكور
لا يجب تبريد أدينوكور. يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.
الدواء مخصص لاستعمال وحيد، ويجب استعماله فور فتحه إن أي
جزء يبقى من الدواء بعد الاستعمال يجب التخلص منه
لا يجب استعمال أدينوكور إذا لاحظ الطبيب أو الممرضة وجود شوائب
في المحلول أو تغيير في لونه قبل إعطاء الدواء. في حال تغير مظهر
الدواء، يجب رمي القارورة
يجب عدم رمي الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية
الصيدلاني سوف يتخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة وفقاً للتدابير
المتبعة. إن هذه الإجراءات تحمي البيئة.

6. معلومات إضافية
محتويات أدينوكور
العنصر الفعال هو الأدينوزين. تحوي كل قارورة أدينوكور سعة 2 مل
على 6 ملغ من الأدينوزين (3 ملغ/مل)
المكونات الأخرى هي كلوريد الصوديوم وماء لمستحضر للحقن.
شكل أدينوكور ومحتويات العلبة
أدينوكور محلول صاف لا لون له مخصص للحقن.
تحوي كل علبة 6 قوارير.