

# Ciprofloxacine arrow®



500 mg

comprimé pelliculé sécable

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antibiotique antibactérien de la famille des quinolones, c'est une fluoroquinolone.

CIPROFLOXACINE ARROW est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. La substance active est la ciprofloxacine. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

### Chez l'adulte

CIPROFLOXACINE ARROW est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- infections des voies respiratoires,
- infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus,
- infections urinaires,
- infections des testicules,
- infections des organes génitaux chez la femme,
- infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales,
- infections de la peau et des tissus mous,
- infections des os et des articulations,
- traitement des infections chez les patients présentant une diminution importante du taux de globules blancs (neutropénie),
- prévention des infections chez les patients présentant une diminution importante du taux de globules blancs (neutropénie),
- prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*,
- exposition à la maladie du charbon.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique supplémentaire pourra vous être prescrit en complément de CIPROFLOXACINE ARROW.

### Chez l'enfant et l'adolescent

CIPROFLOXACINE ARROW est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose,
- infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite),
- exposition à la maladie du charbon.

CIPROFLOXACINE ARROW peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable ?

**Ne prenez jamais CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable si :**

- vous êtes allergique (hypersensible) à la ciprofloxacine, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable (voir rubrique 6) ;
- vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

**Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable :**

**Avant de prendre CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable :**

Prévenez votre médecin si :

- vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;
- vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
- vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que CIPROFLOXACINE ARROW ;
- vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) ;
- vous avez des antécédents de trouble du rythme cardiaque (arythmie).

**Pendant la prise de CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable :**

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par CIPROFLOXACINE ARROW. Votre médecin déterminera si le traitement par CIPROFLOXACINE ARROW doit être interrompu.

- **Réaction allergique sévère et soudaine** (réaction/choc anaphylactique, œdème de Quincke). Dès la première dose, il existe un faible risque de survenue de réaction allergique sévère, se manifestant par les symptômes suivants : oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou évanouissements, ou vertiges lors du passage en position debout. **Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre CIPROFLOXACINE ARROW car votre vie pourrait être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin.**

- **Des douleurs et gonflements des articulations et des tendinites** peuvent se produire occasionnellement, en particulier si vous êtes âgé(e) et si vous êtes également traité(e) par des corticostéroïdes. Au moindre signe de douleur ou d'inflammation des articulations ou des tendons, arrêtez de prendre CIPROFLOXACINE ARROW et mettez le membre atteint au repos. Évitez tout effort inutile car ceci pourrait augmenter les risques de rupture des tendons.

- Vous pouvez présenter des symptômes évocateurs d'une neuropathie, tels que douleurs, brûlures, picotements, engourdissement et/ou faiblesse musculaire. Si de tels symptômes surviennent, arrêtez CIPROFLOXACINE ARROW et contactez immédiatement votre médecin.

- Une diarrhée peut se produire lors de la prise d'antibiotiques, y compris avec CIPROFLOXACINE ARROW, même plusieurs semaines après la fin du traitement. Si la diarrhée devient sévère ou persiste, ou si vous remarquez la présence de sang ou de mucus dans vos selles, arrêtez immédiatement de prendre CIPROFLOXACINE ARROW, car votre vie pourrait être mise en danger. Ne prenez pas de médicaments destinés à bloquer ou ralentir le transit intestinal et contactez votre médecin.

- Prévenez votre médecin ou le laboratoire d'analyses que vous prenez CIPROFLOXACINE ARROW si vous devez subir un **prélèvement de sang ou d'urine**.

- CIPROFLOXACINE ARROW peut provoquer des **troubles hépatiques**. Si vous remarquez le moindre symptôme de type perte d'appétit, icteré (jaunisse), urines foncées, démangeaisons ou sensibilité de l'estomac à la palpation, arrêtez de prendre CIPROFLOXACINE ARROW et contactez immédiatement votre médecin.

- CIPROFLOXACINE ARROW peut diminuer le taux de vos globules blancs dans le sang et **réduire votre résistance aux infections**. Si vous présentez une infection accompagnée de symptômes tels qu'une fièvre et une détérioration importante de votre état général, ou une fièvre accompagnée de symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans la gorge/le pharynx/la bouche ou des problèmes urinaires, vous devez consulter immédiatement votre médecin. Une analyse de sang sera effectuée afin de rechercher une éventuelle diminution du taux de certains globules blancs (agranulocytose). Il est important d'indiquer à votre médecin que vous prenez ce médicament.

- Prévenez votre médecin si vous ou un membre de votre famille êtes atteint d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car vous pourriez alors risquer de présenter une anémie avec la ciprofloxacine.

- Votre peau devient plus **sensible au soleil et aux rayons ultraviolets (UV)** lorsque vous prenez CIPROFLOXACINE ARROW. Évitez toute exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV artificiels comme ceux des cabines de bronzage.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Ne prenez pas de CIPROFLOXACINE ARROW en même temps que la tizanidine** car ceci pourrait provoquer des effets indésirables tels qu'une baisse de la tension artérielle et des somnolences (voir rubrique 2). Ne prenez jamais de CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable.

Les médicaments suivants sont connus pour interagir avec CIPROFLOXACINE ARROW. Prendre CIPROFLOXACINE ARROW en même temps que ces médicaments pourrait avoir une incidence sur les effets thérapeutiques de ces produits, et augmenter la probabilité de survenue des effets indésirables.

### Prévenez votre médecin si vous prenez :

- warfarine ou autres anticoagulants oraux (destinés à fluidifier le sang)
- probenécide (utilisé pour traiter la goutte)
- méthotrexate (utilisé dans certains types de cancer, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde)
- theophylline (utilisée dans des problèmes respiratoires)
- tizanidine (utilisée dans les problèmes de spasticité musculaire liés à la sclérose en plaques)
- clozapine (utilisée dans certaines maladies psychiatriques)
- ropinirole (utilisé dans la maladie de Parkinson)
- phénytoïne (utilisée dans l'épilepsie).

CIPROFLOXACINE ARROW peut **augmenter** la concentration des médicaments suivants dans votre sang :

- pentoxifylline (utilisée dans des troubles de la circulation)
- caféine.

Certains médicaments **atténuent** les effets de CIPROFLOXACINE ARROW. Prévenez votre médecin si vous prenez ou envisagez de prendre :

- des anti-acides
- des comprimés minéraux
- du sucralfate
- un chélateur polymérique du phosphate (par ex. le sévelamer)
- des médicaments ou compléments contenant du calcium, du magnésium, de l'aluminium ou du fer.

S'il est essentiel pour vous de prendre ces médicaments, prenez CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable au moins deux heures avant ou quatre heures après ces médicaments.

### Aliments et boissons

Si vous prenez CIPROFLOXACINE ARROW en dehors des repas, ne consommez pas de produits laitiers (par ex. lait ou yaourts) ou de boissons enrichies en calcium quand vous prenez les comprimés de ciprofloxacine car les produits laitiers peuvent diminuer l'effet du médicament.

### Grossesse et allaitement

Il est préférable d'éviter d'utiliser CIPROFLOXACINE ARROW pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous envisagez une grossesse. Ne prenez pas de CIPROFLOXACINE ARROW pendant l'allaitement car la ciprofloxacine passe dans le lait maternel et pourrait nuire à la santé de votre enfant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

CIPROFLOXACINE ARROW peut abaisser votre niveau de vigilance. Des effets indésirables neurologiques peuvent se produire. Par conséquent, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à

- vous avez déjà présenté des problèmes rénaux (ce qui pourra être nécessaire d'adapter votre traitement) ;
  - vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
  - vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que CIPROFLOXACINE ARROW ;
  - vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) ;
  - vous avez des antécédents de trouble du rythme cardiaque (arythmie).
- Pendant la prise de CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable :**  
Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par CIPROFLOXACINE ARROW. Votre médecin déterminera si le traitement par CIPROFLOXACINE ARROW doit être interrompu.
- **Réaction allergique sévère et soudaine** (réaction/choc anaphylactique, œdème de Quincke). Dès la première dose, il existe un faible risque de survenue de réaction allergique sévère, se manifestant par les symptômes suivants : oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou évanouissements, ou vertiges lors du passage en position debout. **Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre CIPROFLOXACINE ARROW car votre vie pourrait être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin.**
  - **Des douleurs et gonflements des articulations et des tendinites** peuvent se produire occasionnellement, en particulier si vous êtes âgé(e) et si vous êtes également traité(e) par des corticostéroïdes. Au moindre signe de douleur ou d'inflammation des articulations ou des tendons, arrêtez de prendre CIPROFLOXACINE ARROW et mettez le membre atteint au repos. Évitez tout effort inutile car ceci pourrait augmenter les risques de rupture des tendons.
  - Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre maladie neurologique du type ischémie cérébrale ou accident vasculaire cérébral, des effets indésirables neurologiques (crises convulsives) pourraient se produire. S'ils surviennent, arrêtez CIPROFLOXACINE ARROW et contactez immédiatement votre médecin.
  - Des **réactions psychiatriques** peuvent survenir dès la première prise de CIPROFLOXACINE ARROW. Si vous souffrez de **dépression** ou de **psychose**, vos symptômes pourraient s'aggraver lors du traitement par CIPROFLOXACINE ARROW. Dans ces cas, arrêtez CIPROFLOXACINE ARROW et contactez immédiatement votre médecin.

Certains médicaments **atténuent** les effets de CIPROFLOXACINE ARROW. Prévenez votre médecin si vous prenez ou envisagez de prendre :

- des anti-acides
- des compléments minéraux
- du sucralfate
- un chélateur polymérique du phosphate (par ex. le sévélamer)
- des médicaments ou compléments contenant du calcium, du magnésium, de l'aluminium ou du fer.

S'il est essentiel pour vous de prendre ces médicaments, prenez CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable au moins deux heures avant ou quatre heures après ces médicaments.

#### **Aliments et boissons**

Si vous prenez CIPROFLOXACINE ARROW en dehors des repas, ne consommez pas de produits laitiers (par ex. lait ou yaourts) ou de boissons enrichies en calcium quand vous prenez les comprimés de ciprofloxacine car les produits laitiers peuvent diminuer l'effet du médicament.

#### **Grossesse et allaitement**

Il est préférable d'éviter d'utiliser CIPROFLOXACINE ARROW pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous envisagez une grossesse.

Ne prenez pas de CIPROFLOXACINE ARROW pendant l'allaitement car la ciprofloxacine passe dans le lait maternel et pourrait nuire à la santé de votre enfant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

CIPROFLOXACINE ARROW peut abaisser votre niveau de vigilance. Des effets indésirables neurologiques peuvent se produire. Par conséquent, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à CIPROFLOXACINE ARROW avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines. En cas de doute, parlez-en avec votre médecin.

#### **3. COMMENT PRENDRE CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable ?**

Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité de CIPROFLOXACINE ARROW vous devez prendre, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Ceci dépendra du type d'infection et de sa sévérité. Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament à prendre devra éventuellement être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection sévère. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des doutes sur le nombre de comprimés de CIPROFLOXACINE ARROW à prendre ou la façon de les prendre.

a. Avalez les comprimés avec une grande quantité de boisson. Ne croquez pas les comprimés car ils ont mauvais goût.

b. Essayez de prendre les comprimés à peu près à la même heure chaque jour.

c. Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas. Le calcium présent dans un repas n'a pas d'incidence grave sur l'effet du médicament. Cependant, ne prenez pas les comprimés de CIPROFLOXACINE ARROW avec des produits laitiers de type lait ou yaourt ou des jus de fruit enrichis (par exemple jus d'orange enrichi en calcium). Pensez à boire abondamment pendant le traitement par CIPROFLOXACINE ARROW.

**Si vous avez pris plus de CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable que vous n'auriez dû :**

Si vous avez dépassé la dose prescrite, consultez immédiatement votre médecin. Si possible, emportez les comprimés restants ou la boîte avec vous pour les montrer au médecin.

**Si vous oubliez de prendre CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable :**

Prenez la dose oubliée dès que possible, puis continuez le traitement normalement. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée et continuez le traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Veillez à suivre votre traitement jusqu'à la fin.

**Si vous arrêtez de prendre CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable :**

Il est important que vous suiviez le traitement jusqu'à la fin même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection pourrait ne pas être complètement guérie et les symptômes de l'infection pourraient réapparaître ou s'aggraver. Vous pourriez également développer une résistance bactérienne à cet antibiotique.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez un des effets indésirables comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**Effets indésirables fréquents** (entre 1 et 10 personnes sur 100 peuvent présenter les effets suivants) :

- nausées, diarrhée
- douleurs des articulations chez l'enfant
- Effets indésirables peu fréquents** (entre 1 et 10 personnes sur 1 000 peuvent présenter les effets suivants) :
- surinfections fongiques (dûes à des champignons)
- concentration élevée des éosinophiles (une sorte de globules blancs)
- perte d'appétit (anorexie)
- hyperactivité, agitation
- maux de tête, étourdissements, troubles du sommeil, troubles du goût
- vomissements, douleurs abdominales, problèmes digestifs tels que des problèmes d'estomac (indigestion/brûlures d'estomac) ou flatulences
- augmentation de la quantité de certaines substances dans le sang (transaminases et/ou bilirubine)
- éruption cutanée, démangeaisons, urticaire
- douleurs dans les muscles et les os, douleurs des articulations chez l'adulte
- altération de la fonction rénale
- sensation de fatigue générale (asthénie), fièvre
- élévation du taux de phosphatases alcalines sanguines (une substance présente dans le sang)

**Effets indésirables rares** (entre 1 et 10 personnes sur 10 000 peuvent présenter les effets suivants) :

- inflammation des intestins (colite) liée à l'utilisation d'antibiotiques (pouvant être fatale dans de très rares cas) (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable)
- modification du nombre des globules rouges ou de certains globules blancs (leucopénie, leucocytose, neutropénie, anémie), augmentation ou diminution des cellules présentes dans le sang servant à la coagulation sanguine (plaquettes),
- réaction allergique, gonflement (œdème) ou gonflement rapide de la peau et des muqueuses (œdème de Quincke), pouvant mettre la vie du patient en danger (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable)
- augmentation du taux de sucre dans le sang (hyperglycémie)
- confusion, désorientation, réactions d'anxiété, rêves étranges, dépression, hallucinations
- fourmillements, sensibilité inhabituelle, diminution de sensibilité de la peau, tremblements, crises convulsives (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable), vertiges
- troubles de la vision
- bourdonnements d'oreilles, troubles ou perte de l'audition
- accélération des battements cardiaques (tachycardie)
- dilatation des vaisseaux sanguins (vasodilatation), baisse de la pression artérielle, évanouissement
- essoufflement, y compris symptômes asthmatiques
- troubles hépatiques, jaunisse (ictère cholestatique), hépatite
- sensibilité à la lumière (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable)
- douleurs musculaires, inflammation des articulations, augmentation du tonus musculaire et crampes

#### CONSEILS / ÉDUCATION SANITAIRE

##### QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus. Votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques. Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre

- insuffisance rénale, présence de sang ou de cristaux dans les urines (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable), inflammation des voies urinaires
- rétention d'eau, transpiration excessive
- concentration anormale dans le sang d'un facteur de coagulation (prothrombine), augmentation de la concentration dans le sang de l'enzyme amylase (une enzyme issue du pancréas).

**Effets indésirables très rares** (moins de 1 personne sur 10 000 peut présenter les effets suivants) :

- diminution d'origine particulière du nombre de globules rouges dans le sang (anémie hémolytique), diminution très importante du nombre de certains globules blancs (agranulocytose), diminution simultanée du nombre des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes (pancytopenie) pouvant être fatale, aplasie médullaire (appauvrissement de la moelle osseuse en cellules sanguines) pouvant également être fatale (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable)
- réactions allergiques sévères (réaction anaphylactique ou choc anaphylactique [brusque gonflement du visage et du cou avec des difficultés respiratoires], maladie sérique) pouvant mettre la vie du patient en danger (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable)
- troubles psychiatriques (réactions psychotiques) (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable)
- migraine, troubles de la coordination, démarche instable (troubles de la marche), altération de l'odorat (troubles olfactifs), hypertension intracrânienne
- troubles de la vision des couleurs
- inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins (vascularite)
- pancréatite (inflammation du pancréas)
- destruction des cellules du foie (nécrose hépatique) pouvant se faire de façon très rare à une insuffisance hépatique pouvant mettre en jeu la vie du patient
- petits saignements sous forme de points rouges sous la peau (pétéchies) ; éruptions cutanées diverses (par exemple, syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell [détachement de la peau pouvant rapidement s'étendre à tout le corps] potentiellement fatal)
- faiblesse musculaire, inflammation des tendons, rupture des tendons - en particulier du gros tendon situé à l'arrière de la cheville (tendon d'Achille) (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable) ; aggravation des symptômes de la myasthénie (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable).

**Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- atteinte neurologique telle que douleurs, brûlures, picotements, engourdissement et/ou faiblesse dans les extrémités
- anomalies sévères du rythme cardiaque, battements cardiaques irréguliers (torsades de pointes).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### 5. COMMENT CONSERVER CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, les plaquettes, le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

**Que contient CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable ?**

La substance active est : le Ciprofloxacine 500 mg, sous forme de chlorhydrate de ciprofloxacine, pour un comprimé pelliculé sécable.

**Les autres composants sont :**

**Noyau :** cellulose microcristalline, crospovidone, amidon de maïs, amidon de maïs pré-gélatinisé, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

**Pelliculage :** OPADRY II blanc 85F18378 [alcool polyvinylique, dioxyde de titane (E171), macrogol 3350, talc].

**Qu'est-ce que CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable. Boîte de 12 ou 100 comprimés.

**Titulaire/Exploitant**

**ARROW Génériques**

26 avenue Tony Garnier

69607 Lyon

**Fabricant**

**ARROW Pharm (Matta) LTD**

62 Hal Far Industrial Estate

Birzebbugia BBG 3000

Malte

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Octobre 2012.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France), [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

Cette notice est également disponible gratuitement en braille en caractères agrandis, auprès de HandicapZéro sur simple demande au 0800.39.39.51 ou sur [www.pharmabraille.fr](http://www.pharmabraille.fr)

**En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

**1 - N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.**

**2 - Respectez strictement votre ordonnance.**

**3 - Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.**

**4 - Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.**

**5 - Une fois votre traitement terminé, rappez à votre pharmacien**

- troubles hépatiques, jaunisse (ictère cholestatique), hépatite
- sensibilité à la lumière (voir rubrique 2 : Faites attention avec CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable)
- douleurs musculaires, inflammation des articulations, augmentation du tonus musculaire et crampes

Tous renseignements obtenus sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'ANSM (France), [www.ansm.sanle.fr](http://www.ansm.sanle.fr)

Cette notice est également disponible gratuitement en braille en caractères agrandis, auprès de HandicapZéro sur simple demande au 0800.39.39.51 ou sur [www.pharmabraille.fr](http://www.pharmabraille.fr)

#### CONSEILS / ÉDUCATION SANITAIRE

##### QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus. Votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques. Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- 1 - **N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.**
- 2 - **Respectez strictement votre ordonnance.**
- 3 - **Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.**
- 4 - **Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.**
- 5 - **Une fois votre traitement terminé, rappez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.**

L2230/4

**ARROW Génériques**  
26 Avenue Tony Garnier, 69007 LYON

