

# Molsidomine arrow®



Adulte

2 mg

30 et 90 comprimés sécables



**Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

*Elle contient des informations importantes sur votre traitement.*


*Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.*


*Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.*

*Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.*



**Ceci est un médicament générique.**

 Ce médicament générique peut vous avoir été délivré par votre pharmacien en remplacement du médicament prescrit par votre médecin.


 Il possède la même quantité en substance active que le médicament initialement prescrit

- **La substance active est :** Molsidomine : 2 mg pour un comprimé sécable.

- **Les autres composants sont :** silice colloïdale anhydre, lactose monohydraté, amidon de maïs, hypromellose, mannitol, stéarate de magnésium.


**Titulaire/Exploitant :** ARROW Génériques, 26 Avenue Tony Garnier, 69007 LYON

**Fabricant :** Laboratoires BTT, ZI de Krafft, 67150 ERSTEIN

**QU'EST-CE QUE Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?** 

Ce médicament est un antiangineux.

Ce médicament est préconisé dans le traitement préventif de l'angine de poitrine.

**INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable** 

**Ne pas prendre Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :**

- Hypotension artérielle importante avec état de choc.

- Association au VIAGRA (sildénafil) (médicament traitant les troubles de l'érection) :

- si vous êtes actuellement traité par la molsidomine, le sildénafil ne doit pas être utilisé.
- en cas de traitement par sildénafil, la molsidomine ne doit pas être utilisée.

**Prendre des précautions particulières avec Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable :**

- L'association de la molsidomine au VIAGRA (sildénafil) risque de provoquer une chute importante et brutale de la pression artérielle pouvant entraîner une lipothymie (*malaise passager*), une syncope ou un accident cardiaque.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

- Une légère diminution de la tension artérielle est habituelle sous molsidomine. Ce médicament doit être utilisé avec précaution en cas de tension artérielle basse, ainsi que chez les sujets âgés, en cas d'hypovolémie (*diminution du volume total de sang*), et chez les sujets déjà traités par une substance vasodilatatrice.

- En cas d'insuffisance hépatique il est recommandé d'augmenter la posologie de manière progressive.

## Grossesse – Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

*Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.*

**Liste des excipients à effet notoire :** lactose.

## Prise ou utilisation d'autres médicaments

*Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment du VIAGRA (sildénafil), même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.*

## COMMENT PRENDRE Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable ?



- **Angor d'effort** (posologie usuelle) : 1/2 à 1 comprimé 3 fois par jour, en général aux repas du matin, du midi et du soir (soit 3 à 6 mg de molsidomine).

- **Angor de repos et angor d'effort sévère** : 1 comprimé 4 fois par jour (soit 8 mg de molsidomine).

*Si vous avez l'impression que l'effet de Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.*

Voie orale.

**Si vous avez pris plus de Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :**

*Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.*

**Si vous oubliez de prendre Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable :**

*Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre*

## QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?



*Comme tous les médicaments, Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables :*

- maux de tête en début de traitement régressant spontanément en quelques jours,

- exceptionnellement : hypotension orthostatique (*chute de la tension artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges*), troubles digestifs, démangeaisons.

*Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.*

## COMMENT CONSERVER Molsidomine arrow 2 mg, comprimé sécable ?



*Ne laisser ni à la portée, ni à la vue des enfants.*

*Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.*

*La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Mars 2004.*