

DUSPAMEN[®]

(Mébévérine HCl)

PROPRIETES

Duspamen est un médicament antispasmodique oral avec une action sélective et forte sur le muscle lisse de l'appareil gastro-intestinal. Le Duspamen est rapidement et complètement absorbé par l'intestin après l'administration orale. Il est métabolisé par le foie et excrété par l'urine. Le Duspamen réduit rapidement les spasmes du colon et soulage les douleurs abdominales. L'action sélective du Duspamen évite les effets anticholinergiques. Le Duspamen est efficace pour soulager les crampes et les douleurs qui accompagnent certains désordres gastro-intestinaux comme la colopathie fonctionnelle sans affecter le transit normal des intestins.

INDICATIONS

Le Duspamen est indiqué dans le soulagement symptomatique des douleurs abdominales et des crampes, des désordres gastro-intestinaux et les gênes intestinales liées à la colopathie fonctionnelle.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

La dose prescrite pour les adultes et les enfants de plus de 10 ans, est d' un comprimé (135 mg) de Duspamen, 3 fois par jour, prise de préférence 20 minutes avant les repas. Le dosage peut être réduit graduellement après quelques semaines si l'effet souhaité est obtenu.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indications n'est à soulever.

MISE EN GARDE

Il n'a pas été établi de sécurité dans l'utilisation de la Mébévérine en cas de grossesse. Cependant les études sur les animaux n'ont pas réussi à déterminer

d'effets tératogéniques, mais il n'y a pas d'études sérieuses ou suffisamment contrôlées sur les femmes enceintes. Ce médicament doit être utilisé durant la grossesse avec précaution et seulement si cela est clairement prescrit. Ce médicament passe en si faible quantité dans le lait maternel qu'il ne pourrait produire d'effets indésirables chez les nourrissons.

PRECAUTIONS

Comme tous les antispasmodiques, ce médicament ne doit pas être utilisé dans l'ileus paralytique ou dans le porphyre.

EFFETS SECONDAIRES

Ce médicament est généralement bien toléré. Aucun effet indésirable n'a été rapporté après l'administration de ce médicament en doses thérapeutiques.

SURDOSAGE

En cas d'overdose, il est prévu qu'une excitabilité du SNC apparaisse. Cependant, il n'y a pas d'antidote spécifique connu. Un lavage gastrique et un traitement symptomatique sont recommandés.

PRESENTATION

Comprimés

Duspamen: Mébévérine HCl 135 mg / comprimé.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un Médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivre strictement la prescription médicale et le mode d'utilisation ainsi que les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament.
- Le médecin et le pharmacien connaissent le médicament, ses bienfaits et ses risques.
- Ne pas interrompre le traitement prescrit.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

Tenir hors de la portée des enfants