

Tasneen[®]

(Chlorure de Cétalpyridinium)
Lidocaïne HCl

Propriétés pharmacologiques

Tasneen[®] (chlorure de cétalpyridinium et lidocaïne HCl) est un gel pour premières dents qui agit rapidement pour soulager les douleurs liées à la poussée dentaire et calme la gencive du nourrisson.

Indications

Tasneen[®] est indiqué pour soulager les douleurs liées à la poussée dentaire et pour calmer la gencive du nourrisson.

Posologie et administration

Placer sur l'index propre un peu de gel de **Tasneen**[®] et masser doucement la gencive douloureuse. Ceci peut être répété après 20 minutes si nécessaire et jusqu'à 6 fois par jour. **Tasneen**[®] peut être utilisé depuis l'âge de 3 mois.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les nourrissons allergiques à la lidocaïne, à la chlorure de cétalpyridinium ou au produit lui-même.

Précautions

- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- En cas de manifestations indésirables, de surdosage ou d'hypersensibilité arrêter le traitement et consulter votre médecin.

Effets indésirables

Si ce produit est utilisé comme indiqué aucun effet indésirable ne doit se produire. Quelques cas d'hypersensibilité à la lidocaïne ont été rapportés.

Présentations

Tasneen[®] gel : 1g contient 1 mg de chlorure de cétalpyridinium et 3.3 mg de lidocaïne HCl.

(Disponible en boîtes à contenu différent.)

(Ceci est un médicament - Garder les médicaments hors de la portée des enfants.)

- Le médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et la mode d'emploi prescrite, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les meilleures personnes à connaître le médicament, ses avantages et ses risques.
- N'arrêter pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne répéter pas le médicament sans l'avis de votre médecin