

فوتركس®

(ديكلوفيناك صوديوم)

المفعول

فوتركس هو دواء غير ستيرويدي ذو خواص مضادة للروماتيزم والالتهاب، مسكنة للألم وخافضة للحرارة.

نواحي الاستعمال

يستعمل فوتركس لازالة الألم والالتهاب في حالات التهاب المفاصل الروماتيزمي، التهاب المفاصل العظمي، التهاب المفاصل الروماتيزمي عند الصغار، التهاب الصلب الاقسط، المتلازمات المؤلمة للعمود الفقري، النقرس الحاد، حالات التهاب والتورم المؤلمة بعد التهاب الاصابات او العمليات مثل عمليات الاسنان والعظام، عسر الطمث، وكعلاج مساعد في حالات الالتهاب الجرثومي شديدة الألم في الاذن والانف والحنجرة، مثل التهاب البلعوم واللوزتين والتهاب الاذن. لا تعتبر الحصى بغيرها من نواحي الاستعمال تستعمل أمبولات فوتركس أيضا في علاج المصح الكلوي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

فوتركس أقراص (عن طريق الفم): يجب بلع القرص كاملا مع سائل، ويفضل قبل الوجبات.

الكلوي:

التهاب المفاصل العظمي: ١٠٠ - ١٥٠ ملغم يوميا مقسمة الى ٢-٣ جرعات.
التهاب المفاصل الروماتيزمي: ١٥٠ - ٢٠٠ ملغم يوميا مقسمة الى عدة جرعات.

التهاب الصلب الاقسط: ١٠٠ - ١٢٥ ملغم يوميا مقسمة الى ١-٥ جرعات.
عسر الطمث: الجرعة اليومية المعتادة هي ٥٠ - ١٥٠ ملغم، ثم تزداد تدريجيا حسب الحاجة على أن لا تزيد الجرعة اليومية عن ٢٠٠ ملغم مقسمة الى ٢-٣ جرعات.

استعمالات اخرى: الجرعة اليومية المبدئية ١٠٠ - ١٥٠ ملغم مقسمة الى ٢-٣ جرعات. المعالجة على المدى الطويل أو في الحالات الخفيفة: الجرعة اليومية ٧٥-١٠٠ ملغم مقسمة الى ٢-٣ جرعات.

فوتركس ريثارد: قرص او كبسولة واحدة يوميا. في الحالات الضرورية يمكن زيادة الجرعة اليومية الى ١٥٠ ملغم عن طريق أخذ فوتركس ٢٥ او ٥٠ ملغم أقراص أو تحاميل.

فوتركس تحاميل (عن طريق الشرج): ٢٥-١٠٠ ملغم تحاميل تعطى كبديل عن آخر جرعة يومية تؤخذ عن طريق الفم. في الحالات الشديدة يمكن اعطاء أيضا فوتركس ٢٥ او ٥٠ أقراص على أن لا تزيد الجرعة اليومية عن ١٥٠ ملغم.

الصفار:(عن طريق الشرج) الجرعة للأطفال من سن سنة فأكثر هي ٢٠-٢٥ ملغم/كغم من وزن الجسم يوميا مقسمة الى ٢-٣ جرعات. لمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي عند الصفار يمكن زيادة الجرعة اليومية الى حد أقصى مقداره ٢ ملغم/كغم من وزن الجسم مقسمة الى ٢-٣ جرعات.

فوتركس أمبولات: تعطى فوتركس أمبولات في العضل، الجرعة المعتادة: أمبولة واحدة (٧٥ ملغم) يوميا. في الحالات الشديدة: أمبولة واحدة ٧٥ ملغم مرتين يوميا.

المصح الكلوي: أمبولة واحدة (٧٥ ملغم) يمكن تكرارها مرة واحدة فقط بعد ٢ دقيقة عند الحاجة. يمكن اعطاء امبولة من فوتركس مفتونة باستعمال الاشكال الاخرى من فوتركس على أن لا تزيد الجرعة اليومية عن ١٥٠ ملغم

ديكلوفيناك صوديوم. يجب عدم اعطاء فونتركس أمبولات لأكثر من يومين، فإذا دعت الضرورة يمكن مواصلة العلاج بالأشكال الصيدلانية الأخرى لفونتركس.

مضادات الاستعمال

الفرحة المعدية، فرط الحساسية لديكلوفيناك صوديوم. مرضى الربو الذين سبق وأن أصيبوا بنوبة ربو حادة، شرى أو التهاب الأنف الحاد عند استعمال مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الأسبرين. يجب عدم استعمال ديكلوفيناك صوديوم تعاميل في حالة التهاب المستقيم.

المعايير

يجب على المرضى الذين يشعرون بدوخة (دوار) أو باضطرابات عصبية مركزية أخرى أن يمتنعوا عن قيادة المركبات أو تشغيل الآلات. لم تثبت بعد سلامة استعمال ديكلوفيناك صوديوم لدى الحوامل.

الاحتياطات

يجب الحذر عند استعمال ديكلوفيناك صوديوم لدى المرضى الذين لديهم تاريخ مرضي أو نزيف في الجهاز الهضمي، المرضى الذين يعانون من قصور حاد في وظائف الكبد أو الكلى والمرضى الذين يتعاطون مدرات البول أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى أو الستيرويدات القشرية.

التأثيرات الجانبية

ديكلوفيناك صوديوم ذو تحمل جيد. تأثيراته الجانبية نادرة وخفيفة، مثل عسر الهضم، الغثيان، تفاعلات جلدية، وآثار عصبية مركزية خفيفة.

فرط الجرعة

في حالات الجرعة الزائدة يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

الأشكال الصيدلانية

القرص

فونتركس ٢٥: ديكلوفيناك صوديوم ٢٥ ملغم

فونتركس ٥٠: ديكلوفيناك صوديوم ٥٠ ملغم

فونتركس ريتارد: ديكلوفيناك صوديوم ١٠٠ ملغم

تعاميل:

فونتركس ١٢٥: ديكلوفيناك صوديوم ١٢٥ ملغم

فونتركس ٢٥: ديكلوفيناك صوديوم ٢٥ ملغم

فونتركس ٥٠: ديكلوفيناك صوديوم ٥٠ ملغم

فونتركس ١٠٠: ديكلوفيناك صوديوم ١٠٠ ملغم

كبسولات:

فونتركس ريتارد: ديكلوفيناك صوديوم ١٠٠ ملغم

أمبولات:

فونتركس للحقن العضلي: ديكلوفيناك صوديوم ٧٥ ملغم/٢ مليلتر