

**نشرة الدواء: معلومات للمريض**

## درموهيل مرهم

بيتا-سيتوستيرول بتركيز ٠,٢5٪

**إقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا المستحضر حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.**

- إحتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إليها لاحقًا.

- في حال وجود أي تساؤلات لديك، يُفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.

- لقد وُصف هذا المستحضر لك شخصيًا، ولا ينبغي بك أن تعطه لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الأضرار به.

- إذا أصبت بأي آثار جانبية غير مذكورة في هذِه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

مراجعة القسم ٤.

### ما الذي تحتويه هذه النشرة

١. ما هو درموهيل وما هي دواعي استعماله

٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل استخدام درموهيل

٣. ما هي طريقة استخدام درموهيل

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

٥. طريقة تخزين درموهيل

٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

#### ١. ما هو درموهيل وما هي دواعي استعماله

درموهيل هو مستخلص عشبي صالح للأكل، يحتوي على بيتا-سيتوستيرول بتركيز ٠,٢5٪ وهي المادة الفعالة الأساسية فيه. تتكون قاعدة أساس المرهم من زيت السمسم وشمع العسل. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي درموهيل على العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز حيوية خلايا الجلد وتجديدها.

يُستخدم درموهيل لمعالجة الجروح التالية:

١- الحروق من الدرجة الأولى. حيث يتم تسكين الآلام بشكل ملحوظ وتكون سرعة الشفاء مدهشة، مثل حروق الشمس.

٢- الحروق من الدرجة الثانية، قد تكون سطحية أو عميقة. إذا تم تطبيق المرهم بشكل صحيح، لن تكون هناك حاجة لتفريق الجلد وسيتم تجديد بصيلات الشعر والغدد في الأدمة والأنسجة تحت الجلد.

٣- الحروق من الدرجة الثالثة لعزل الجرح وتخفيف الآلام وتسريع عملية التنضير غير الجراحية للنسيج النخري من أجل تهيئة الجرح لتلقيه.

٤- موقع المتبرع لتقليل الألم والتخفيف من انتشار الالتهاب وتسريع الشفاء (تم الإبلاغ عن ٧ أيام كمعدل عام).

٥- الجروح المزمنة ومنها فرحة الفراش والقدم السكري وتقرحات القدم.

٦- التقشير بالليزر والتقشير الكيميائي وتسحيح الجلد.

٧- الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية بما في ذلك الجروح الناتجة عن الولادة.

٨- جرح الختان.

٩- جروح الأغشية المخاطية مثل تقرحات الشدق.

١٠- تشققات الكعب والحلمات.

### ٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل استخدام درموهيل

تم اعتماد علاج آخر للحروق يقوم على الرطوبة (MEBT) بالإضافة إلى الممارسات الطبية المعتمدة منذ عقدين من الزمن في الصين. يتمثل مفهوم هذا العلاج في تعريض الجرح لبيئة فسيولوجية رطبة لتعزيز عمليات الشفاء الطبيعية وكذلك تسهيل هجرة الخلايا الكيراتينية وتكوين الأوعية الدموية والتفاعل مع عوامل النمو. تم تطوير درموهيل مرهم لتلبية المعايير المذكورة أعلاه.

يعمل درموهيل من خلال:

١- توفير أفضل بيئة فسيولوجية رطبة اللازمة لتجديد خلايا الجلد وإصلاحه.

٢- إحداث تأثير مضاد للالتهابات مما يقلل من حدوث الوذمة ومرض الحمامي.

٣- خلق جو غير ملائم لتشكل البكتيريا والفطريات.

٤- عزل وحماية النهايات العصبية المصابة والمكشوفة بالتالي يكون له تأثير مسكن.

٥- توفير التغذية الموضعية لخلايا الجرح.

٦- تسييل الأنسجة الميتة.

٧- عزل وحماية موقع الجرح من العوامل البيئية ولكن في الوقت نفسه بحفاظ على نرح الجروح وتعرضه للهواء وللغازات.

٨- التقليل من فقدان سوائل الجسم من الجلد التالف (الحروق).

٩- امتصاص الحرارة المتبقية في جروح الحروق الحادة.

١٠- تسريع عملية التطهرن مع تكوين جلد تجميلي مقبول بصفة استثنائية.

### لا تستخدم درموهيل

إذا واجهت في أي وقت مضى رد فعل تحسسي تجاه درموهيل أو أي من مكوناته.

إذا كان ذلك ينطبق عليك، لا تستخدم درموهيل قبل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.

### ٣. ما هي طريقة استخدام درموهيل

طريقة الاستخدام:

١. الحروق

أ) الحروق من الدرجة الأولى (الحروق السطحية)

يجب استخدام درموهيل في أسرع وقت ممكن، يجب أن تغطي طبقة رقيقة (حوالي ١ ملم) المنطقة المحروقة، من الأفضل إبقاء الجرح مكشوفًا، لكن إذا دعت الحاجة يمكن استخدام ضمادة رقيقة.

يجب استخدام المرهم من ٣ إلى ٤ مرات يوميًا إذا كان الجرح مكشوفًا أو مرتين يوميًا إذا تمت تغطية الجرح.

ب) الحروق من الدرجة الثانية

المرحلة الأولى - فترة التسييل

يجب أن تغطي طبقة رقيقة من درموهيل المنطقة المحروقة ويجب إعادة استخدامه من ٣ إلى ٤ مرات يوميًا قبل استخدامه من جديد. يجب مسح الأنسجة الميتة المسيلة وبقايا طبقة درموهيل القديمة برفق. من الأفضل إبقاء الجرح مكشوفًا، لكن إذا دعت الحاجة يمكن استخدام ضمادة رقيقة وطبقة سميكة نسبيًا (حوالي ٣ ملم) وتجديدها مرتين يوميًا.

### المرحلة الثانية - فترة الإصلاح

يجب أن يتم وضع درموهيل كالمسابق، ولكن بوتيرة أقل (٢-٣ مرات يوميًا).

المرحلة الثالثة: فترة إعادة التأهيل

يجب استخدام درموهيل كالمسابق، ولكن مرة واحدة فقط يوميًا.

ت) الحروق من الدرجة الثالثة

يجب استخدام درموهيل على النحو المذكور أعلاه لتسييل الأنسجة الميتة.

يجب وضع طبقة رقيقة على المنطقة المحروقة وتجديدها من ٣ إلى ٤ مرات يوميًا.

أ. موقع المتبرع

يجب أن تغطي طبقةً رقيقة من درموهيل موقع المتبرع يتم تجديدها من ٣ إلى ٤ مرات يوميًا إذا كان الجرح مكشوفًا أو مرتين يوميًا إذا تمت تغطية الجرح.

٣. تقرحات القدم

يجب تشريب شاش معقم بمادة درموهيل وملء تجويف القرحة وتجديدها مرتين يوميًا.

٤. الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية والتوليد

يجب تغطية الجرح بطبقة سميكة نسبيًا (حوالي ٣ ملم) من درموهيل قبل وضع ضمادة معقمة ويجب تجديدها مرتين يوميًا.

٥. تشقق الحلمات

يجب وضع طبقة رقيقة من درموهيل على حلمة الثدي تحت ضمادة رقيقة، وتجديدها من ٣ إلى ٤ مرات يوميًا. إن درموهيل آمن للرضيع حيث يمكن أن تستمر الأم بالرضاعة من دون أي مخاطر.

### ٤. الأعراض الجانبية المحتملة

درموهيل هو مستخلص عشبي نقي وصالح للأكل. لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناتجة عن المنتج حتى الآن. باستثناء تفاعلات الحساسية النادرة لزيت السمسم.

### التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا واجهت أي آثار جانبية بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

### ٥. طريقة تخزين درموهيل

- قم بتخزينه بعيدًا عن مرآى ومتناول الأطفال.

- لا تستعمله بعد انتهاء تاريخ الصلاحية والمذكور على الأنبوب والعلاف الخارجي. يشير انتهاء تاريخ الصلاحية إلى اخريوم من الشهر.

- لا تقم بتخزينه في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

- لا تستخدم المستحضر إذا لاحظت علامات تدهور واضحة عليه.

### احتياطات المستحضر

قد يتغير مظهر درموهيل مرهم الخارجي أثناء التخزين، خاصة في المواسم الحارة، لكنه لا يفقد فعاليته.

### ٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

**على ماذا يحتوي درموهيل**

المادة الفعالة هي بيتا - سيتوستيرول. يحتوي كل ١ غرام على ٢,٥ ملغ من بيتا-سيتوستيرول (٢,٢٥٪ النسبة المئوية الوزنية).

- المكونات الأخرى هي: زيت السمسم، زيت الفول السوداني، زيت الكمون الأسود وشمع العسل.

### كيف يبدو شكل درموهيل ومحتويات العبوة

درموهيل هو مرهم لونه أصفر لرج يتوفر في أنبوب ألومونيوم سعته ٣٠ غرام معبأ في علبة كرتون.

### الشركة المصنعة ومالكة حق التسويق

فارمالين ش.م.ل - لبنان

الصدوق البريدي ٩٠٢٠١ جديدة المتن، لبنان

البريد الإلكتروني: pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني: www.pharmaline.com.lb

### تمت مراجعة هذه النشرة في نيسان/أبريل ٢٠٢٢.