

L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg, comprimés
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg, comprimés
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg, comprimés
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg, comprimés
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg, comprimés
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg, comprimés
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg, comprimés
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg, comprimés

- La substance active est la lévothyroxine sodique hydratée correspondant à la lévothyroxine sodique anhydre respectivement 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µg par comprimé.
- Les autres composants (excipients) sont:

L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg, comprimés: lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium dihydr., amidon de maïs, stéarate de magnésium, laque de colorants E 104 et E132.

L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg, comprimés: lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium dihydr., amidon de maïs, stéarate de magnésium, laque de colorant E 110.

L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg, comprimés: lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium dihydr., amidon de maïs, stéarate de magnésium, oxyde de fer noir.

L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg, comprimés: lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium dihydr., amidon de maïs, stéarate de magnésium, laque de colorant E 104.

L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg, comprimés: lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium dihydr., amidon de maïs, stéarate de magnésium.

L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg, comprimés: lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium dihydr., amidon de maïs, stéarate de magnésium, laque de colorant E 132.

L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg, comprimés: lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium dihydr., amidon de maïs, stéarate de magnésium, oxyde de fer brun.

L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg, comprimés: lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium dihydr., amidon de maïs, stéarate de magnésium, laque de colorants E 124 et E132.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché:

NYCOMED BELGIUM
Chaussée de Gand 615
1080 Bruxelles

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le marché:

L-THYROXINE CHRISTIAENS, 25 µg, comprimés: 914 S 548 F 3
L-THYROXINE CHRISTIAENS, 50 µg, comprimés: 914 S 549 F 3
L-THYROXINE CHRISTIAENS, 75 µg, comprimés: 914 S 573 F 3
L-THYROXINE CHRISTIAENS, 100 µg, comprimés: 914 S 550 F 3
L-THYROXINE CHRISTIAENS, 125 µg, comprimés: 914 S 547 F 3
L-THYROXINE CHRISTIAENS, 150 µg, comprimés: 914 S 551 F 3
L-THYROXINE CHRISTIAENS, 175 µg, comprimés: 914 S 574 F 3
L-THYROXINE CHRISTIAENS, 200 µg, comprimés: 914 S 552 F 3

1. QU'EST-CE QUE L-THYROXINE CHRISTIAENS ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

La forme pharmaceutique et les autres présentations:

Emballages de 112 comprimés à 25 µg, 50 µg, 75 µg, 100 µg, 125 µg, 150 µg, 175 µg et 200 µg (blister calendrier PVC-cristal/PVDC//Alu).

Unité dose à 25 µg, 50 µg et 100 µg (blister PVC-cristal//PVDC//Alu).

Le groupe pharmacothérapeutique: Hormone thyroïdienne.

A utiliser en cas de: Affections fonctionnelles de la thyroïde.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE L-THYROXINE CHRISTIAENS?

N'utilisez pas L-THYROXINE CHRISTIAENS

- Si vous avez ou avez eu certaines maladies métaboliques.
- Si vous êtes hypersensible (allergique) à la lévothyroxine sodique ou à l'un des autres composants de L-THYROXINE CHRISTIAENS.
- Si vous avez ou avez eu certains troubles cardiaques.

Faites attention avec L-THYROXINE CHRISTIAENS

- parce qu'avant de commencer le traitement avec L-THYROXINE CHRISTIAENS, certaines affections cardiaques et maladies métaboliques doivent être exclues.
- parce qu'un contrôle sanguin doit être effectué régulièrement si vous souffrez de certains troubles cardiaques.
- parce qu'avant de commencer un traitement, il convient de rechercher préalablement la cause du mauvais fonctionnement de la glande thyroïde.
- parce que dans certains cas de troubles thyroïdiens, certains examens doivent être préalablement pratiqués.
- parce qu'un taux trop élevé de lévothyroxine dans le sang doit être évité chez les femmes ménopausées. La fonction thyroïdienne devra donc être attentivement contrôlée.
- parce que la dose ne peut pas être modifiée sans avis médical.

Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique 'Utilisation de L-THYROXINE CHRISTIAENS en association avec d'autres médicaments'.

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Allaitement: Ne pas interrompre le traitement au cours de la lactation.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite d'un véhicule et utilisation de machines:

L'utilisation de L-THYROXINE CHRISTIAENS n'a pas d'influence sur la vigilance.

Informations importantes concernant certains composants de L-THYROXINE CHRISTIAENS:

Ce médicament contient du lactose. Si votre médecin vous a communiqué que vous ne supportez pas certains sucres, alors prenez contact avec votre médecin avant de prendre ce médicament.

Utilisation de L-THYROXINE CHRISTIAENS en association avec d'autres médicaments:

- Diminution de l'effet de L-THYROXINE CHRISTIAENS par :
 - . certains médicaments antidépresseurs.
 - . barbituriques et autres inducteurs d'enzymes, propylthiouracil (médicament utilisé en cas de maladie thyroïdienne), glucocorticoïdes (groupe de médicaments avec e.a. une action anti-inflammatoire), amiodarone (médicament utilisé en cas d'arythmies), β -lytiques (groupe de médicaments utilisés en cas de tension élevée, certains troubles cardiaques ou en cas de tension oculaire augmentée) et produits de contraste à base d'iode.
- Augmentation de l'effet de L-THYROXINE CHRISTIAENS par les :
 - . salicylés.
 - . phénytoïne (médicament contre l'épilepsie), clofibrate (médicament diminuant les graisses dans le sang), torasémide (médicament qui favorise la production d'urine) et dicoumèrol (médicament agissant sur la coagulation du sang).
- Augmentation de l'effet des anticoagulants (médicaments agissant sur la coagulation du sang) et diminution de l'effet des médicaments antidiabétiques.
- Augmentation réciproque de l'effet de L-THYROXINE CHRISTIAENS et de certains médicaments antidépresseurs (tricycliques).
- L-THYROXINE CHRISTIAENS doit être pris au moins 2 heures avant l'ingestion de médicament^{tr} contenant de l'aluminium et du fer et avant la prise de carbonate de calcium et au moins 4 à 5 heures avant l'administration de colestyramine et de colestipol (médicaments diminuant les graisses dans le sang).

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE L-THYROXINE CHRISTIAENS?

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Prendre la dose journalière en une seule fois, de préférence à jeun.

ADULTES:

dose de départ : 25-50 μ g par jour

dose d'entretien : 100-200 μ g par jour

ENFANTS:

2.5 - 5 μ g/kg par jour

Le traitement sera instauré avec la plus grande prudence et de manière très progressive chez les patients cardiaques.

Conseils destinés au médecin :

Ajuster le traitement en fonction de l'état clinique et des contrôles des taux de TSH. Ceux-ci doivent être ramenés dans les limites normales.

Réduire la dose et prescrire un bêta-lytique si une angine de poitrine survient au cours du traitement.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez utiliser L-THYROXINE CHRISTIAENS.

N'arrêtez pas prématurément votre traitement car alors votre situation peut s'aggraver.

Consultez toujours votre médecin si vous avez l'intention d'arrêter.

Si vous oubliez de prendre L-THYROXINE CHRISTIAENS:

Ne prenez jamais une double dose de L-THYROXINE CHRISTIAENS pour rattraper la dose oubliée.

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par L-THYROXINE CHRISTIAENS est arrêté:

Pas d'application.

Si vous avez pris plus de L-THYROXINE CHRISTIAENS que vous n'auriez dû:

Si vous avez utilisé ou pris trop de L-THYROXINE CHRISTIAENS, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

En cas de prise de trop fortes doses, les effets non désirés s'intensifient (voir "EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS").

Le médecin est seul apte à décider des mesures à prendre: selon l'importance du surdosage, réduction de la dose, interruption temporaire du traitement ou éventuellement hospitalisation du patient.

4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments L-THYROXINE CHRISTIAENS peut avoir des effets indésirables.

- Les effets non désirés sont généralement rares.
- En cas de dose trop élevée ou d'augmentation trop rapide de la dose, apparition de symptômes d'un fonctionnement excessif de la glande thyroïde tels que : palpitations, douleurs dans la poitrine, maux de tête, faiblesse musculaire, crampes, bouffées de chaleur, fièvre, vomissements, règles irrégulières, tremblements, agitation, insomnie, sueurs, diarrhée, perte de poids.

Demander l'avis du médecin.

En cas d'hypersensibilité, des réactions allergiques peuvent survenir.

Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L-THYROXINE CHRISTIAENS?

Tenir L-THYROXINE CHRISTIAENS hors de portée et de la vue des enfants.

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de la lumière.