

أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال أقراص فوارة

أقراص فوارة مع فيتامين سي، مكمل غذائي مع المحليات، بطعم البرتقال

أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال يحتوي على

1000 ملجم فيتامين سي للقرص الواحد (4 جم)، يعادل 1250٪ ن.ن.م للقرص الواحد  
ن.ن.م = الجرعة اليومية الموصى بها

#### المكونات الأخرى

المحتويات: حامض الستريك محمض، كربونات هيدروجين الصوديوم، فيتامين سي، سكري، نشاء، بودرة عصار الشمندر(مالتودكسترين)، عصار الشمندر المركز، نشاء معدل، أسبارتام للتحلية، أسيسولفام للتحلية، مادة ملونة ريبوفلافين-5-فوسفات.

أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال يحتوي على الملح.

أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال هو مصدر للفينيل الأئين!. يحتوي على أسبارتام، غير صالح للأشخاص المصابين بالفينيل كيتونوريابا.

#### الاستجابات

هناك حاجة إلى فيتامين سي كجزء من دفاعات الجسم. يساعد فيتامين سي في دعم جهاز المناعة في الجسم.

يستخدم فيتامين سي في حالات نقص فيتامين سي، للحفاظ على الوظيفة العادية للجهاز المناعة أثناء وبعد ممارسة الرياضة البدنية الشديدة، في حالة البرد والإنفلونزا.

#### معلومات أخرى

الفرانكو والخضروات الطازجة تحتوي على كمية عالية وكافية من فيتامين سي ومع ذلك، عند تخزينها لفترات طويلة يمكن أن تضع كمية فيتامين سي بدرجات متفاوتة ولا سيما في البطاطس والخضروات.

بالإضافة إلى سوء أو نقص التغذية، يمكن للضعف الجسدي أن يؤدي إلى نقص فيتامين سي. الإسفربوط هو الشكل الحاد جدا من نقص فيتامين سي، الذي يكون مصاحبا لضعف ونزيف في جميع أجزاء الجسم ويتم التعامل طبيا باستخدام فيتامين سي.

#### لاتأخذ أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال

إذا كنت حساسية من حمض الأسكوربيك (فيتامين سي) أو أي من المكونات الأخرى من هذا المستحضر. -

بذلك، إذا كنت تعاني من حمى الكلى (أو كسالات) إلا إذا نصح الطبيب -

- إذا كنت تعاني من بعض الأمراض حيث يتم امتصاص الكثير من الحديد في الجسم (الثلاسيميا، الاصطباغ الدموي وفقر الدم الحديدي الأرومات).

#### التحذيرات والاحتياطات

#### اتباع العناية الخاصة مع أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال

إذا كنت تأخذ جرعة زائدة من فيتامين سي على مدى فترات طويلة، ممكن أن يحدث نقص فيتامين سي عند وقف العلاج.

إذا كنت في خطر تكوين حمى الكلى (حساسيات أو كسالات الكالسيوم) المتكررة، يجب أن لا تتجاوز تناول 100 إلى 200 ملجم من فيتامين سي يوميا. إذا كنت تعاني من مرض الكلى الحاد (مرضى غسيل الكلى)، لا تأخذ جرعة فيتامين تتجاوز 50 إلى 100 ملجم يوميا. تجنب الجرعات العالية من

فيتامين سي إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي. إذا كنت تعاني من اضطرابات وراثية في خلايا الدم الحمراء (مثل نقص جلوكوز 6 فوسفات

ديهيدروجينيز) لا تتجاوز الجرعة الموصى بها (1000 ملجم يوميا).

إن استخدام جرعات 1 غرام يمكن أن ترفع تركيز حمض الأسكوربيك في البول إلى درجة أن يحدث انخفاض في قيمة قياسات المعايير السريوية والكميائية المختلفة (الجلوكوز وحمض اليوريك والكرياتينين والفوسفات غير العضوي). وبالمثل، يمكن للجرعات 1 غرام أن تؤدي إلى نتائج سلبية كاذبة في محاولة الكشف عن الدم الخفي في البراز. عموما، طرق الكشف الكيمائية التي تقوم على ردود فعل اللون يمكن أن تتأثر.

لاتأخذ أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال قبل إستشارة الطبيب إذا كنت حامل أو الرضاعة الطبيعية.

#### الأطفال والمراهقين

أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال غير معد للإستخدام في الأطفال والمراهقين (أقل من 18 سنة)

#### يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

#### تعليمات الإستخدام

خذ قرص واحد يوميا. لا ينبغي تجاوز الجرعة اليومية المعلنة 1 قرص وار

يشرب قرص واحد يوميا بعد إذابته في كوب ماء أو شراب - مشروب منعش ولذيذ

#### الأثار الجانبية

أديتيفا فيتامين سي بطعم البرتقال جيد التحمل، حتى في الجرعات العالية. بعد الجرعات العالية جدا (4-5 جم أو أكثر) يمكن مشاهدة إسهال خفيف أو زيادة تكرار البول.

يمكن أن تحدث تفاعلات فرط الحساسية مثل

- صعوبات في التنفس

- ردود فعل حساسية الجلد

#### ظروف التخزين

يخزن في مكان بارد وجاف في درجة حرارة بين 15 - 25 درجة مئوية

إغلق العبوة جيدا بعد الإستخدام. استخدم العبوة خلال 3 أشهر من فتحها

#### العبوة

أنيوب بلاستيكي يحتوي على 20 قرص وار / 80 جم

تاريخ آخر مراجعة للنشرة 2014

#### الشركة المصنعة

د. بي شيفلر ناشف. جي إم بي إتش

سينفيلدير سترابي 44

51469 بيرجيش جلادباخ

ألمانيا

# ADDITIVA Vitamin C


## البرتقال الأحمر

## أقراص فوارة

## مكمل غذائي مع المحليات

### تعريف المواد الغذائية

القاء القرص (غ.م.)	القاء غ	القاء غ
36	903	طاقة
8	210	ك.جول
0 01	0 1	ك.كالوري
0 01	0 1	دهون
0 2	5 6	المغشبة منها
0 1	1 0	كربوهيدرات
0 3	8 5	السكريات منها
0 1	0 4	الياف
0 8	19 24	بروتينات
		أملاح



Dr. Scheffler®

30108787

إن هذا الدواء

- يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلا لتعليمات بعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات

الصيادلة الذي صرفها لك فيما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.

- لا تقطع علاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون إمتشارة الطبيب.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب