

نشرة العبوة: معلومات خاصة بالمريض
حببات يوروسيبيتك 3 غرام تؤخذ عن طريق الفم معلبة في اكياس
فوسفوميسين

- اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.
- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
 - إذا كانت لديك أسلة أخرى ، أسأل طبيبك أو الصيدلي.
 - تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا توصفيه للأخرين. فهو قد يضرهم ، حتى لو كانت أعراضهم هي نفس اعراضك.
 - إذا ظهرت لديك أي أعراض جانبية ، استشر طبيبك أو الصيدلي. قد يتضمن آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

قم بإذابة محتوى كيس واحد في كوب من الماء واتربه على الفور.

إذا تناولت جرعة زائدة من يوروسيبيتك

إذا تناولت بالخطأ أكثر من جرعتك الموصوفة ، اتصل بطبيبك أو الصيدلي.
 في حالة تناول جرعة زائدة أو تناول عرضي ، استشر طبيبك أو الصيدلي على الفور موضعًا الدواء والكمية التي تم تناولها.
 إذا كان لديك أي أسلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، أسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

أعراض جانبية خطيرة

أثناء تناول يوروسيبيتك 3 غرام ، إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية ، يجب عليك التوقف عن تناول الدواء بالاتصال بطبيبك على الفور:

- صدمة تأقلم ، نوع من الحساسية يهدد الحياة (معدل التكرار غير معروف). تشمل الأعراض ظهور طفح جلدي مفاجئ أو حكة أو خلايا على الجلد و / أو ضيق في التنفس أو أذى أو صعوبة في التنفس.
- انتفاخ الوجه ، الشفتين ، اللسان أو الحلق مع صعوبات في التنفس (وذمة وعائية) (شيوخها غير معروف).

• إسهال متوسط إلى شديد ، مغص بطيء ، براز دموي و / أو حمى قد تعني أن لديك عدوى في الأمعاء الغليظة (التهاب القولون المرتبط بالمعاهدات الحيوية) (معدل التكرار غير معروف). لا تتناول أدوية ضد الإسهال الذي يبطئ حركة الأمعاء (مضاد للروماتيزم).

أعراض جانبية أخرى

شائعة (قد تظهر لدى 1 من كل 10 أشخاص):

• صداع الرأس

• دوران

• إسهال

• غثيان

• عسر الهضم

• ألم في البطن

• إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية بآعراض مثل الالتهاب والتهيج والحكمة (التهاب الفرج والمهبل).

غير شائعة (قد تظهر لدى 1 من كل 100 شخص):

• قيء

• طفح جلدي

• الشرى

• الحكة

غير معروف (لا يمكن تقدير التكرار من البيانات المتاحة):

• الحساسية.

التبلع عن الأعراض الجانبية

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية ، استشر طبيبك أو الصيدلي. قد يتضمن آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

5. كيفية تخزين يوروسيبيتك 3 غرام

يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

يجب أن يؤخذ يوروسيبيتك فور ذوبانه. احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية متناول أيدي الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا تخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي والنفايات المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما يحتويه يوروسيبيتك 3 غرام

المادة الفعالة هي فوسفوميسين. يحتوي كل كيس على 5.631 جرام من فوسفوميسين تروميتمال ، أي ما يعادل 3 جرام من فوسفوميسين.

المكونات الأخرى هي الجلايسين والسكالرول وآي روسيل والبوفيدون ونكهة الليمون [تحتوي على الجلاوكوز (في مالتوديكسترين من الذرة) والكربيرات].

كيف يبدو يوروسيبيتك وما هي محتويات العبوة

حببات بيضاء إلى بنياء مصفرة ، برائحة الليمون المميزة ، تذوب في الماء. تحتوي كل كرتونة على كيس أو 2 كيس حبيبات.

صاحب ترخيص التسويق والشركة المصنعة

مجموعة آرا فارما ، شركة محدودة المسؤولية

ج / فاي غابرييل دي سان أنطونيو ، 6/10 ،

المنطقة الصناعية في دي هيناريس

19180 مارشالو (غواداداخارا) ، إسبانيا

تم مراجعة هذه النشرة لآخر مرة في حزيران 2021.

201119.1

محتويات هذه النشرة

1. ما هو يوروسيبيتك 3 غرام وما هي دواعي استعماله

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ يوروسيبيتك 3 غرام

3. كيف تأخذ يوروسيبيتك 3 غرام

4. الآثار الجانبية المحتملة

5. كيفية تخزين يوروسيبيتك

6. محتويات العبوة ومعلومات إضافية أخرى

1. ما هو يوروسيبيتك وما هي دواعي استخدامه

يحتوي يوروسيبيتك 3 غرام على المادة الفعالة فوسفوميسين (مثل فوسفوميسين تروميتمال). وهو مضاد حيوي يعمل عن طريق قتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب الالتهابات.

يستخدم يوروسيبيتك لعلاج عدوى المثانة غير المعقونة لدى النساء والراهقات.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ يوروسيبيتك 3 غرام

لا تتناول يوروسيبيتك 3 غرام

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه فوسفوميسين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم 6).

المخاذي والاحتياطات

تحذى إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة قبل تناول يوروسيبيتك إذا كنت تعاني من أحد الأضطرابات التالية:

• إذا كان لديك التهابات مستمرة

• إذا عانيت سابقاً من الإسهال بعد تناول أي مضادات حيوية أخرى.

الدواء الذي تحتاج إلى البحث عنها

يمكن أن يسبب يوروسيبيتك آثارًا جانبية خطيرة. وتشمل هذه ردود الفعل التحسسية والتهاب الأمعاء الغليظة. يجب أن تبحث عن أعراض ممبة أثناء تناول هذا الدواء ، من أجل تقليل خطر حدوث أي مشاكل. راجع "الآثار الجانبية الخطيرة" في القسم 4.

الأطفال والراهقون

لا تعطي هذا الدواء للأطفال أقل من 12 سنة حيث لم تثبت سلامته وفعاليته في هذه الفئة العمرية.

الأدوية الأخرى و يوروسيبيتك

بلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي دوائية أخرى ، بما في ذلك إنه لن الأهمية وبشكل خاص إذا كنت تتناول:

• ميتوكلوراميد أو غيره من المنتجات الطبية التي تزيد من حرارة الطعام عبر المعدة والأمعاء ، لأنها قد تقلل من امتصاص الجسم فوسفوميسين ،

• مضادات التخثر ، حيث إن قدرتها على منع تخثر الدم قد تتأثر بالفوسفوميسين والمضادات الجوية الأخرى.

يوروسيبيتك مع الطعام

قد يؤخر الطعام امتصاص فوسفوميسين. لذلك ، يجب تناول هذا المنتج الطبي على معدة فارغة (3-2 ساعات قبل أو 2-3 ساعات بعد الوجبة).

أثناء الحمل والرضاعة والخصوصية

إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، تعتدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل ، أسلأ طبيبك أو الصيدلي للحصول على المنشورة قبل تناول هذا الدواء.

إذا كنت حاملاً ، فسوف يوصف طبيبك هذا الدواء فقط عند الحاجة إليه. يمكن للأمهات المرضعات تناول هذا الدواء بعد انتهاء فوجة المفهوم من هذا الدواء.

القيادة واستعمال الماكينات

تعاني من آثار جانبية ، مثل الدوخة ، والتي قد تؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات.

يحتوي يوروسيبيتك على الجلوكوز والكربيرات

يحتوي هذا الدواء على الجلوكوز. إذا بلغك طبيبك أنه لديك حساسية على بعض السكريات ، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على كربيرات. نادراً ما يسبب تفاعلات فرط حساسية شديدة وتشنج قصبي (شعور مفاجئ بالاختناق).

يحتوي يوروسيبيتك على ملليمول صوديوم (23 ملليمول صوديوم في الكيس الواحد ، وهذا يعني بشكل أساسي "خالي من الصوديوم".

3. كيفية تناول يوروسيبيتك 3 غرام

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متاكدة.

في حالة علاج التهاب المثانة غير المعقونة بمضاعفات ، تكون الجرعة الموصى بها عند النساء والراهقات هي كيس واحد من يوروسيبيتك (3 جرام فوسفوميسين).

يستخدم في مرضي القصور الكلوي

لا ينبعي استخدام هذا الدواء في المرضى الذين يعانون من اختلال كلوي شديد (تصفية الكرياتينين <10 مل / دقيقة).

يستخدم في الأطفال والراهقين

لا ينبعي استخدام هذا الدواء للأطفال أقل من 12 عامًا.

طريقة الاستخدام

للتناول عن طريق الفم.

يأخذ هذا الدواء عن طريق الفم ، على معدة فارغة (3-2 ساعات قبل أو 2-3 ساعات بعد الوجبة) ، ويفضل قبل الذهاب إلى الفراش بعد إفراغ المثانة.