

ألفاكول[®]

طرطرات البريمونيدين 0,6 مغ/0,3 مل قطرات للعين

الشكل :

- قطرات معقمة للعين.

- علبه تحتوي على 30 وحدة ذات 0,3 مل موزعة على أكياس من الألمينيوم ذات 6 وحدات.

التركيبة :

طرطرات البريمونيدين 0,2 غ
سواغات : كحول عديد الفاينيل، سيترات الصوديوم، حمض السيتريك
أحادي الإماهة، كلوريد الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك و/أو
هيدروكسيد الصوديوم، ماء منقى كافي لـ..... 100 مل

الصنف العلاجي :

محاكي الودي، مضاد لزرق العين.

دواعي الإستعمال :

يستعمل هذا الدواء للتخفيض من ارتفاع الضغط داخل العين لدى المرضى المصابين بزرق العين مفتوح الزاوية أو المصابين بارتفاع ضغط الدم داخل العين وذلك :

- عند العلاج الأحادي الدواء : للإستعمال الموضعي لدى المرضى الذين لا يستطيعون استعمال حاصرات بيتا.

- عند الجمع مع علاجات مخفضة لضغط العين : عندما لا يمكن الوصول إلى الضغط العيني المرغوب باستعمال العلاج الأحادي.

موانع الإستعمال :

- الحساسية المفرطة للبريمونيدين أو لأحد السواغات.

- المواليد الجدد.

- المرضى الذين يتبعون علاجاً مثبطاً للأكسيداز أحادي الأمين أو بعض الأدوية المضادة للإكتئاب المؤثرة على النقل النورأدريني (مضادات الإكتئاب الثلاثية الحلقات و الميانسيرين).

التحذيرات و إحتياجات الإستعمال:

- يجب الإنتباه لدى المرضى المصابين بمرض قلبي وعائي وخيم أو غير مستقر و غير مراقب و لدى المرضى المصابين باضطرابات كبدية و كلوية.

- يجب استعمال ألفاكول® بحذر لدى المرضى المصابين بإكتئاب، قصور دماغي أو تاجي، ظاهرة رينو، نقص ضغط الدم الإلتصابي أو إلتهاب وعائي خثاري مسد.

- يجب إيقاف العلاج عند حدوث ردود فعل أرجية (فرط حساسية).

- لا يجب حقن أو بلع هذا الدواء.

- لا ينصح باستعمال هذا الدواء لدى الأطفال نظرا لعدم توفر معلومات حول سلامة استعماله.

- في صورة نسيانك لجرعة ماء، لا يجب مضاعفتها بل إستشر طبيبك.

- لا تتوقف عن استعمال الدواء بدون أخذ رأي الطبيب إمكانية إرتفاع الضغط داخل العين الذي قد يؤدي إلى تدهور القدرة البصرية.

في حالة وجود شك، لا تتوانوا في إستشارة الطبيب المباشر أو الصيدلاني.

التفاعلات الدوائية :

- مخمدات للجهاز العصبي المركزي (الكحول، الباربيتورات، الأفيون، المهدئات أو الأدوية المخدرة) : إمكانية وجود أثر مضاف أو مؤيد.

- الأدوية المؤثرة على الإستقلاب و تثبيت الأمينات الحرة (كلوربرومازين، ميثيل فنيديات، ريزيربين) و بالتالي لا بد من اليقظة.

- خافطات ضغط الدم و/أو الغليكوزيدات القلبية : ارتفاع خطر انخفاض ضغط الدم.

- ناهضات أو مناهضات المستقبلات الأدرينية (إيزوبرينالين، برازوسين).

الحمل و الإرضاع :

- لا يمكن استعمال ألفاكول® إلا عندما تتجاوز منافعه للأم المخاطر المحتملة على الجنين.

- لا يجب استعمال ألفاكول® خلال فترة الإرضاع.

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلاني في حالتي الحمل أو الإرضاع قبل استعمال أي دواء.

السياقة و استعمال الآلات :

- يمكن لهذا الدواء أن يسبب اضطراب بصري أو غير عادي، بعض الإرهاق و/ أو النعاس مما يؤدي إلى عدم القدرة على القيادة أو استعمال الآلات، خاصة في الليل أو عند انخفاض الإضاءة.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

- آثار بصرية : تهيج بصري يشمل ردود فعل أرجية (احتقان، حروق، نخز، حكة، إحساس بجسم دخنيل و جريبات في الملتحمة)، اضطرابات بصرية، وذمة الجفون، التهاب الجفون ، إفرازات في الملتحمة، ألم و رطوبة عينية، رهاب الضوء، تآكل القرنية، جفاف عيني، بياض الملتحمة، رؤية غير عادية و التهاب الملتحمة.

- آثار عامة : صداع، نعاس، دوار، جفاف الفم، مذاق غير طبيعي، تعب، أعراض معدية معوية.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها و مزعجة غير مذكورة في هذه النشرة.

تجاوز الجرعة :

- تعاطي جرعة مفرطة عن طريق السبيل البصري هو إمكانية قليلة الإحتمال.

- علامات تعاطي جرعة مفرطة عن طريق الفم من مناهضات ألفا-2 هي : انخفاض ضغط الدم، وهن، قيء، تهديئة، انقطاع النفس، نقص الضغط، تضيق الحدقة.

المقادير و طريقة الإستعمال :

المقادير :

● لدى الكهول : قطرة واحدة من ألفاكول® في العين أو العينين المصابتين مرتان في اليوم. يجب انتظار قرابة 12 ساعة بين القطرتين.

● لدى كبار السن : لا يتطلب استعمال هذا الدواء ملاءمة الجرعات.

طريقة الإستعمال :

- للتقطير داخل العين.

- مثل كل قطرات العين، لتقليل احتمال الإمتصاص الجهازى، ينصح بالضغط على كيس الدمع على مستوى الإنسداد لمدة دقيقة واحدة. يجب إتباع هذه الطريقة مباشرة بعد كل عملية تقطير.

- عند استعمالك لعدة قطرات للعين، انتظر من 5 إلى 15 دقيقة بين كل عملية تقطير.

يجب الإلتزام بدقة بتعليمات الطبيب المباشر.

طريقة التحضير :

- اغسل يديك بالماء و الصابون.

- افتح الكيس المحتوي على 6 وحدات قياسية ثم إفصل وحدة قياسية من الرقاقة و افتحها و ذلك بلوي طرفها العلوي.

- أدر الرأس إلى الخلف و أذب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل.

- قطر قطرة داخل العين أو العينين المصابتين.

- تجنب تماس طرف الوحدة مع العين، الجفن أو سطح العينين.

- بعد التقطير، يجب إلقاء الوحدة المستعملة على الفور حتى إذا تبقى بها كمية من المحلول.

- تحفظ بقية الوحدات الأخرى داخل الكيس لمدة لا تتجاوز 15 يوما.

في حالة وجود شك، لا تتوانوا في استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

الحفظ :


● قبل الفتح : يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية و بعيدا عن الضوء.

● بعد الفتح : يجب إلقاء كل وحدة مفتوحة فورا بعد التقطير.


- يجب استعمال بقية الوحدات القياسية خلال 15 يوما من فتح الكيس.

جدول : أ


التأشيرة : 909 381 2



قطر قطرة واحدة من الوحدة داخل كيس الملتحمة للعين المصابة



افتح الوحدة بلوي طرفها العلوي



اسحب وحدة من الرقاقة

إن هذا دواء

- مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الإستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

مخابر يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى ص.ب : 38 - 4060 تونس
الهاتف : 669 342 73 (+216) - الفاكس : 472 342 73 (+216)
موقع الواب : www.unimed.com.tn

