

أزيال®

أزليستين هيدروكلوريد 0,05%
قطرات للعين 6 مل

الشكل :

- قطرات معقمة للعين بنسبة 0,05%.

- علبه تحتوي على قارورة واحدة ذات 6 مل.

التركيبة :

أزليستين هيدروكلوريد.....50 مغ

سواغات : كلوريد البنزالكونيوم، هيبروملوز، إيديتات ثنائي

الصوديوم، سائل الصوريبتول، هيدروكسيد الصوديوم، ماء

للحقن كافي لـ:.....100 مل

سواغ نو أثر ملحوظ : كلوريد البنزالكونيوم.

الصنف العلاجي :

مضاد الأرجية (فرط الحساسية)، مضاد الهستامين 1H.

دواعي الإستعمال :

علاج أعراض التهاب الملتحمة الأرجي لدى الطفل الذي يفوق عمره 4 سنوات و لدى البالغين.

موانع الإستعمال :

فرط الحساسية المسبقة لأحد عناصر هذا الدواء (خاصة

لأزليستين هيدروكلوريد، كلوريد البنزالكونيوم و إيديتات ثنائي

الصوديوم).

التحذيرات وإحتياطات الإستعمال:

- لا يجوز استعمال هذا الدواء للحقن حول أو داخل العين.

- لا يجوز استعمال هذا الدواء لدى الطفل دون 4 سنوات.

- لا يجوز استعمال قطرات العين المحتوية لأزليستين لعلاج الإصابات الجرثومية للعين.

- في حالة استمرار وجود الأعراض أو تفاقمها، يجب مراجعة الطبيب المباشر.

- يحتوي هذا الدواء على كلوريد البنزالكونيوم و الذي قد يتسبب في تهيج للعينين. يجب تفادي إستعمال هذا الدواء عند حمل

العدسات اللاصقة اللينة. إنزع العدسات قبل إستعمال الدواء

وانتظر مرور 15 دقيقة على الأقل قبل إرجاعها. يمكن لكلوريد البنزالكونيوم أن يزيل ألوان العدسات اللاصقة اللينة.

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى :

عند استعمال قطرات أخرى للعين، يجب أن لا يقل الفارق الزمني بين كل عملية تقطير عن 15 دق.

* الغير منصوص بها :

الكحول: تؤدي الكحول إلى إرتفاع الأثر المهدئ للأزليستين.

- إن اختلال التيقظ يؤدي إلى خطورة السياقة و استعمال الآلات.

* أخذها بعين الإعتبار :

- الأدوية الأخرى المسكنة للجهاز العصبي المركزي : يمكن أن يؤدي ارتفاع الخمود المركزي إلى اضطرابات خاصة عند السياقة.

لتفادي التفاعلات بين مختلف الأدوية، ينبغي إعلام الطبيب أو الصيدلاني عند استعمال أي دواء آخر.

الحمل و الإرضاع :

للوقاية و تجنباً لكل آثار سلبية، لا ينصح بإستعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل.

في كافة الحالات إستشيرى طبيبك المباشر.

السياقة و استعمال الآلات :

عند الإحساس باضطراب بصري (كالشعور بحراق)، ينبغي على المريض عدم السياقة أو استعمال الآلات إلى حين زوال هذه

الأعراض تماماً.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

- إحساس خفيف و عابر بحرارة عند التقطير.

- إحساس بمذاق مر أو تغير المذاق.

- نظراً لوجود كلوريد البنزالكونيوم، هناك خطر إكزيمة التماس و تهيج العيون.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات غير مرغوب فيها و مقلقة غير مذكورة في هذه النشرة.

تجاوز الجرعة :

عند تجاوز الجرعة، يجب معالجة الأعراض و إذا كان التسمم حديثاً، يستحسن القيام بغسيل للمعدة.

المقادير و طريقة الاستعمال :

المقادير :

- قطرة واحدة، مرتين في اليوم داخل العين أو العينين المصابتين.

- يمكن الزيادة في الجرعات: قطرة واحدة داخل كل عين مصابة 4 مرات في اليوم خلال المدة الزمنية التي يرتفع فيها التعرض

إلى العامل المسبب للحساسية.

طريقة الاستعمال :

• للتقطير داخل العين.

• قبل التقطير :

- غسل اليدين جيداً قبل و بعد الإستعمال.

- تفادي تماس طرف القطارة مع العين.

- تقطير قطرة واحدة من هذا الدواء داخل ردة الملتحمة السفلى للعين وذلك بالنظر إلى أعلى و جذب الجفن السفلي قليلاً إلى الأسفل.

- إحكام غلق القارورة بعد كل عملية إستعمال.

يجب الإلتزام بدقة بتعليمات الطبيب المباشر.

الحفظ :

- قبل فتح القارورة : يحفظ في درجة حرارية أقل من 25 درجة مائوية.

- بعد فتح القارورة : يجب استعمالها خلال 4 أسابيع من تاريخ فتحها و ذلك في درجة حرارية أقل من 25 درجة مائوية.

جدول أ

التأشيرة : 9093951



إغسل يديك جيداً

أدر الغطاء لثقب

إنزع الغطاء

إقلب القارورة و اضغط على وسطها بلين،

لتنزل القطرة في العين، قطر داخل ردة

الملتحمة السفلى للعين وذلك بالنظر إلى

أعلى و جذب الجفن السفلي قليلاً إلى الأسفل

إن هذا دواء

مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الإستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

صاحب التسجيل/المشغل/المصنع

مخابر يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى ص.ب : 38 - 4060 تونس

الهاتف : 669 73 342 (216) + - الفاكس : 472 73 342 (216) +

موقع الواب : www.unimed.com.tn

نشرة : 02

تاريخ : 04 / 2019

14AZL101

