

توبرا كول 3م ⑤

توبراميسين 0.3 %

قطرات للعين 5 مل، قارورة ذات 3 مكونات

الشكل :

قطرات معقمة للعين.

علبة تحتوي على قارورة ذات 3 مكونات ذات 5 مل.

التركيبة :

توبراميسين.....300 مغ

سواغات: كلوريد البنزالكونيوم، حامض البوريك، سلفات

الصوديوم الخالي من الماء، كلوريد الصوديوم، تيلوكسابول،

ماء مقطر كافى لـ:.....100 مل

الصنف العلاجي :

مضاد حيوي من عائلة الأمينوغليكوزيد.

دواعي الإستعمال :

علاج موضعي مضاد للإلتهابات الجرثومية للملتحمة و القرنية

و تقرحات القرنية الناتجة عن جراثيم حساسة للتوبراميسين.

موانع الإستعمال :

الحساسية المفرطة لأحد مكونات الدواء.

التحذيرات وإحتياطات الإستعمال :

- لا يمكن حقن هذا الدواء أو تجرعه.

- يجب إيقاف العلاج في حالة ظهور أعراض حساسية مفرطة لهذا الدواء.

- لا يمكن حقن هذا الدواء داخل أو حول العين.

- في حالة غياب تحسن سريع أو في حالة ظهور أعراض غير عادية، إستشر طبيبك.

- في حالة إستعمال هذا الدواء مع قطرات أخرى للعين، يجب أن لا يقل الهامش الزمني الفاصل بين عمليتي التقطير عن 15 دقيقة.

- يحتوي هذا الدواء على كلوريد البنزالكونيوم الذي قد يتسبب في تهيج العينين. يمكن لكلوريد البنزالكونيوم أن يزيل ألوان العدسات اللاصقة اللينة لذا ينصح بنزعها 15 دقيقة على الأقل قبل تقطير التوبرا كول 3م .

- في كافة الحالات ينصح بعدم حمل العدسات اللاصقة طوال مدة إستعمال التوبرا كول 3م .

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى :

■ لتجنب التفاعلات الدوائية، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني بصفة آلية عند إستعمال أدوية أخرى و بصفة خاصة إن كانت في شكل قطرات للعين.

■ يجب الأخذ بعين الاعتبار التفاعلات الدوائية المتأتية و الناتجة عن إستعمال التوبراميسين عبر الدورة الدموية العامة.

■ لا يجب إستعمال التتراسيكلين في شكل قطرات للعين عند العلاج بتوبرا كول 3م ⑤

الحمل و الإرضاع :

الحمل :

لا يستعمل هذا الدواء خلال فترة الحمل إلا عند الضرورة و ذلك بعد إستشارة الطبيب.

الإرضاع:

يمكن إستعمال هذا الدواء خلال فترة الإرضاع.

في كافة الحالات إستشيري طبيبك المباشر.

السياقة و إستعمال الآلات :

إمكانية ظهور إضطرابات بصرية عند تقطير هذا الدواء لذلك ينصح بعدم قيادة السيارات أو إستعمال الآلات.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

- حكاك، تهيج، إنتفاخ الجفون، حُمى الملتحمة.

- نظرا لوجود كلوريد البنزالكونيوم، من الممكن ظهور إكزيمة التماس و تهيج.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها و مقلقة غير مذكورة في هذه النشرة.

المقادير و طريقة الاستعمال :

المقادير :

- قطرة في العين المصابة، 3 إلى 8 مرات في اليوم (حسب الوصفة الطبية).

- يمكن للطبيب المباشر أن يرفع عدد مرات التقطير في اليوم و ذلك حسب العلامات السريرية ثم تخفيضها تدريجيا.

- تحدد مدة العلاج بين 5 و 15 يوم.

طريقة الاستعمال :

- قطرات داخل العين.

- غسل اليدين جيدا.

- تفادي تماس طرف القطارة مع العين أو الجفون.

- قطر قطرة واحدة من توبرا كول 3م ⑤ داخل ردة الملتحمة السفلى للعين وذلك بالنظر إلى أعلى و جذب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل.

- إحكام غلق القارورة بعد كل عملية إستعمال.

- بعد تقطير الدواء و لتحسين فعاليته الموضعية ينصح بـ : غلق الجفن لمدة 3 دقائق أو القيام بالضغط على الجهة العليا الجانبية للأنف.

يجب الإلتزام بدقة بتعليمات الطبيب المباشر.

الحفظ :

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

بعد الفتح : هذا الدواء صالح لمدة 15 يوما بعد فتحه.

جدول أ

التأشيرة : 909 371 2



إقلب القارورة و اضغط علي وسطها بلين،
لتنزل القطرة في العين، قطر داخل ردة
الملتحمة السفلى للعين وذلك بالنظر إلى أعلى
و جذب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل

إنزع الغطاء

اغسل يديك جيّدا

إن هذا دواء

مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الإستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب و الصيدلاني هما الخياران بالتواء و بنقعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

نشرة : 01
تاريخ : 2016 / 06

14TOB501

مخابر يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى ص.ب : 38 - 4060 تونس
الهاتف : 73 342 669 (+216) - الفاكس : 73 342 472 (+216)
موقع الواب : www.unimed.com.tn

unimed
Laboratoires