

# TOBRACOL 3M®

Tobramycine 0,3 %  
Collyre en solution 5 ml, flacon en 3 modules

## FORME ET PRÉSENTATION :

Solution oculaire stérile,  
Boite de un flacon en 3 modules de 5 ml.

## COMPOSITION :

Tobramycine..... 300 mg  
*Excipients* : Chlorure de benzalkonium, acide borique, sulfate de sodium anhydre, chlorure de sodium, tyloxapol, eau purifiée q.s.p. ..... 100 ml

## PROPRIÉTÉS :

Antibiotique de la famille des aminosides.

## INDICATIONS :

Traitements antibactériens locaux des conjonctivites, des kératites et des ulcères cornéens dus à des germes sensibles à la tobramycine.

## CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité à l'un des composants.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Interrompre le traitement en cas d'hypersensibilité.
- Ne pas employer le collyre en injection péri ou intra-oculaire.
- En l'absence d'amélioration rapide ou en cas d'apparition de symptômes anormaux, consulter votre médecin.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, instiller les collyres à 15 minutes d'intervalle.
- En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux. Eviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souple.
- Le port des lentilles de contact souple est déconseillé pendant la durée du traitement.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

- Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien, en particulier si vous êtes déjà traités par un autre collyre.
- Tenir compte des interactions rapportées pour la tobramycine utilisée par voie systémique.
- Les tétracyclines utilisées par voie oculaire ne doivent pas être administrées simultanément avec TOBRACOL 3M®.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

### Grossesse :

Ce médicament ne sera utilisé au cours de la grossesse que si nécessaire.

## Allaitements :

Ce médicament peut être utilisé pendant l'allaitement.  
*DANS TOUS LES CAS, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

## CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Possibilité de troubles de la vision liée à l'instillation du collyre. Dans ce cas, il convient, pendant toute la durée des troubles d'éviter de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines.

## EFFETS INDÉSIRABLES :

- Démangeaisons, irritation et gonflement des paupières, érythème de la conjonctive.
- En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, risque d'eczéma de contact, d'irritation.

*SIGNALER OBLIGATOIREEMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI N'EST PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.*

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

### Posologie :

- Une goutte de collyre, 3 à 8 fois par jour (selon prescription médicale) dans l'œil infecté.

- La fréquence des instillations pourra être augmentée en fonction des signes cliniques, puis diminuée progressivement, si votre médecin le juge nécessaire.

- Durée du traitement 5 à 15 jours.

### Mode d'administration :

- Voie oculaire.
- Se laver soigneusement les mains.
- Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.
- Instiller 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- Refermer le flacon après utilisation.
- Après instillation du collyre et afin de favoriser son action locale, il est conseillé : de fermer la paupière pendant 3 minutes, ou d'exercer une pression sur la partie haute latérale du nez.

*SE CONFORMER OBLIGATOIREEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE VOTRE MEDECIN.*

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
- Après ouverture : Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.

## TABLEAU A

A.M.M : 909 371 2



Se laver soigneusement les mains



Dévisser le bouchon



Retourner le flacon, appuyer légèrement au milieu et instiller dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas

## CECI EST UN MÉDICAMENT

Le médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin, le mode d'emploi et les instructions du pharmacien.

- Le médecin et le pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE



LABORATOIRES UNIMED

Z.I. Kalâa Kébira - BP : 38 - 4060 TUNISIE

Tél. : (+216) 73 342 669 – Fax : (+216) 73 342 472

Site Web : [www.unimed.com.tn](http://www.unimed.com.tn)

Edition : 01  
Date : 06 / 2016

14TOB501