

# لتنوكول<sup>®</sup>

لتنوبروست 0.015 مغ / 0.3 مل  
قطرات للعين 0.3 مل

الشكل :

- قطرات معقمة للعين 0.005 %.

- علبة تحتوي على 30 وحدة ذات 0.3 مل.

التركيبة :

لتنوبروست.....5 مغ

سواغات : تيا لوريل سلفات، بروبيلين غليكول، كلوريد الصوديوم، فسفات أحادي الصوديوم و أحادي الإماهة، فسفات ثنائي الصوديوم اللامائي، هيدروكسيد الصوديوم، حمض الفسفوريك، ماء صالح للحقن  
كافي لـ:.....100 مل

الصنف العلاجي:

مضاهي للبروستاغلاندين : مناهض انتقائي لمستقبلات البروستانويد، خافض للضغط داخل العين و ذلك بزيادة تدفق سائل العين نحو الدم.

دواعي الإستعمال :

- يستعمل هذا الدواء لتخفيض الضغط داخل العين لدى المصابين بزرق العين مفتوح الزاوية أو بفرط ضغط العين.

- إرتفاع الضغط داخل العين أو زرق العين لدى الأطفال و الرضع.

موانع الإستعمال :

- فرط الحساسية لأحد عناصر هذا الدواء.

- الحمل و الإرضاع.

التحذيرات واحتياطات الإستعمال:

- قبل استعمال هذا الدواء، ينبغي إعلام المرضى بخطر التغير الدائم للون العين وذلك بارتفاع كمية الصباغ البني داخل القرنية.

- يمكن أن يؤدي العلاج لعين واحدة إلى إختلاف دائم في لوني العينين.

- يجب استعمال هذا الدواء بحذر عند : نوبة زرق العين الحاد بانسداد الزاوية، خلال الفترة المحيطة بجراحة الكاتاركت، لدى المرضى الفاقدين للعدسة أو شبه فاقدين للعدسة و المصابين بتمزق محفطي داخل الغرفة الخلفية للعين أو الحامل لغرسة داخل الغرفة الأمامية للعين، لدى المرضى الحاملين لعوامل خطر الإصابة بوذمة بقعية كيسية الشكل، أو لإلتهاب القرنية/ التهاب العنبية، أو لدى المصابين بربو.

- تغير قابل للإصلاح لتلون الجلد حول العين خاصة لدى المرضى اليابانيين.

- يمكن لـلتنوبروست أن يؤدي إلى تغير تدريجي لأهداب و زغب الجفن للعين المعالجة بهذا الدواء و محيطها. تزول التغيرات في أهداب العين عند التوقف عن العلاج.

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى :

- لا ينصح بإستعمال دوائين أو أكثر من نوع البروستاغلاندين أو الأدوية المماثلة لها أو من مشتقاتها لأن ذلك يؤدي إلى إرتفاع غير متوقع للضغط داخل العين.

لتجنب التفاعلات بين مختلف الأدوية، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني إذا كنت تستعمل دواء آخر.

الحمل و الإرضاع:

الحمل :

لا يجوز استعمال لتنوكول<sup>®</sup> خلال فترة الحمل.

الإرضاع:

لا يجوز استعمال لتنوكول<sup>®</sup> خلال الإرضاع، أو عند ضرورة استعماله يجب التوقف عن الإرضاع.

في كافة الحالات إستشيري طبيبك المباشر.

السياقة و إستعمال الآلات :

- يمكن أن يؤدي استعمال هذا الدواء إلى اضطرابات عابرة في الرؤية. يجب انتظار انتهاء هذه الاضطرابات قبل السياقة و استعمال الآلات.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

- المتكررة جدا : تغير في لون العينين وذلك بإرتفاع كمية الصباغ البني داخل القرنية، إحمرار و تهيج عيني (شعور بحرقة، حبوب رملية، حكة، نخز و جسم غريب)، تغير أهداب العين و زغب الجفون (أهداب طويلة، ثخينة، ذات لون داكن و كثيرة العدد).

- المتكررة : تهيج أو تآكل سطحي عابر للعين بدون أعراض في معظم الحالات، التهاب الجفن و آلام عينية، نظر مضطرب.

- قليلة التكرر : وذمة جفنية، جفاف العين، التهاب أو تهيج سطحي للعين، اضطرابات في الرؤية، التهاب الملتحمة، طفح جلدي.

- تأثيرات أخرى : كيس قرصي، صداع، دوخة، خفقان، ألم عضلي أو مفصلي و ظهور لدوى فيروسية.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات غير مرغوب فيها أو مقلقة غير مذكورة في هذه النشرة.

تجاوز الجرعة :

عند التقطير المفرط لهذا الدواء، هناك إمكانية الشعور بتهيج، تدمع العينين و إحمرارهما.

المقادير و طريقة الاستعمال :

المقادير :

يمكن إستعمال لتنوكول<sup>®</sup> لدى البالغين (بما في ذلك كبار السن) و الأطفال.

-قطرة واحدة داخل العين أو العينين المصابتين، مرة واحدة في اليوم، ويستحسن الإستعمال في المساء للحصول على النتيجة المثلى.

-لا تتجاوز الجرعة القصوى قطرة واحدة في اليوم.

-عند النسيان، يجب مواصلة العلاج باستعمال القطرة الموالية.

طريقة الاستعمال :

-اغسل يديك بالماء و الصابون.

-إفتح الكيس المحتوي على 6 وحدات قياسية ثم إفصل وحدة قياسية من الرقاقة و إفتحها و ذلك بلوي طرفها العلوي.

-أدر الرأس إلى الخلف و أجدب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل.

-قطر قطرة داخل العين أو العينين المصابتين.

-تجنب تماس طرف الوحدة مع العين، الجفن أو سطح العينين.

-بعد التقطير، يجب إلقاء الوحدة المستعملة على الفور حتى إذا تبقى بها كمية من المحلول.

تحفظ بقية الوحدات الأخرى داخل الكيس لمدة لا تتجاوز 15 يوما.

يجب الالتزام بدقة بتعليمات الطبيب المباشر.

عدم التطابق :

- ترسب في حالة مزج لتنوكول<sup>®</sup> مع قطرات أخرى للعين المحتوية على ثيمبروسال. في حالة استعمال هذا النوع من القطرات، يجب أن لا يقل الهامش الزمني بين عمليتي التقطير عن 5 دق.

الحفظ :

قبل الفتح : تحفظ الوحدة في الثلاجة بين 2 و 8 درجة مائوية في عبوتها الخارجية و بعيدا عن الضوء.


بعد الفتح :

- يجب إلقاء كل وحدة مفتوحة فورا بعد التقطير.


- يجب حفظ بقية الوحدات القياسية بين 2 و 8 درجة مائوية و يجب استعمالها خلال 15 يوما من فتح الكيس.

جدول أ


التأشيرة : 909 379 2



قطر قطرة واحدة من الوحدة داخل كيس الملتحمة للعين المصابة



افتح الوحدة بلوي طرفها العلوي



اسحب وحدة من الرقاقة

## إن هذا دواء

مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.  
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.  
- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره.  
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.  
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.  
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

نشرة : 01

تاريخ : 2016 / 04

14LAT101

مخابر يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى ص.ب : 38 - 4060 تونس  
الهاتف : 669 342 73 (+216) - الفاكس : 472 342 73 (+216)  
موقع الواب : www.unimed.com.tn

