

زولول 3م[®]

درزولاميد 2 % و تيمولول 0,5 %
قطرات للعين، قارورة ذات 3 مكوّنات ذات 5 مل

الشكل :

قطرات معقّمة للعين.

علبة تحتوي على قارورة ذات 5 مل ذات 3 مكوّنات.

التركيبة :

درزولاميد 100 مغ

(في شكل درزولاميد هيدروكلوريد)

تيمولول 25 مغ

(في شكل تيمولول الماليت)

سواغات : هيدروكسي إيثيل سلولوز، مانيتول، سيترات

الصوديوم، كلوريد البنزالكونيوم، هيدروكسيد الصوديوم،

ماء مقطر كافى لـ: 5 مل

الصنف العلاجي:

حاصر بيتا عيني مع مثبّط الأنيدراز كاربونيك.

دواعي الإستعمال :

علاج إرتفاع الضغط داخل العين لدى المصابين بزرق العين

مفتوح الزاوية أو زرق العين كاذب التقشر عندما يكون العلاج

بحاصر بيتا لوحده غير كاف.

موانع الإستعمال :

لا يستعمل هذا الدواء في حالة :

■ أمراض تنفسية كالربو، سوابق لمرض الربو، مرض انسداد

الرئتين (إلتهاب القصبات المزمن).

■ أمراض قلبية : كبطء القلب الجيبي، إحصار أذيني بطيني من

الدرجة الثانية أو الثالثة، قصور قلبي، صدمة قلبية المنشأ.

■ مرض كلوي خطير.

■ الحساسية لأحد عناصر هذا الدواء.

التحذيرات وإحتياجات الإستعمال:

التحذيرات :

■ لا يمكن حقن هذا الدواء أو تجرّعه.

■ يستحسن عدم إستعمال العدسات اللاصقة اللينة خلال فترة

العلاج.

يحتوي هذا الدواء على كلوريد البنزالكونيوم و الذي قد يتسبّب في

تهيج للعينين.

لا يمكن إستعمال هذا الدواء عند حمل العدسات اللاصقة اللينة.

إنزع العدسات قبل إستعمال الدواء وانتظر على الأقل مرور 15

دقيقة قبل إرجاعها. يمكن لكلوريد البنزالكونيوم أن يزيل ألوان

العدسات اللاصقة اللينة.

إحتياجات الإستعمال :

يجب إعلام الطبيب في حالة :

■ مرض كبدي أو سوابق المرض الكبدي.

■ سوابق طبية و خاصة سوابق مرض رئوي، مرض قلبي،

مرض دوران الدم، إنخفاض الضغط الشرياني، مرض

السكري، أو إنخفاض سكر الدم، مرض الغدة الدرقية، أو في

حالة الحساسية لهذا الدواء.

■ ضعف عضلي أو وهن عضلي.

■ جراحة أو تنبيج قبل العملية الجراحية، بسبب إنخفاض الضغط

الشرياني.

■ تهيج عيني أو عوارض بصرية كإحمرار عيني، إنتفاخ

الجفون.

■ ردود فعل حساسية كالطفح الجلدي، إحمرار العين أو حكة في

العين.

■ تعقّن في العين، جرح في العين، عملية جراحية في العين.

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى :

■ يجب إعلام الطبيب في حالة إستعمال أدوية علاجية أخرى،

خاصة عند إستعمال قطرات أخرى للعين أو دواء لعلاج إرتفاع

الضغط أو لمرض القلب أو لمرض السكري أو عند إستعمال دواء

الآلام أو مثبطات أحادي الأمين أو كمّيات مرتفعة للأسبيرين.

الحمل و الإرضاع :

لا يمكن إستعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل أو الإرضاع.

السياقة و إستعمال الآلات :

ينصح بعدم قيادة السيّارات أو إستعمال الآلات نظرا لإمكانية

ظهور إضطرابات بصرية، خلال مدة العلاج بهذا الدواء.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

■ إضطرابات في العين : حرق و وخز، إضطرابات بصرية،

تآكل القرنية، حكاك في العين، دمعان، إلتهاب الجفن، جفاف

العين.

■ إضطرابات الجهاز العصبي و إضطرابات نفسية : صداع،

آلام في الرأس، دوام.

■ إضطرابات تنفسية، صدرية و منصفية : إلتهاب الجيوب

الأنفية، عسر التنفس، قلق تنفسي.

■ إضطرابات معدية معوية : تغير المذاق، غثيان.

■ إضطرابات قلبية : بطء دقات القلب.

■ إضطرابات عامة : تعب.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات غير

مرغوب فيها أخرى غير مذكورة في هذه النشرة.

المقادير و طريقة الاستعمال :

● قطرات للعين

- قطرة في كيس الملتحمة في العين المصابة، مرّتين في اليوم.

- في حالة إستعمال هذا الدواء مع قطرات أخرى للعين يجب أن لا

يقل الهامش الزمّني الفاصل بين عمليتي التقطير عن 10 دقائق.

- يجب تفادي تماس طرف القطارة مع العين أو الجفون.

- يجب إحكام إغلاق العبوة بعد كل إستعمال.

يجب الإلتزام بدقة بتعليمات الطبيب.

الحفظ :

يحفظ بعيدا عن الضوء و في درجة حراريّة لا تتجاوز 25 درجة

مائيّة.


بعد فتح الوحدة : هذا الدواء صالح لمدة 28 يوما بعد فتحه.

جدول أ

التأشيرة : 909 367 2



إقلب القارورة و اضغط على وسطها بلين، لتتزل القطرة في العين، قطر داخل ردة الملتحمة السفلى للعين وذلك بالنظر إلى أعلى و جنب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل



إنزع الغطاء



اغسل يديك جيّدا

إن هذا دواء

مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

نشرة : 01

تاريخ : 2015 / 04

مخابر يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى ص.ب : 38 - 4060 تونس

الهاتف : 669 73 342 (+216) - الفاكس : 472 73 342 (+216)

موقع الواب : www.unimed.com.tn

unimed
Laboratoires مخابر