Amaryl®

نشرة دوائيّة: معلومات للمستعمل

أماريل® 1 ملغ، 2 ملغ، 3 ملغ 4 ملغ أقراص

غليميبيريد

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقّة قبل أخذ هذا الدواء لأنّها تحتوي على معلومات مهمّة لك

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة، اطرحها على الطبيب أو الصيدلي.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصيًا. لا تعطه أبداً إلى شخص آخر حتّى إذا كانت عوارضه مماثلة لعوارضك لأنّه قد يؤذيه.
- إذا أصبت بأيّ تأثيرات جانبيّة، تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي. يتضمّن ذلك أيّ تأثيرات جانبيّة غير مذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

1. ما هو أماريل وما هي دواعي استعماله
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أخذ أماريل
3. كيف يُؤخذ أماريل
4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة
5. كيف يُحفظ أماريل
6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هو أماريل وما هي دواعي استعماله

الفئة الدوائيّة العلاجيّة

أماريل هو دواء يخفّض سكّر الدم يُؤخذ عن طريق الفم وينتمي إلى مجموعة من الأدوية تخفّض مستويات السكّر في الدم تدعى السلفونيل يوريا. يعمل أماريل عبر زيادة كميّة الأنسولين التي يطلقها البنكرياس. ومن ثمّ يخفّض الأنسولين مستويات السكّر في دمك.

دواعي الاستعمال العلاجيّة

لماذا يُستعمل أماريل:

- يُستعمل أماريل لعلاج نوع معيّن من السكّري (داء السكري من النوع الثاني) عندما لم تكفِ الحمية الغذائيّة والتمارين الرياضيّة وفقدان الوزن للتحكّم بمستويات سكّر الدم.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أخذ أماريل

موانع الاستعمال

لا تأخذ أماريل وأعلم الطبيب:

- إذا كنت تعاني من حساسيّة ضدّ الغليميبيريد أو مركّبات سولفونيل يوريا أخرى (أدوية تخفّض سكّر الدم مثل الغليبنكلاميد) أو أدوية السلفوناميد (أدوية لعلاج حالات الخمج البكتيريّة مثل السلفاميتوكزازول) أو أيّ مركّب آخر من مركّبات هذا الدواء (المذكورة في القسم 6).
- إذا كنت تعاني من داء السكري المعتمد على الأنسولين (داء السكري من النوع 1).
- إذا كنت تعاني من الحماض الكيتوني السكري (مضاعفة من مضاعفات السكري يرتفع فيها مستوى الحمض في جسمك وقد تسبّب بعض العوارض التالية: تعب وغثيان وتبوّل متكرّر وتيبّس عضلي).
- إذا كنت في غيبوبة السكري.
- إذا كنت مصابًا بمرض كلويّ خطير.
- إذا كنت مصابًا بمرض كبديّ خطير.

لا تأخذ هذا الدواء إذا كانت إحدى الحالات أعلاه تنطبق عليك. في حال الشكّ، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أماريل.

محاذير مناسبة للاستعمال؛ تحذيرات خاصة

تحذيرات ومحاذير

تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ دوائك إذا:

- كنت تتعافى من جرح أو من جراحة أو من حالة خمج مصحوبة بالحمى أو من أيّ شكل آخر من الضغط، أعلم الطبيب لأنّه قد يكون من الضروري تغيير العلاج تغييرًا مؤقّتًا.
- كنت تعاني من اضطراب خطير في الكبد أو الكليتين.

إذا لم تكن متأكّدًا مما إذا كانت إحدى هذه الحالات تنطبق عليك، تحدّث إلى الطبيب أو إلى الصيدلي قبل أخذ أماريل.

يمكن أن يحصل انخفاض في مستوى الهيموغلوبين وانحلال في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي) لدى المرضى الذين يفتقرون إلى الإنزيم نازعة هيدروجين الغلوكوز - 6- فوسفات.

المعلومات المتوافرة حول استعمال أماريل لدى المرضى ما دون 18 عامًا محدودة. لذلك، لا يُنصح باستعماله لدى هؤلاء المرضى.

معلومات مهمّة حول نقص سكّر الدم (انخفاض مستوى السكر في الدم)

عندما تأخذ أماريل، قد تتعرّض لنقص سكّر الدم (انخفاض مستوى السكّر في الدم). الرّجاء راجع الفقرة أدناه لتحصل على معلومات إضافيّة حول نقص سكّر الدم وعوارضه وعلاجه.

يمكن أن تزيد العوامل التالية من خطر التعرّض لنقص سكّر الدم:

- نقص التغذية، عدم انتظام أوقات الوجبات، تفويت وجبات أو تأخيرها أو فترة صيام.
- تغييرات في النظام الغذائي.
- أخذ أقراص أماريل أكثر من حاجتك.
- ضعف في الوظيفة الكلويّة.
- مرض خطير في الكبد.
- إذا كنت تعاني من بعض الاضطرابات الهورمونيّة (مثلاً اضطرابات في الغدّة الدرقيّة أو الغدّة النخاميّة أو قشرة الغدّة الكظريّة).
- شرب الكحول (بخاصة عند تفويت وجبة).
- أخذ بعض الأدوية الأخرى (راجع فقرة «الأدوية الأخرى وأماريل»).
- إذا زدت التمارين الرياضيّة التي تقوم بها وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الطعام أو إذا كنت تأكل طعامًا يحتوي على كميّة كربوهيدرات أقلّ من العادة.

تتضمّن عوارض نقص سكر الدم ما يلي:

- شعور مفاجئ بالجوع، صداع، غثيان، تقيّؤ، خمول، نعاس، اضطرابات في النوم، عدم راحة، عدائيّة، صعوبة في التركيز، ضعف في الانتباه وفي القدرة على التفاعل، اكتئاب، تشوّش ذهني، اضطرابات في النطق والبصر، تلعثم في الكلام، رُعاش، شلل جزئي، اضطرابات حسيّة، دوار، الشعور بعجز.
- يمكن حصول العوارض التالية أيضًا: تعرّق كثيف، بشرة دبقة، قلق، تسارع دقّات القلب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان، ألم مفاجئ وقويّ في الصدر قد ينتشر إلى مناطق مجاورة (ذبحة صدريّة واضطرابات في النظم القلبي).

إذا استمرّت مستويات السكّر في دمك بالانخفاض، قد تصاب بتشوّش ذهني كبير (هذيان) وباختلاجات وبفقدان السيطرة على الذات وقد يصبح تنفّسك سطحيًا وتتباطأ ضربات قلبك وتفقد الوعي. قد تشبه الصورة السريريّة لنقص سكّر الدم الحاد السكتة الدماغيّة.

علاج نقص سكّر الدم:

في أكثريّة الحالات، تختفي عوارض نقص سكّر الدم بسرعة كبيرة بعد استهلاك السكر مثلاً مكعّبات السكر أو شراب حلو أو شاي محلّى.

لذلك يجب عليك دائمًا أخذ شكل من أشكال السكر معك (مثلاً مكعّبات سكر). والجدير ذكره أنّ المحليّات الاصطناعيّة غير فعّالة. اتصل بالطبيب أو اذهب إلى المستشفى في حال لم يساعدك أخذ السكر أو في حال عاودتك العوارض.

الفحوصات المخبريّة

يجب التحقق بانتظام من مستوى السكّر في دمك أو بولك. قد يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم لمراقبة تعداد خلايا الدم والوظيفة الكبديّة لديك.

الأطفال والمراهقون

لا يُنصح باستعمال أماريل لدى الأطفال ما دون الثامنة عشرة من العمر.

الأدوية الأخرى وأماريل

أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخّرًا أو إذا كان من المحتمل أن تأخذ أيّ أدوية أخرى.

قد يُضطرّ طبيبك إلى تغيير الجرعة التي تأخذها من أماريل إذا كنت تأخذ أدوية أخرى لأنّها قد تضعف أو تقوّي مفعول أماريل على مستوى السكر في دمك.

يمكن للأدوية التالية أن تزيد المفعول المخفّض لسكر الدم لأماريل مما قد يؤدي إلى خطر التعرّض لنقص سكّر الدم (إنخفاض مستوى السكّر في الدم):

- أدوية أخرى لعلاج داء السكري (مثل الأنسولين أو المتفورمين).
- أدوية علاج الألم أو الالتهاب (الفينيلبوتازون، الأزوبروبازون، الأوكسيفنبوتازون، الأدوية الشبيهة بالأسبيرين).
- أدوية علاج حالات الخمج البوليّة (مثل بعض أدوية السلفوناميد الطويلة المفعول).
- أدوية علاج حالات الخمج البكتيريّة والفطريّة (التتراسيكلين، الكلورامفينيكول، الفلوكونازول، الميكونازول، الكينولونات، الكلاريثرومايسين).
- الأدوية المثبّطة لتخثّر الدم (مشتقّات الكومرين مثل الوارفارين).
- الأدوية التي تعزّز بناء العضلات (الابتنائيّات).
- الأدوية المستعملة للعلاج البديل عن الهورمون الجنسي الذكري.
- أدوية علاج الاكتئاب (الفليوكسيتين، مثبّطات أكسيداز الأمين الأحادي).
- الأدوية المخفّضة لمستويات الكولسترول العالية (الفبرات).
- الأدوية المخفّضة لضغط الدم العالي (مثبّطات الأنزيم المحوّل للأنجيوتنسن).
- الأدوية المسمّاة مضادات اللانظميّة المستعملة للتحكّم بعدم اتساق ضربات القلب (الديزوبيراميد).
- أدوية علاج النقرس (الألوبورينول، البروبينيسيد، السلفنبيرازون).
- أدوية علاج السرطان (السيكلوفوسفاميد، الإيفوسفاميد، التروفوسفاميد).
- الأدوية المستعملة لتخفيض الوزن (الفنفلورامين).
- الأدوية المستعملة لتحسين الدوران عندما تُحقن داخل الوريد بجرعات عالية (البنتوكسيفيلين).
- أدوية علاج الحساسيّات الأنفيّة مثل حمى القش (التريتوكالين).
- الأدوية المسمّاة حالّات الودي لعلاج عوارض ضغط الدم المرتفع والقصور القلبي واضطراب البروستات.

يمكن للأدوية التالية أن تُضعف المفعول المخفّض لسكّر الدم لأماريل مما قد يؤدّي إلى خطر التعرّض لفرط سكر الدم (ارتفاع مستوى السكّر في الدم):

- الأدوية التي تحتوي على الهورمونات الجنسيّة الأنثويّة (الأستروجين، المركّبات البروجستينيّة المفعول).
- أدوية درّ البول (مدرّات البول من الثيازايد).
- الأدوية المستعملة لتنشيط الغدّة الدرقية (مثل الليفوذيروكساين).
- أدوية علاج الحساسيّة والالتهاب (القشرانيّات السكريّة).
- أدوية علاج الاضطرابات العقليّة الحادة (الكلوربرومازين ومشتقّات فينوثيازين أخرى).
- الأدوية المستعملة لزيادة سرعة القلب ولعلاج الربو واحتقان الأنف والسعال والزكام، والأدوية المستعملة لخسارة الوزن أو تلك المستعملة في الحالات الطارئة التي تهدّد الحياة (الأدرينالين ومقلّدات الودي).
- أدوية علاج مستويات الكولسترول المرتفعة (حمض النيكوتينيك).
- الأدوية المستعملة لأمد طويل لعلاج الإمساك (المسهّلات).
- أدوية علاج الصرع (الفينيتوين).
- أدوية علاج التوتّر واضطرابات النوم (الباربيتورات).
- أدوية علاج الضغط المتزايد داخل العين (الأزيتازولاميد).
- أدوية علاج ضغط الدم المرتفع أو انخفاض نسبة السكر في الدم (الديازوكسيد).
- أدوية علاج حالات الخمج ومرض السلّ (الريفامبيسين).
- أدوية علاج نقص سكر الدم الحاد (الغلوكاغون).

يمكن للأدوية التالية أن تزيد أو تُضعف المفعول المخفّض لسكّر الدم لأماريل:

- أدوية علاج القرحة المعديّة (تُسمّى مضادات إيتش 2 H2).
- أدوية علاج ضغط الدم المرتفع أو القصور القلبي مثل حاصرات البيتا والكلونيدين والغوانيثيدين والرزربين. يمكن لهذه الأدوية أيضًا إخفاء عوارض نقص سكر الدم لذلك يجب اعتماد حذر خاص عند أخذ هذه الأدوية.

يمكن لأماريل زيادة أو إضعاف مفعول الأدوية التالية:

- الأدوية المثبّطة لتخثّر الدم (مشتقّات الكومرين مثل الوارفارين).

الكوليسيفلام دواء يستعمل لتخفيض الكوليسترول لديه تأثير على امتصاص أماريل، لتفادي هذا الاثر يجب عليك اخذ أماريل قبل تناول الكوليسيفلام بأربع ساعات على الاقل.

أخذ أماريل مع الطعام والشراب والكحول

يمكن لاستهلاك الكحول أن يزيد أو أن يخفّض مفعول أماريل المخفّض لسكر الدم بطريقة لا يمكن توقّعها.

الحمل والإرضاع

الحمل

لا ينبغي أخذ أماريل في خلال فترة الحمل. استشيري الطبيب إذا كنتِ حاملاً أو تعتقدين نفسك حاملاً أو كنت تنوين الحمل.

الإرضاع

يمكن أن يمرّ أماريل إلى حليب الثدي. لا ينبغي أخذ أماريل في خلال فترة الإرضاع. استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أيّ دواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

قد تضعف قدرتك على التركيز أو التفاعل إذا انخفض مستوى السكر في دمك (نقص سكر الدم) أو ارتفع (فرط سكر الدم) أو إذا كنت تعاني من مشاكل في البصر كنتيجة لهاتين الحالتين. يجب أن تعرف أنّك قد تعرّض نفسك أو آخرين للخطر (مثلاً عند قيادة سيّارة أو استعمال آلات). استشر طبيبك حول ما كان يمكن أن تقود إذا:

- كنت تُصاب باستمرار بنوبات نقص سكّر الدم،
- إذا كانت عوارض نقص سكر الدم قليلة أو غائبة.

يحتوي أماريل على اللاكتوز

إذا قال لك طبيبك إنّك لا تستطيع تحمّل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل أخذ هذا الدواء.

3. كيف يُؤخذ أماريل

خذ أماريل دائمًا حسب وصفة الطبيب تمامًا. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّدًا.

طريقة أخذ هذا الدواء

- خذ هذا الدواء عن طريق الفم قُبيل الوجبة الأساسية الأولى في اليوم أو معها (الفطور عادة). إذا كنت لا تأخذ الفطور يجب عليك أخذ الدواء في الوقت المحدد حسب وصفة الطبيب. من المهمّ عدم تفويت أيّ وجبات عندما تأخذ أماريل.
- إبلع الأقراص كاملة مع نصف كوب من الماء على الأقلّ. لا تسحق الأقراص أو تمضغها.

مقدار الجرعة

يتوقّف مقدار جرعة أماريل على حاجاتك ويحدده طبيبك بناء على مستويات السكّر التي تُظهرها فحوصات الدم والبول المخبريّة. لا تأخذ أقراصًا أكثر من تلك التي وصفها طبيبك.

- تبلغ جرعة البداية العادية قرصًا واحدًا من أماريل 1 ملغ مرّة واحدة في اليوم.
- عند الضرورة، يمكن أن يزيد الطبيب الجرعة بعد أسبوع إلى أسبوعين من العلاج.
- تبلغ الجرعة القصوى الموصى بها 6 ملغ من أماريل في اليوم.
- يمكن البدء بعلاج يجمع ما بين الغليميبيريد والمتفورمين أو الغليميبيريد والأنسولين. في هذه الحالة، سوف يحدّد طبيبك جرعات كلّ من الغليميبيريد أو المتفورمين أو الأنسولين التي تحتاج إليها.
- إذا تغيّر وزنك أو إذا غيّرت نمط حياتك أو إذا كنت تخضع لضغط ما، قد يكون من الضروري تعديل جرعة أماريل، لذلك أعلم طبيبك.
- إذا شعرت أن مفعول دوائك ضعيف جدًا أو قويّ جدًا، لا تغيّر الجرعة من تلقاء نفسك بل استشر الطبيب.

إذا أخذت كميّة مفرطة من أماريل

إذا أخذت جرعة مفرطة أو إضافيّة من أماريل تتعرّض لخطر الإصابة بنقص سكّر الدم (لعوارض نقص سكّر الدم راجع القسم 2). لذلك يجب عليك أن تستهلك على الفور كميّة كافية من السكر (مثلاً مكعّب سكّر أو عصير حلو أو شاي محلّى) وأعلم الطبيب على الفور. عند علاج نقص سكّر الدم إذا أخذ طفل ما الدواء عن طريق الخطأ، يجب التحقق بدقة من كميّة السكّر التي أخذها الطفل لتفادي إمكانيّة فرط سكّر الدم الذي يكون خطيرًا. لا ينبغي إعطاء شخص فاقد الوعي طعامًا أو شرابًا.

بما أنّ نقص سكّر الدم قد يدوم لبعض الوقت، يجب مراقبة المريض بدقّة إلى أن يزول الخطر. قد يكون من الضروري إدخال المريض المستشفى على سبيل الحيطة كذلك. أرِ الطبيب العلبة أو الأقراص الباقية، لكي يعرف الكميّة التي تمّ أخذها.

قد يترافق نقص سكر الدم الخطير مع فقدان الوعي ومع فشل عصبيّ خطير وهاتان هما حالتان طبيّتان طارئتان تتطلّبان علاجًا طبيًا فوريًا ودخول المستشفى. تأكّد دائمًا من أنّ أحد الأشخاص حولك يعرف وضعك الصحي لكي يتصل بالطبيب عند حصول حالة طارئة.

إذا نسيت أخذ أماريل

إذا نسيت أخذ جرعة، لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة التي نسيتها.

إذا توقّفت عن أخذ أماريل

إذا قطعت العلاج أو أوقفته يجب أن تعرف أنّه لا يعود من الممكن الحصول على المفعول المخفّض لسكر الدم وقد يتفاقم داء السكري الذي تعاني منه. استمرّ بأخذ أماريل إلى أن يطلب منك الطبيب التوقّف عن أخذه. إذا كان لديك أيّ أسئلة إضافيّة حول استعمال هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة

مثل الأدوية كلّها، قد يسبّب هذا الدواء تأثيرات جانبيّة لا تصيب المرضى كلّهم.

أعلم الطبيب على الفور إذا أُصبت بأحد العوارض التالية:

- ارتكاسات تحسسيّة (تتضمّن التهاب الأوعية الدمويّة وغالبًا طفحًا جلديًا). قد تتفاقم هذه الارتكاسات وتسبّب صعوبة في التنفّس وهبوطًا في ضغط الدم وتتطوّر لكي تصبح صدمة حتّى.
- اضطراب في وظيفة الكبد يتضمّن اصفرار البشرة والعينين (يرقان) ومشاكل في دفق المرّة (ركود الصفراء)، التهاب الكبد أو قصور الكبد.
- عوارض حساسيّة جلديّة (فرط حساسيّة) مثل الحكّة والطفح والشّرى وزيادة الحساسيّة تجاه الشمس. قد تتفاقم بعض الارتكاسات التحسسيّة المعتدلة وتصبح ارتكاسات خطيرة.
- نقص سكر حاد مع فقدان وعي أو نوبات أو سبات.

أصيب بعض المرضى بالتأثيرات الجانبيّة التالية في خلال فترة أخذهم أماريل:

التأثيرات الجانبيّة النادرة (تصيب مريضًا واحدًا على الأكثر من أصل 1000 مريض)

- نسبة سكر الدم أدنى من النسبة الطبيعيّة (نقص سكر الدم) (راجع القسم 2).
- انخفاض في عدد خلايا الدم:
  - صفيحات الدم (مما يزيد خطر النزف أو الازرقاق).
  - كريات الدم البيضاء (مما قد يزيد نسبة التعرّض لحالات خمج).
  - كريات الدم الحمراء (مما قد يجعل بشرتك تبدو أكثر شحوبًا ويسبّب التعب أو صعوبة في التنفّس).

بشكل عام، تتحسّن هذه المشاكل بعد التوقّف عن أخذ أماريل.

التأثيرات الجانبيّة النادرة جدًا (تصيب مريضًا واحدًا على الأكثر من أصل 10000 مريض)

- ارتكاسات تحسسيّة (تتضمّن التهاب الأوعية الدمويّة وغالبًا طفحًا جلديًا). قد تتفاقم هذه الارتكاسات لتصبح خطيرة وتسبّب صعوبة في التنفّس وهبوطًا في ضغط الدم وصدمة حتّى. إذا أصبت بأحد هذه العوارض، **أعلم الطبيب على الفور.**
- اضطرابات في وظيفة الكبد تتضمّن اصفرار البشرة والعينين (يرقان) ومشاكل في دفق المرّة (ركود الصفراء)، التهاب الكبد أو قصور الكبد. إذا أصبت بأحد هذه العوارض، **أعلم الطبيب على الفور.**
- غثيان، تقيّؤ، إسهال، الشعور بالانتفاخ أو بالتخمة، ألم في البطن.
- انخفاض في كميّة الصوديوم في دمك (تُظهره فحوصات الدم).

تتضمّن التأثيرات الجانبيّة الأخرى ما يلي:

- قد تحصل عوارض حساسيّة جلديّة (فرط حساسيّة) مثل الحكّة الطفح والشّرى وزيادة الحساسيّة تجاه الشمس. قد تتفاقم بعض الارتكاسات التحسسيّة المعتدلة لتصبح خطيرة مما يؤدّي إلى صعوبة في التنفّس أو البلع وتورّم الشفتين أو الحلق أو اللسان. لذلك إذا أصبت بأحد هذه التأثيرات الجانبيّة، **أعلم الطبيب على الفور.**
- قد تحصل ارتكاسات تحسسيّة مع أدوية السلفونيل يوريا والسلفوناميد أو الأدوية ذات الصلة.
- قد تحصل اضطرابات بصريّة عندما تبدأ العلاج بأماريل بسبب التغييرات في مستويات سكّر الدم ويجب أن تتحسّن هذه الاضطرابات سريعًا.
- زيادة في أنزيمات الكبد.
- نزف أو ازرقاق حاد غير طبيعي تحت الجلد.

الإفادة عن التأثيرات الجانبيّة

في حال تعرّضت لأيّ تأثيرات جانبيّة، أعلم الطبيب أو الصيدلي أو الممرض(ة). ويتضمّن هذا أيّ تأثيرات جانبيّة محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. بالإفادة عن التأثيرات الجانبيّة، يمكنك المساعدة على تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف يُحفظ أماريل

إحفظ الدواء بعيدًا عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا تستعمل الدواء بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحيّة المدوّن بعد كلمة ‘EXP’ على الظّرف وعلبة الكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحيّة إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

أقراص أماريل 1 ملغ و2 ملغ و3 ملغ و4 ملغ: لا تحفظها في حرارة تفوق 30 درجة مئويّة.

إحفظ الدواء في علبته الأصليّة لحمايته من الرطوبة.
لا تستعمل هذا الدواء إذا لاحظت إشارات تلف ظاهرة.

لا ينبغي رمي الأدوية في المياه المبتذلة أو مع النفايات المنزليّة. اطلب من الصيدلي التخلّص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

ماذا يحتوي أماريل

- المادة الفاعلة هي الغليميبيريد.

يحتوي كلّ قرص على 1 ملغ أو 2 ملغ أو 3 ملغ أو 4 ملغ من الغليميبيريد حسب العيار المدوّن على الظرف وعلبة الكرتون.

- المركّبات الأخرى هي: لاكتوز وحيد التميّه، غليكولات نشا الصوديوم (النوع أ)، ستيارات المغنيزيوم، سلولوز دقيق البلوريّة، بوفيدون 25000.
- تحتوي الأقراص كذلك على مواد ملوّنة:
  - أقراص الـ 1 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأحمر (إي 172).
  - أقراص الـ 2 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأصفر (إي 172) و لك الألومنيوم النيلي القرمزي (إي 132).
  - أقراص الـ 3 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأصفر (إي 172).
  - أقراص الـ 4 ملغ تحتوي على لك الألومنيوم النيلي القرمزي (إي 132).

كيف هو شكل أماريل ومحتويات العلبة

كلّ قرص من أماريل هو مستطيل الشكل مع خطّ للقطع من الجهتين. يمكن قطع الأقراص الى نصفين متساويين.

الأقراص مختلفة الألوان:

- أقراص الـ 1 ملغ زهريّة اللون.
- أقراص الـ 2 ملغ خضراء اللون.
- أقراص الـ 3 ملغ لونها أصفر باهت.
- أقراص الـ 4 ملغ لونها أزرق فاتح.

تأتي الأقراص في علب ظروف من 30 و120 قرصًا.
قد لا تكون أحجام العلب كلّها مسوّقة.

الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المصنّعة

حامل رخصة التسويق:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
65926 Frankfurt am Main, Germany

الشركة المصنّعة:
Sanofi-Aventis S.p.A.
Strada Statale 17, Km 22
67019 Scoppito (L’Aquila), Italy

تاريخ المراجعة الأخيرة لهذه النشرة: تشرين الأوّل 2013.

ان هذا الدواء

مستحضر يوثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.