Amaryl®

نشرة دوائية: معلومات للمستعمل
أمارييل® 1 ملغ، 2 ملغ، 3 ملغ و4 ملغ أقراص

غليميبيريد

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك
- احتفظ بهذه النشرة لعلك تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اطرحها على الطبيب أو الصيدلي.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه أبداً إلى شخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لعوارضك لأنه قد يؤذيه.
- إذا أصبت بأي تأثيرات جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي بخصوص ذلك أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:
1. ما هو أمارييل وما هي دواعي استعماله
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أخذ أمارييل
3. كيف يُؤخذ أمارييل
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. كيف يُحفظ أمارييل
6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هو أمارييل وما هي دواعي استعماله

الفئة الدوائية العلاجية
أمارييل هو دواء يخفّض سكر الدم لأنه يحثّ على طرح الغم ويتضمن إلى مجموعة من الأدوية تخفّض مستويات السكّر في الدم تدعى السلفونيل يوريا. يعمل أمارييل عبر زيادة كمية الأنسولين التي يطلقها البنكرياس. ومن ثم يخفّض الأنسولين مستويات السكّر في دمك.

دواعي الاستعمال العلاجية
لماذا يُستعمل أمارييل:
- يُستعمل أمارييل لعلاج نوع معيّن من السكّري (داء السكري من النوع الثاني) عندما لم تكف الحمية الغذائية والتمارين الرياضية وفقدان الوزن للتحكم بمستويات سكّر الدم.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أخذ أمارييل

موانع الاستعمال
لا تأخذ أمارييل وأعلم الطبيب،
- إذا كنت تعاني من حساسيّة ضد الغليميبيريد أو مركّبات سولفونيل يوريا أخرى (أدوية تخفّض سكر الدم مثل الغليبنكلاميد) أو أدوية السلفوناميد (أدوية لعلاج حالات الخمج البكتيريّة مثل السلفاميثوكسازول) أو أيّ مركّب آخر من مركبات هذا الدواء (المذكورة في القسم 6).
- إذا كنت تعاني من داء السكري المعتمد على الأنسولين (داء السكري من النوع 1).
- إذا كنت تعاني من الحماض الكيتوني السكري (مضاعفة من مضاعفات السكري يرتفع فيها مستوى الحمض في جسمك وقد تسبّب بعض العوارض التالية: تعب وعَثيان وبَول متكرّر وتيبّس عضلي).
- إذا كنت في غيبوبة السكري.
- إذا كنت مصاباً بمرض كلوي خطير.
- إذا كنت مصاباً بمرض كبدي خطير.
- لا تأخذ هذا الدواء إذا كانت إحدى الحالات أعلاه تنطبق عليك. في حال الشكّ، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أمارييل.

محاذير مناسبة للاستعمال؛ تحذيرات خاصة
تحذيرات ومحاذير
تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ دوائك إذا،
- كنت تعاني من جرح أو من عدوى أو من حالة جمع مصحوبة بالحمى أو من أيّ شكل آخر من المضغط. أعلم الطبيب لأنّه قد يكون من الضروري تغيير العلاج مؤقتاً.
- كنت تعاني من اضطراب خطير في الكبد أو الكليتين.
إذا لم تكن متأكّداً ممّا إذا كانت إحدى هذه الحالات تنطبق عليك، تحدّث إلى الطبيب أو إلى الصيدلي قبل أخذ أمارييل.

يمكن أن يخطط انخفاض في مستوى الغيموغلوبين وانحلال في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي) لدى المرضى الذين يفتقرون إلى الإنزيم نازعة هيدروجين الغلوكوز 6- فوسفات.

المعلومات المتوافرة حول استعمال أمارييل لدى المرضى ما دون 18 عاماً محدودة. لذلك، لا يُنصح باستعماله لدى هؤلاء المرضى.

معلومات مهمة حول تنقص سكر الدم (انخفاض مستوى السكر في الدم)
عندما تأخذ أمارييل، قد تتعرّض لنقص سكر الدم (انخفاض مستوى السكّر في الدم). الرّجاء راجع الفقرة أدناه لتحصل على معلومات إضافية حول نقص سكر الدم وعوارضه وعلاجه.

يمكن أن تزيد العوامل التالية من خطر التعرّض لنقص سكر الدم،
- نقص التغذية، عدم انتظام أوقات الوجبات، تفويت وجبات أو تأخيرها أو فترة صيام.
- تغييرات في النظام الغذائي.
- أخذ أقراص أمارييل أكثر من حاجتك.
- ضعف في الوظيفة الكلوية.
- مرض خطير في الكبد.
- إذا كنت تعاني من بعض الاضطرابات الهورمونيّة (مثلاً اضطرابات في الغدّة الدرقيّة أو الغدّة النخاعيّة أو قصور في الغدّة النخاميّة).
- شرب الكحول (بخاصة عند تفويت وجبة).
- أخذ بعض الأدوية الأخرى (راجع فقرة «الأدوية الأخرى وأمارييل»).
- إذا زدت التمارين الرياضيّة التي تقوم بها وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الطعام أو إذا كنت تأكل طعاماً يحتوي على كمية كربوهيدرات أقلّ من المعادة.

تتضمّن عوارض نقص سكر الدم ما يلي:
• شعور مفاجئ بالجوع، صداع، غثيان، تقيّؤ، خمول، نعاس، اضطرابات في النوم، عدم راحة، عدائيّة، صعوبة في التركيز، تضعّف في الانتباه وفي القدرة على التفاعل، اكتئاب، تشوّش ذهني، اضطراب بالنطق والبصر، تقلص في الكلام، رُعاش، شلل جزئي، اضطرابات حسيّة، دوار، الشعور بعجز.
• يمكن حصول العوارض التالية أيضًا: تعرّق كثيف، بشرة رطبة، قلق، تسارع دقّات القلب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان، ألم مفاجئ وقوي في الصدر قد ينتشر إلى مناطق مجاورة (ذبحة صدرية) واضطرابات في النظم القلبي).

إذا استمرّت مستويات السكّر في دمك بالانخفاض، قد تصاب بتشوّش ذهني كبير (هديان) وبالهلوسات وبفقدان الوعي بالذات وقد يصبح تنفّسك سطحياً وتتباطأ ضربات قلبك وتنقد الوعي. قد تشبه الصورة السريرية لنقص سكر الدم الحاد السكتة الدماغيّة.

طريقة أخذ هذا الدواء
• خذ هذا الدواء عن طريق الفم قُبيل الوجبة الأساسية الأولى في اليوم أو معها (الفطور عادة). إذا كنت لا تأخذ الفطور يجب عليك أخذ الدواء في الوقت المحدد حسب وصفة الطبيب.
من المهمّ عدم تفويت أيّ وجبات عندما تأخذ أمارييل.
• ابلع الأقراص كاملة مع نصف كوب من الماء على الأقلّ. لا تسحق الأقراص أو تمضغها.

مقدار الجرعة
يتوقّف مقدار جرعة أمارييل على حاجاتك، ويحدده طبيبك بناء على مستويات السكّر التي تُظهرها فحوصات الدم والبول المخبرية. لا تأخذ أقراصًا أكثر من تلك التي وصفها طبيبك.
• تبلغ جرعة البداية العادية قرصًا واحدًا من أمارييل 1 ملغ مرّة واحدة في اليوم.
• عند الضرورة، يمكن أن يزيد الطبيب الجرعة بعد أسبوع إلى أسبوعين من العلاج.
• تبلغ الجرعة القصوى الموصى بها 6 ملغ من أمارييل في اليوم.
يمكن البدء بعلاج يجمع ما بين الغليميبيريد والميتفورمين أو الغليميبيريد والأنسولين.
في هذه الحالة، سوف يحدّد طبيبك جرعات كلّ من الغليميبيريد أو الميتفورمين أو الأنسولين التي تحتاج إليها.
• إذا تغيّر وزنك أو إذا تغيّرت نمط حياتك، أو إذا كنت تخضع لضغط ما، فقد يكون من الضروري تعديل جرعة أمارييل. لذلك أعلم طبيبك.
• إذا شعرت أن مفعول دوائك ضعيف جدًا أو قويّ جدًا، لا تغيّر الجرعة من تلقاء نفسك بل استشر الطبيب.

إذا كنت كمية مفرطة من أمارييل
إذا أخذت جرعة مفرطة أو إضافية من أمارييل يتعرّض لخطر الإصابة بنقص سكّر الدم (العوارض تنقص سكّر الدم راجع القسم 2). لذلك يجب عليك أن تتناولك على الفور كمية كافية من السكر (مثلاً مكعّب سكّر أو عصير حلو أو شاي محلّى) وأعلم الطبيب على الفور. عند علاج نقص سكر الدم إذا أخذ طفل ما الدواء عن طريق الخطأ، يجب التحقق بدقة من كمية السكر التي أخذها الطفل لتفادي إمكانيّة فرط سكّر الدم الذي يشكّل خطورة. لا ينبغي إعطاء شخص فاقد الوعي طعامًا أو شرابًا.

قد يتراقع نقص سكر الدم الخطير مع فقدان الوعي ومع فشل عصبيّ وهو شكل عصبيّ خطير وهائل ممّا حالتان طبيّتان طارئتان تتطلّبان علاجًا طبّيًا فوريًا ودخول المستشفى. تأكّد دائمًا من أنّ أحد الأشخاص حولك يعرف ونصف الصحيح لكي يتصل بالطبيب عند حصول حالة طارئة.

إذا نسيت أخذ أمارييل
إذا نسيت أخذ جرعة، لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة التي نسيتها.

إذا توقفت عن أخذ أمارييل
إذا قطعت العلاج أو أوقفته يجب أن تعرف أنّه لا يعود من الممكن الحصول على المفعول المخفّض لسكر الدم وقد يتفاقم داء السكري الذي تعاني منه. استشر دائمًا أمارييل إلى أن يطلب منك الطبيب التوقّف عن أخذه، إذا كان لديك أيّ أسئلة إضافيّة حول استعمال هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة
مثل الأدوية كلها، قد يسبّب هذا الدواء تأثيرات جانبيّة لا تصيب المرضى كلّهم.

أعلم الطبيب على الفور إذا أصبت بأحد العوارض التالية :
• ارتكاسات تحسسيّة (تتضمّن التهاب الأوعية الدموية وغالبًا طفحًا جلديًا).
قد تتفاقم هذه الارتكاسات وتسبّب صعوبة في التنفّس وهبوطًا في ضغط الدم وتتطوّر لكي تصبح صدمة حتّى.
• اصفرار في وظيفة الكبد يتضمّن اصفرار البشرة والعينين (يرقان) ومشاكل في دفق المرّة (زكود الصفراء). التهاب الكبد أو قصور الكبد.
• عوارض حساسيّة جلديّة (طرح حساسيّة) مثل الحكّة والطفح والشّرى وزيادة الحساسيّة تجاه الشمس. قد تتفاقم بعض الارتكاسات التحسسيّة المعتدلة وتصبح ارتكاسات خطيرة.
• نقص سكر حاد مع فقدان وعي أو نوبات أو سبات.

أصب بعض المرضى بالتأثيرات الجانبيّة التالية في خلال فترة أخذهم أمارييل:

التأثيرات الجانبية النادرة (تصيب مريضًا واحدًا على الأكثر من أصل 1000 مريض)
• نسبة سكر الدم أدنى من النسبة الطبيعيّة (نقص سكر الدم) (راجع القسم 2).
• انخفاض في عدد خلايا الدم:
• صفيحات الدم (مما يزيد خطر النزف أو الارزقاق).
• كريات الدم البيضاء (مما قد يزيد نسبة التعرّض لحالات خمج).
• كريات الدم الحمراء (مما قد يجعل يشرتك تبدو أكثر شحوبًا ويسبّب التعب أو صعوبة في التنفّس).

التأثيرات الجانبية النادرة جدًا (تصيب مريضًا واحدًا على الأكثر من أصل 10000 مريض)
• ارتكاسات تحسسيّة (تتضمّن التهاب الأوعية الدموية وغالبًا طفحًا جلديًا).
قد تتفاقم هذه الارتكاسات لتصبح خطيرة وتسبّب صعوبة في التنفّس وهبوطًا في ضغط الدم وصدمة حتّى. إذا أصبت بأحد هذه العوارض، **أعلم الطبيب على الفور.**
• اضطرابات في وظيفة الكبد تتضمّن اصفرار البشرة والعينين (يرقان) ومشاكل في دفق المرّة (زكود الصفراء). التهاب الكبد أو قصور الكبد. إذا أصبت بأحد هذه العوارض، **أعلم الطبيب على الفور.**
• عثيان، تقيّؤ، إسهال، الشعور بالانتفاخ أو بالتخمة، ألم في البطن.
• انخفاض في كمية الصوديوم في دمك (تظهره فحوصات الدم).

تتضمّن التأثيرات الجانبية الأخرى ما يلي:
• قد تصابح عوارض تحسسيّة جلديّة (طرح حساسية) مثل الحكّة الطفح والشّرى وزيادة الحساسيّة تجاه الشمس. قد تتفاقم بعض الارتكاسات التحسسيّة المعتدلة لتصبح خطيرة مما يؤدّي إلى صعوبة في التنفّس أو البلع وتوّرم الشفتين أو الحلق أو اللسان. لذلك إذا أصبت بأحد هذه التأثيرات الجانبيّة، **أعلم الطبيب على الفور.**
• قد تحصل ارتكاسات تحسسيّة مع أدوية السلفونيل يوريا والسلفوناميد أو الأدوية ذات الصلة.
• قد تحصل اضطرابات بصريّة عندما تبدأ العلاج بأمارييل بسبب التغييرات في مستويات سكّر الدم ويجب أن تتحسّن هذه الاضطرابات سريعًا.
• زيادة في التريعات الكبد.
• تَرَف أو ارزقاق حاد غير طبيعي تحت الجلد.

الإفادة عن التأثيرات الجانبية
في حال تعرّضت لأيّ تأثيرات جانبيّة. أعلم الطبيب أو الصيدلي أو المرض(ة). ويتضمّن هذا أيّ تأثيرات جانبيّة محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. بالإفادة عن التأثيرات الجانبيّة، يمكنك المساعدة على تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف يُحفظ أمارييل
إحفظ الدواء بعيدًا عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا تستعمل الدواء بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحيّة المدوّن بعد كلمة 'EXP' على الظّرف وعلبة الكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحيّة إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

أقراص أمارييل 1 ملغ و2 ملغ و3 ملغ و4 ملغ: لا تحتفظها في حرارة تفوق 30 درجة مئويّة.

إحفظ الدواء في علبته الأصليّة لحمايته من الرطوبة.
لا تستعمل هذا الدواء إذا لاحظت إشارات تلف ظاهرة.

لا ينبغي رمي الأدوية في المياه المبتذلة أو مع النفايات المنزليّة. اطلب من الصيدلي المتخصّص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. فضن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

ماذا يحتوي أمارييل
• المادة الفاعلة هي الغليميبيريد.
يحتوي كلّ قرص على 1 ملغ أو 2 ملغ أو 3 ملغ أو 4 ملغ من الغليميبيريد حسب العيار المدوّن على الظرف وعلبة الكرتون.
• المركبات الأخرى هي: لاكتوز وحيد التميّه، غليكولات نشا الصوديوم (النوع أ)، سيتيرات المغنيزيوم، سيلولوز دقيق البلورة، بوفيدون 25000.
• تحتوي الأقراص كذلك على مواد ملوّنة:
• أقراص أمارييل 1 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأحمر (إي 172).
• أقراص أمارييل 2 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأصفر (إي 172) و لك الألومنيوم النيلي المرمزي (إي 132).
• أقراص أمارييل 3 ملغ تحتوي على أكسيد الحديد الأصفر (إي 172).
• أقراص أمارييل 4 ملغ تحتوي على لك الألومنيوم النيلي المرمزي (إي 132).

كيف هو شكل أمارييل ومحتويات العلبة
كلّ قرص من أمارييل هو مستطيل الشكل مع خطّ للفتح من الجهتين. يمكن قطع الأقراص إلى نصفين متساويين.
الأقراص مختلفة الألوان:
• أقراص الـ 1 ملغ زهريّة اللون.
• أقراص الـ 2 ملغ خضراء اللون.
• أقراص الـ 3 ملغ لونها أصفر ناعم.
• أقراص الـ 4 ملغ لونها أزرق فاتح.

تأتي الأقراص في علب ظروف من 30 و120 قرصًا.
قد لا تكون أحجام العلب كلها مسوّقة.

الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المصنّعة
حامل رخصة التسويق:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
65926 Frankfurt am Main, Germany

الشركة المصنّعة:
Sanofi-Aventis S.p.A.
Strada Statale 17, Km 22
67019 Scoppito (L'Aquila), Italy

تاريخ المراجعة الأخيرة لهذه النشرة: تشرين الأوّل 2013.

ان هذا الدواء
مستحضر يوفر على صحتك و استهلاكك خلالا التعليمات يعرفنك الطبيب.
اتبع دقيقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
• الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و طبقه و ضرره.
• لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
• لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب
• لا تترك الادوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
والاتحاد العربي لمالية العربية.

THIS MEDICAMENT
Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
• The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
• Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

علاج نقص سكر الدم،
في الكثيرة الحالات، تختفي عوارض نقص سكّر الدم بسرعة كبيرة بعد استهلاك السكر مثلاً مكعّبات السكر أو شراب حلو أو شاي محلّى.
لذلك يجب عليك دائمًا أخذ شكل من أشكال السكر معك (مثلاً مكعّبات سكر). والجدير ذكره أنّ المحلّيات الاصطناعيّة غير فعّالة. اتصل بالطبيب أو اذهب إلى المستشفى في حال لم يساعدك. أخذ السكر أو في حال عاودتك العوارض.

الفحوصات المخبرية
يجب التحقق بانتظام من مستوى السكّر في دمك أو بولك. قد يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم لمراقبة تعداد خلايا الدم والوظيفة الكبدية لديك.

الأطفال والمراهقون
لا يُنصح باستعمال أمارييل لدى الأطفال ما دون الثامنة عشرة من العمر.

الأدوية الأخرى وأمارييل
أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخّرًا أو إذا كان من المحتمل أن تأخذ أيّ أدوية أخرى.
قد يُضطرّ طبيبك إلى تغيير الجرعة التي تأخذها من أمارييل إذا كنت تأخذ أدوية أخرى أثناء قد تصعف أو تقوّي مفعول أمارييل على مستوى السكر في دمك.
ينطبق ذلك على الأدوية التالية:
• أدوية أخرى لعلاج داء السكري (مثل الأنسولين أو الميتفورمين).
• أدوية علاج الألم أو الالتهاب (الفينيلبوتازون، الأوكسيفينبوتازون، الأوكسيفينبوتازون، الأدوية الشبيهة بالأسبيرين).
• أدوية علاج حالات الخمج البوليّة (مثل بعض أدوية السلفوناميد الطويلة المفعول).
• أدوية علاج حالات الخمج البكتيريّة والفطريّة (الترانسيكلين، كلورامفينيكول، الفلوكونازول، الميكونازول، الكيتوكونازول، الكلاريثروميسين).
• الأدوية المثبّطة لتخثّر الدم (مشتقّات الكومرين مثل الوارفارين).
• الأدوية التي تعزّز بناء العضلات (الابتنائيّات).
• الأدوية المستعملة لعلاج البديل عن الهورمون الجنسي الذكري.
• أدوية علاج الاكتئاب (الفلوكسيتين، مثبّطات أكسيداز الأمين الأحادي).
• الأدوية المخصّصة لستويات الكولسترول العالية (الفيبرات).
• الأدوية المخصّصة لضغط الدم العالي (مثبّطات الأنزيم المحوّل للأنجيوتنسين).
• الأدوية المسمّاة مضادات الالتهابيّة المستعملة للتحكّم بعدم انتظام ضربات القلب (الديزوبيرامید).
• أدوية علاج التقرّس (الألوبورينول، البروبينيسيد، السلفينبيرازون).
• أدوية علاج السرطان (السيكلوفوسفاميد، الإيفوسفاميد، التروفوسفاميد).
• الأدوية المستعملة لتخفيض الوزن (الفنفلورامين).
• الأدوية المستعملة لتحسين الدوران عندما تُحثّ داخل الوريد بجرعات عالية (البنتوكسيفيلين).
• أدوية علاج الحساسيّات الأنفيّة مثل حمى القش (التريتوكاولين).
• الأدوية المسمّاة حالات الوذي لعلاج عوارض ضغط الدم المرتفع والقصور القلبي واضطراب الدوروستات.

يمكن للأدوية التالية أن تُضعف المفعول المخفّض لسكر الدم لأمارييل مما قد يؤدّي إلى خطر التعرّض لفرط سكر الدم (ارتفاع مستوى السكّر في الدم):
• الأدوية التي تحتوي على الهورمونات الجنسيّة الأنثويّة (الأستروجين، المركّبات البروجستيّة المفعول).
• الأدوية درّ البول (مدرّات البول من الثيازايد).
• الأدوية المستعملة لتشييط الغدّة الدرقية (مثل الليفوثيروكسايين).
• أدوية علاج الحساسيّة والالتهاب (الفشرانيّات السكريّة).
• أدوية علاج الاضطرابات العقليّة الحادة (الكلوربرومازين) ومشتقات فينوثيازين أخرى).
• الأدوية المستعملة لزيادة سرعة القلب ولعلاج الربو واحتقان الأنف والسعال والزكام. والأدوية المستعملة لخسارة الوزن أو تلك المستعملة في الحالات الطارئة التي تهدّد الحياة (الأدرينالين ومقلدات الودي).
• أدوية علاج مستويات الكولسترول المرتفعة (حمض النيكوتينيك).
• الأدوية المستعملة لأمد طويل لعلاج الإسهالات (المهلّلات).
• أدوية علاج الصرع (الفينيتوين).
• أدوية علاج التوتّر واضطرابات النوم (الباربيتورات).
• أدوية علاج الضغط المتزايد داخل العين (الأزيتازولاميد).
• أدوية علاج ضغط الدم المرتفع أو انخفاض نسبة السكر في الدم (الدياذوكسيد).
• أدوية علاج حالات الخمج ومرض البلّ (الريفامبيسين).
• أدوية علاج نقص سكر الدم الحاد (الغلوكاغون).

يمكن للأدوية التالية أن تزيد أو تُضعف المفعول المخفّض لسكّر الدم لأمارييل:
• أدوية علاج القرحة المعدية (تُسمّى مضادات إيتش 2 H2)،
• أدوية علاج ضغط الدم المرتفع أو القصور القلبي مثل حاصرات البيتا والكوانيدين
والغوانيثيدين والرزربين. يمكن لهذه الأدوية أيضًا إخفاء عوارض نقص سكر الدم لذلك يجب اعتماد حذر خاص عند أخذ هذه الأدوية.

يمكن لأمارييل زيادة أو إضعاف مفعول الأدوية التالية:
• الأدوية المثبّطة لتخثّر الدم (مشتقّات الكومرين مثل الوارفارين).
الكلوبيملايد دواء يستعمل لتخفيض الكوليسترول لديه تأثير على استصاص أمارييل. لتفادي هذا الأثر يجب عليك أخذ أمارييل قبل تناول الكلوبيملايد بأربع ساعات على الأقل.

أخذ أمارييل مع الطعام والشراب والكحول
يمكن لاستهلاك الكحول أن يزيد أو أن يخفّض مفعول أمارييل المخفّض لسكر الدم بطريقة لا يمكن توقّعها.

الحمل والارضاع
الحمل
لا ينبغي أخذ أمارييل في خلال فترة الحمل. استشيري الطبيب إذا كنت حاملاً أو تعتقدين نفسك حاملاً أو كنت تنوين الحمل.

الارضاع
يمكن أن يمرّ أمارييل إلى حليب الثدي. لا ينبغي أخذ أمارييل في خلال فترة الإرضاع.
استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات
قد تضعف قدرتك على التركيز أو التفاعل إذا انخفض مستوى السكر في دمك (نقص سكر الدم) أو ارتفع (فرط سكر الدم) أو إذا كنت تعاني من مشاكل في البصر كتلبكة لهاتين الحالتين. يجب أن تعرف أنّك قد تعرّض نفسك أو آخرين للخطر (مثلاً عند قيادة سيّارة أو استعمال آلات). استشر طبيبك حول ما كان يمكن أن تقود إذا:
• كنت تُصاب باستمرار بنوبات نقص سكّر الدم.
• إذا كانت عوارض نقص سكر الدم طبلة أو غائبة.

يحتوي أمارييل على اللاكتوز
إذا قال لك طبيبك إنّك لا تستطيع تحمّل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل أخذ هذا الدواء.

3. كيف يُؤخذ أمارييل
خذ أمارييل دائمًا حسب وصفة الطبيب تمامًا. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّدًا.