

أفالوكس® ٤٠٠ مجم <p>موكسيغلوكساسين</p>
<div></div> <div>نشرة العبوة: معلومات للمستخدم أفالوكس ٤٠٠ مجم – أقراص مغلفة الاستخدام البالغين موكسيغلوكساسين</div>
اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة تختصك.
⚠ احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج قراءتها مرة أخرى.
⚠ إذا كان لديك أية أسئلة إضافية، اسأل الطبيب أو الصيدلي.
⚠ هذا الدواء تم وصفه لك شخصياً. لا يجب أن يعطى لآخرين . يمكن أن يسبب الضرر لهم حتى لو كان لديهم نفس الأعراض المرضية منكلك.
⚠ إذا لم تصابك بأية آثار جانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي، هذا يشمل أية آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة. انظر قسم ٤.

- ماذا تحتوي هذه النشرة
- ما هو أفالوكس و فيما يستخدم
- ما الذي تحتاج معرفته قبل أن تتناول أفالوكس
- كيفية تناول أفالوكس
- الآثار الجانبية المحتملة
- كيفية تخزين أفالوكس
- معلومات العبوة و معلومات أخرى

١. ما هو أفالوكس وفيما يستخدم

يحتوي أفالوكس على موكسيغلوكساسين كمادة فعالة والتي تنتمي لمجموعة المضادات الحيوية (الantibiotics) المكتسبة من خارج الممتلكتي (ما عدا الحالات الشديدة).
عندوى بسيطة إلى متوسطة الشدة في الجهاز التناسلي العلوي لإلتهاب (المرض التهاب الحوض)، تشمل عدوى بوق بالوب و النساء الحاملتي المرضي للرحم.
أقراص أفالوكس غير كافية كعلاج واحد لهذه النوعية من العدوى، لذلك يجب على طبيب أن يصف مضاد حيوي آخر بالإضافة لأقراص أفالوكس لعلاج عدوى الجهاز التناسلي العلوي لإلتهاب (انظر الجزء ٢ – ما الذي تحتاج معرفته قبل أن تتناول أفالوكس. التحذيرات و الاحتياطات. أبلغ طبيبك قبل تناول أفالوكس).
تدمور مفاجئة لإلتهاب طويل المدى في الشعب الهوائية أو عدوى في الرئة (الالتهاب الرئوي) المكتسبة من خارج المستشفى (ما عدا الحالات الشديدة).
عدوى بسيطة إلى متوسطة الشدة في الجهاز التناسلي العلوي لإلتهاب (المرض التهاب الحوض)، تشمل عدوى بوق بالوب و النساء الحاملتي المرضي للرحم.
أقراص أفالوكس غير كافية كعلاج واحد لهذه النوعية من العدوى، لذلك يجب على طبيب أن يصف مضاد حيوي آخر بالإضافة لأقراص أفالوكس لعلاج عدوى الجهاز التناسلي العلوي لإلتهاب (انظر الجزء ٢ – ما الذي تحتاج معرفته قبل أن تتناول أفالوكس. التحذيرات و الاحتياطات. أبلغ طبيبك قبل تناول أفالوكس).

يجب أن تظهر العدوى البكتيرية التالية خسن خلال بداية العلاج بحلول أفالوكس للتسريب. يمكن أيضاً أن يصف طبيب أقراص أفالوكس لإلتهاب المدة لفترة من العلاج.
عدوى الرئة (الالتهاب الرئوي) المكتسبة من خارج المستشفى. عدوى الجلد و الانسجة الرخوة. يجب عدم تناول أقراص أفالوكس لبدء العلاج لأن نوع من عدوى الجلد و الانسجة الرخوة أو لعدوى شديدة في الرئة.

٢. ما الذي تحتاج معرفته قبل أن تتناول أفالوكس

أبلغ الطبيب، في حالة عدم التأكد ما إذا كنت تنتمي لمجموعة من المرضي المذكورة بالأسفل.

لا تتناول أفالوكس في الحالات الآتية:

- إذا كان لديك حساسية للمادة الفعالة، موكسيغلوكساسين، أي مضادات حيوية من مجموعة الكينولونات الأخرى أو لآحد المكونات الأخرى (المذكورة في الجزء ١).
- إذا كان هناك حمل أو في حالة الرضاعة الطبيعية.
- إذا كان عمرك أقل من ١٨ عام.
- إذا كان لديك أي للمشي مرض في وتر عضلي أو تلف له علاقة مع علاج سابق بالمضادات الحيوية من مجموعة الكينولون (انظر الأجزاء الخاصة بالتحذيرات و الاحتياطات و ٤ – الآثار الجانبية المحتملة).
- إذا كان لديك منذ الولادة أو أصبت بأي حالة معها تغيرات غير عادية في إفراز القلب (ظاهرة (خاصة مستوى البوتاسيوم و المغنسيوم في الدم)، إن كان لديك عدم إززان الأملاح في الدم. بطيء جداً (انسمي ببطء في معدل سرعة القلب). إذا كان لديك ضعف بالقلب (قصور القلب). إذا كان لديك أي في وقت عدم انتظام إفراز القلب بالشكل الطبيعي أو أنك تتناول أدوية أخرى التي يمكن أن تسبب تغيرات غير طبيعية في رسم القلب الكهربائي ECG (انظر الجزء تناول أدوية أخرى و أفالوكس). إذا كان أفالوكس يمكن أن يسبب تغيرات في رسم القلب الكهربائي، التي هي استجابة لفترة QT. ذلك يعني تأخر انتقال الإشارات الكهربائية.
- إذا كنت تعاني من اضطراب خطير في الكبد أو إذا ارتفعت إنزيمات الكبد (ناقلة الأمين) في الجسم لأكثر من خمسة أضعاف الحد الأقصى الطبيعي.

التحذيرات و الاحتياطات

قبل أن تتناول هذا الدواء

يجب ألا تتناول الأدوية المضادة للبكتيريا من مجموعة الفلوروكينولون / الكينولون. بما في ذلك أفالوكس إذا كنت قد عانيت في الماضي من أي آثار جانبية خطيرة عند تناول الكينولون أو الفلوروكينولون. في هذه الحالة، يجب عليك إبلاغ طبيبك في أقرب وقت ممكن.

أبلغ طبيبك قبل تناول أفالوكس

- يمكن أن يسبب أفالوكس **تغير في رسم القلب الكهربائي ECG**. خاصة إذا كان المرض سيده أو من كبار السن. إذا كنت لاحظت وجود دم أو خضف في البراز، يجب التوقف عن تناول أفالوكس **في الدم**. أبلغ طبيبك قبل تناول أفالوكس (انظر أيضاً الأجزاء لا تتناول أفالوكس و تناول أفالوكس مع أدوية أخرى).
- إذا عانيت في أي وقت مضى من **طفح جلدي شديد أو من تفتّر جلدي، ففاعة صغيرة على الجلد ملوثة بالسديم (مصل الدم) و / أو تقرحات في الفم** بعد تناول موكسيغلوكساسين.
- إذا كنت تعاني من **الصرع** أو من حالة جعلك أكثر عرضة **للتشنج**. أبلغ طبيبك قبل تناول أفالوكس.
- إذا كان لديك الآن أو في أي وقت مضى أية **مشاكل في الصحة النفسية**. أبلغ طبيبك قبل تناول أفالوكس.
- إذا كنت تعاني من **وهن عضلي وخيم**، فإن تناول أفالوكس يمكن أن يسبب تفاقم أعراض هذا المرض. إذا كنت تعتقد أن هذا التأثير حدث لك، أبلغ طبيبك فوراً.
- إذا تم تشخيصك بآلآك مصاب ب**تضخم أو انتفاخ** **لوعاء دموي كبير** (عند شريان أورطي أو تمد وعاء دموي كبير خارج الشريان والدماع).
- إذا كنت قد عانيت في الماضي من الإصابة ب**تقرق يصيب جدار الشريان الأورطي** بسبب تدفق الدم بين الطبقات الكهنة لجدار الشريان (تقرق في جدار الشريان الأورطي).
- إذا تم تشخيصك بارترجاع صمام القلب.
- إذا كان لديك تاريخ عائلي مرضي **لتمدد الشريان الأورطي أو ترقق جدار الشريان الأورطي أو مرض صمام القلب الأتحقي**. أو عوامل مخاطرة أخرى أو لديك الحالات المهيئة للمرض (مثل اضطرابات النسيج الضام كمتلازمة مارفان أو متلازمة إهلر-دانلوس . أو متلازمة تيرنر . أو متلازمة شوغرن [مرض المناعة الذاتية الانتهازية] . أو اضطرابات الأوعية الدموية مثل التهاب

الشرايين تآكياسو . التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة . مرض بهجت . ارتفاع ضغط الدم . أو تصلب الشرايين المعروف . و التهاب المفاصل الروماتويدي [مرض المفاصل أو التهاب المفاصل (عدوى القلب).

- إذا كنت مصاباً ب**مرض السكري** لأنك قد تواجه خطر حدوث تغير في مستويات السكر في الدم باستخدام موكسيغلوكساسين.
- إذا تم تشخيصك أو أي فرد من أفراد اسرتك ب**نقص إنزيم نازع هيدروجين المخلو-كوز-1 فوسفات** (و هو مرض نادر ورثائي). أبلغ طبيبك، الذي سوف ينصح ما إذا كان أفالوكس مناسب لك.
- إذا كان لديك **عدوى مضاعفة للجهاز التناسلي العلوي** لإلتهاب (مثل إقترانها مع خراج لبوق فالوب، للمبيض أو للحوص، لأجل ذلك يعتقد الطبيب أن العلاج بأحقن الوريدي ضروري. في هذه الحالة العلاج بأفالوكس أقراص يكون غير ملائم.

علاج العدوى الخفية إلى العدوى المتوسطة الشدة للجهاز التناسلي العلوي لإلتهاب
يجب على طبيب أن يصف عضاد حيوي آخر بالإضافة لأفالوكس إذا لم يتم خسن الأعراض بعد ثلاثة أيام من العلاج. الرجاء إبلاغ طبيبك.

عندما تتناول أفالوكس

- في حالات نادرة، يمكن حدوث **تفاعل أرجي (حساسية) خطير، مفاجئ (تفاعل تأقي / صدمة)**، حتى مع الجرعة الأولى، مصحوب بالأعراض الآتية:ضيق في الصدر، الشعور بدوار، اعتلال البصحة أو إغماء أو تعاني من دوار مع الوقيف، **أو حدث هذا، توقف عن تناول أفالوكس واطلب فوراً المساعدة الطبية**.
- أفالوكس يمكن أن يحدث **التهاب كيميدي سريع و خطير،** والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل كبدي مهدد للحياة (متضمنة حالات وفاة. انظر جزء ٤ – الآثار الجانبية المحتملة).
- البرءام مخاطية الطبيب قبل الاستمرار في العلاج. إذا ظهرت علامات مثل شعور مفاجئ باعتلال البصحة و / أو غثيان، بالإضافة إلى تغير لون بياض العين إلى اللون الأصفر، بول داكن، حكة في الجلد، زيادة القابلية للزرق أو مرض في المخ بسبب الكبد (أعراض نقص في وظائف الكبد أو تطور سريع و خطير لإلتهاب في الكبد).

تم الإبلاغ عن تفاعلات جلدية خطيرة حدث مع استخدام موكسيغلوكساسين، بما في ذلك متلازمة ستيفنز جونسون، انحلال البشرة السمي (تفسير الطبية العليا من الجلد بعد ذلك يوت الجلد بعيداً، والجسم في هذه الحالة يخضع لتسهم قوي). وفتّح طفحي حاد شامل (AGEP) (انظر أيضاً شكل بنور جلدية مفاجئة لارتفاعات صغيرة حمراء أو بضاء و حمراء لجلود خدوي على مادة غائمة أو صديد).
كذلك ظهر في البداية متلازمة ستيفنز جونسون / انحلال البشرة السمي (تفسير الطبية العليا من الجلد بعد ذلك يموت الجلد بعيداً، والجسم في هذه الحالة يخضع لتسهم قوي) على شكل بقع حمراء شبيهة بقصر محدث الشكل أو بقع دائرية غالباً مثل ظهور بقع مكرنة على الجذع (يشمل الجذع، الجزء الصدري من الجذع والجزء الخطين من الجذع والشفة الواقعة بين فتحة الشرح وكيس الصفن أو الفرج)، كما يمكن أن تحدث تقرحات في الفم والخلق والأنف والأضلاع التناسلية والعينين (عينون حمراء ومتفحفة، غالباً ما يسبق هذا الطفح الجلدي الشديد الحمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم) و / أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا . قد يتطور الطفح الجلدي إلى تقرش واسع النطاق للجلد ومضاعفات تهدد الحياة أو تكون قاتلة.

كإنتفاخ طفحي حاد شامل (AGEP) (يظهر على شكل بنور جلدية مفاجئة لارتفاعات صغيرة حمراء أو بضاء و حمراء للجلد خدوي على مادة غائمة أو صديد).
تظهر عند بدء العلاج كنتفح جلدي أحمر منتشر واسع الانتشار مع نتوءات خذ الجلد وبثور مصحوبة بالحمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم)، الموضع الأكثر شوبعاً، تتمركز بشكل رئيسي على ثنابا (الذراعين والجذع، الجزء الصدري من الجذع والجزء الخطين من الجذع والمنطقة الواقعة بين فتحة الشرح وكيس الصفن أو الفرج)، والأطراف العلوية.

إذا أصبت بطفح جلدي خطير أو أي من هذه الأعراض الجدية، فتوقف عن تناول موكسيغلوكساسين واتصل بطبيبك أو اطلب الرعاية الطبية على الفور.
المضادات الحيوية من مجموعة الكينولون، و يشمل ذلك الأفالوكس يمكن أن يسببوا تشنجات إذا حدث ذلك. توقف عن تناول أفالوكس و اتصل بطبيبك فوراً.

أثار جانبية خطيرة، تستمر لفترة طويلة، وتسبب عاهة جسدية ومن المحتمل أن تصح

مستمدة أي يتعذر علاجها.
الأدوية التي تنتمي لمجموعة الفلوروكينولون / الكينولون. بما في ذلك أفالوكس، مرتبطة بآثار جانبية نادرة للغاية ولكنها خطيرة، بعضها يستمر لفترة طويلة (شهور أو سنوات متوالة)، تسبب عاهة جسدية ومن المحتمل أن تصح مستمدة أي يتعذر علاجها. يشمل ذلك آثار الإلتهاب، والمفاصل والأطراف العلوية والانسجة، عبوة المشي، إحساس غير طبيعي عند لمس المسامير والأظفر، وخز دغشة، فقدان الإحساس، أو شعور بحرقاً (إحساس غير طبيعي، عادة هو وخز أو إحساس بوخز نابيس وإثر أشك بشكل رئيسي عن الضغط على المنطقة الطرفية أو ثقلها). اضطرابات حسية بما في ذلك ضعف الرؤية، ضعف خاصة التذوق والشم، والسعال، الاكتئاب، وضعف الذاكرة، التعب الشديد، واضطرابات النوم الشديدة.

إذا عانيت أي من هذه الآثار الجانبية بعد تناول أفالوكس، فاطصل بطبيبك مباشرة قبل الاستمرار في العلاج. سوف تقرر أنت وطبيبك الاستمرار في العلاج مع الأخذ في الاعتبار أيضاً مضاد حيوي من مجموعة أخرى.
قد تعاني نادراً من بعض **أعراض تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)** مثل ألم، حرقان، وخز، وتميل و / أو ضعف وخاصة في القدمين والساقين أو اليدين والذراعين. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول أفالوكس واحظر طبيبك على الفور من أجل منع تطور الحالة التي من المحتمل أن تصح مستمدة أي يتعذر علاجها.

يمكن أن تعاني من **مشاكل في الصحة النفسية** حتى في حالة تناول مضادات حيوية من مجموعة الكينولون لأول مرة. التي تشمل على أفالوكس، في حالات نادرة جداً الاكتئاب أو مشاكل الصحة النفسية قد نتج عنها التفكير في الانتحار، و تعريض النفس للخطر مثل محاولة الانتحار (انظر الجزء ٤ – الآثار الجانبية المحتملة). إذا تطورت لديك مثل هذه التفاعلات، توقف عن تناول أفالوكس و أبلغ طبيبك فوراً.

- يمكن أن يحدث **إسهال**، خلال أو بعد العلاج بالمضادات الحيوية، بما فيهم أفالوكس، في حالة حدوث إسهال خطير أو مستمر، إذا لاحظت وجود دم أو خضفان في البراز، يجب التوقف عن تناول أفالوكس فوراً و استشارة الطبيب في هذه الحالة. لا تتناول أي من الأدوية التي تبطن أو تثبط حركة الأمعاء.
- نادراً ما يحدث **ألم وتورم في المفاصل والتهاب أو ترقق الأوتار** (انظر الجزء ٤ لا تستخدم أفالوكس و ، الآثار الجانبية المحتملة)، تزداد الخطورة إذا كنت مسنناً (العمر فوق ٦٠ عاماً)، أو في القيام بعملية زراعة أعضاء في جسمك. أو كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو إذا كنت تتعاج بالكورتيزون. قد يحدث التهاب وترق للأوتار خلال الـ ٤٨ ساعة الأولى من العلاج وحتى عدة أشهر بعد توقف علاج أفالوكس عند أول علامة على ألم أو التهاب في وتر (على سبيل المثال في الكاحل أو الرسغ أو الكوع أو الكتف أو الركبة)، توقف عن تناول أفالوكس، اتصل بطبيبك و يجب عدم خريك المنطقة المؤلمة. خذ الفياض بأي خريك غير ضروري للمتابعة المؤلمة لأن هذا قد يزيد من خطر ترقق الأوتار.
- أشعر بألم شديد **مفاجئ في البطن أو الصدر أو الظهر**، والذي يمكن أن يكون من أعراض عدم إمتصاص الدموي الأبهري والتساق، فانقل فوراً إلى غرفة الطوارئ؛ قد تزداد مخاطرات إذا كنت تعالج بالكورتيكوستيرويدات.
- إذا بدأت تعاني من بداية سريعة لضيق في التنفس . خاصة عند الاستلقاء على فراشك، أو لاحظت تورماً في الكاحلين أو القدمين أو البطن . أو خضفان في القلب يحدث لأول مرة (إحساس بنبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة) يجب إبلاغ الطبيب على الفور.
- المرضى كبار السن الذين يعانون من **مشاكل في الكلى** يجب عليهم اتخاذ عناية شرب كمية وفيرة من السوائل. لأن عدم أخذ سوائل بكمية كافية يمكن أن يسبب جفاف و نتيجة لذلك تزداد مخاطر الفشل الكلوي.
- أن الحد العلاج بأفالوكس، إذا حدث خلل في البصر أو أي اضطرابات أخرى في العين، الرجاء

- استشارة طبيب عيون فوراً (انظر الجزء ١-٢ القدرة على القيادة و استخدام الماكينات و ٤ – الآثار الجانبية المحتملة).
- قد تسبب المضادات الحيوية الفلوروكينولون **زيادة في مستويات السكر في الدم** فوق المستويات الطبيعية (ارتفاع السكر في الدم). أو **خضف مستويات السكر في الدم** إلى أقل من المستويات الطبيعية (نقص سكر الدم). ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي (غيبوبة نقص سكر الدم) في الحالات الشديدة (انظر الجزء رقم ٤. الآثار الجانبية المحتملة). إذا كنت تعاني من مرض السكري، يجب مراقبة نسبة السكر في الدم بعناية.
- يمكن أن تسبب المضادات الحيوية الكينولونية أي أن يكون **الجلد أكثر حساسية لضوء الشمس أو للأشعة فوق البنفسجية**. يجب تجنب التعرض الطويل لضوء الشمس أو لضوء الشمس الشديد، و عدم استخدام اأحماض الشمسية أو الفرشاش الشمسي أو أي مصابيح للأشعة فوق البنفسجية UV خلال تناول أفالوكس.
- لم يتم إثبات قابلية محلول موكسيغلوكساسين للتسرب في علاج الحروق الشديدة. عدوى الانسجة العميقة و عدوى القدم السكري المصحوبة بالتهاب العظم و النقي (عدوى نخاع العظم).

الأطفال و المراهقين

لا تعطي هذه الأدوية للأطفال والمراهقين خت سن ١٨ سنة لأنه لم يتم إثبات الفعالية و السلامة لهذه الأدوية على الأطفال (انظر الجزء لا تتناول أفالوكس في الحالات الآتية).

تتناول أفالوكس مع أدوية أخرى

أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول تناولت حديثاً أو يمكن أن تتناول أية أدوية أخرى بالإضافة إلى أفالوكس.
قبل أن تتناول أفالوكس، يجب أن تدرك الآتي:
إذا كنت تتناول أفالوكس في نفس الوقت مع **أدوية أخرى تؤثر في القلب**، هناك مخاطرة زائدة لتغيرات في إفراز القلب.بناء على ذلك، لا تتناول أفالوكس مع الأدوية الآتية:
الأدوية التي تنتمي لمجموعة مضادات اضطرابات نظم ضربات القلب (مثل كوينيدين هيدروكلوريد، ديزوبيراميد، أميودون، سوفالون، دوفيتيلد، إبيوتيليد)، مضادات الدهون (مثل فينوبازين، بيزوبراميد، سيريتيمون، هالوبيندول، سالنوريد)، مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقاق، بعض مضادات الجوع مثل ساكوبتامير، سيبارفليكساسين، اترومييسين للحقن في الوريد، بنصاصيدن، الأدوية المضادة للآلام خاصة الهالوفانترين، بعض مضادات الهيستامين (مثل ترينفاندين، استيميزول، ميزولاستين) و أدوية أخرى (مثل سيرابراند، فيكسانس عن طريق الوريد، بيرينيدل، ديفيمبيلان).

يجب أن تبلغ طبيبك إذا كنت تتناول أدوية أخرى والتي يمكن أن تخفض مستويات البوتاسيوم في الدم (المع بعض مدرات البول، بعض الملبينات و الحقن الشرجية [جرعات عالية] كورتيكوستيرويد (أدوية مضادة للالتهاب)، أمفوتيريسين B) أو تسبب انخفاض سرعة القلب لأنه يمكن أيضاً أن تزيد مخاطرة اضطرابات إفراز القلب الخطيرة خلال تناول أفالوكس.
إذا كنت تتناول أفالوكس مع أدوية أخرى، (يشمل الجذع، الجزء الصدري من الجذع والجزء الخطين من الجذع والشفة الواقعة بين فتحة الشرح وكيس الصفن أو الفرج)، كما يمكن أن تحدث تقرحات في الفم والخلق والأنف والأضلاع التناسلية والعينين (عينون حمراء ومتفحفة، غالباً ما يسبق هذا الطفح الجلدي الشديد الحمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم) و / أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا . قد يتطور الطفح الجلدي إلى تقرش واسع النطاق للجلد ومضاعفات تهدد الحياة أو تكون قاتلة.

كإنتفاخ طفحي حاد شامل (AGEP) (يظهر على شكل بنور جلدية مفاجئة لارتفاعات صغيرة حمراء أو بضاء و حمراء للجلد خدوي على مادة غائمة أو صديد).
تظهر عند بدء العلاج كنتفح جلدي أحمر منتشر واسع الانتشار مع نتوءات خذ الجلد وبثور مصحوبة بالحمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم)، الموضع الأكثر شوبعاً، تتمركز بشكل رئيسي على ثنابا (الذراعين والجذع، الجزء الصدري من الجذع والجزء الخطين من الجذع والمنطقة الواقعة بين فتحة الشرح وكيس الصفن أو الفرج)، والأطراف العلوية.

إذا أصبت بطفح جلدي خطير أو أي من هذه الأعراض الجدية، فتوقف عن تناول موكسيغلوكساسين واتصل بطبيبك أو اطلب الرعاية الطبية على الفور.
المضادات الحيوية من مجموعة الكينولون، و يشمل ذلك الأفالوكس يمكن أن يسببوا تشنجات إذا حدث ذلك. توقف عن تناول أفالوكس و اتصل بطبيبك فوراً.

أثار جانبية خطيرة، تستمر لفترة طويلة، وتسبب عاهة جسدية ومن المحتمل أن تصح

مستمدة أي يتعذر علاجها.
الأدوية التي تنتمي لمجموعة الفلوروكينولون / الكينولون. بما في ذلك أفالوكس، مرتبطة بآثار جانبية نادرة للغاية ولكنها خطيرة، بعضها يستمر لفترة طويلة (شهور أو سنوات متوالة)، تسبب عاهة جسدية ومن المحتمل أن تصح مستمدة أي يتعذر علاجها. يشمل ذلك آثار الإلتهاب، والمفاصل والأطراف العلوية والانسجة، عبوة المشي، إحساس غير طبيعي عند لمس المسامير والأظفر، وخز دغشة، فقدان الإحساس، أو شعور بحرقاً (إحساس غير طبيعي، عادة هو وخز أو إحساس بوخز نابيس وإثر أشك بشكل رئيسي عن الضغط على المنطقة الطرفية أو ثقلها). اضطرابات حسية بما في ذلك ضعف الرؤية، ضعف خاصة التذوق والشم، والسعال، الاكتئاب، وضعف الذاكرة، التعب الشديد، واضطرابات النوم الشديدة.

إذا عانيت أي من هذه الآثار الجانبية بعد تناول أفالوكس، فاطصل بطبيبك مباشرة قبل الاستمرار في العلاج. سوف تقرر أنت وطبيبك الاستمرار في العلاج مع الأخذ في الاعتبار أيضاً مضاد حيوي من مجموعة أخرى.
قد تعاني نادراً من بعض **أعراض تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)** مثل ألم، حرقان، وخز، وتميل و / أو ضعف وخاصة في القدمين والساقين أو اليدين والذراعين. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول أفالوكس واحظر طبيبك على الفور من أجل منع تطور الحالة التي من المحتمل أن تصح مستمدة أي يتعذر علاجها.

يمكن أن تعاني من **مشاكل في الصحة النفسية** حتى في حالة تناول مضادات حيوية من مجموعة الكينولون لأول مرة. التي تشمل على أفالوكس، في حالات نادرة جداً الاكتئاب أو مشاكل الصحة النفسية قد نتج عنها التفكير في الانتحار، و تعريض النفس للخطر مثل محاولة الانتحار (انظر الجزء ٤ – الآثار الجانبية المحتملة). إذا تطورت لديك مثل هذه التفاعلات، توقف عن تناول أفالوكس و أبلغ طبيبك فوراً.

- يمكن أن يحدث **إسهال**، خلال أو بعد العلاج بالمضادات الحيوية، بما فيهم أفالوكس، في حالة حدوث إسهال خطير أو مستمر، إذا لاحظت وجود دم أو خضفان في البراز، يجب التوقف عن تناول أفالوكس فوراً و استشارة الطبيب في هذه الحالة. لا تتناول أي من الأدوية التي تبطن أو تثبط حركة الأمعاء.
- نادراً ما يحدث **ألم وتورم في المفاصل والتهاب أو ترقق الأوتار** (انظر الجزء ٤ لا تستخدم أفالوكس و ، الآثار الجانبية المحتملة)، تزداد الخطورة إذا كنت مسنناً (العمر فوق ٦٠ عاماً)، أو في القيام بعملية زراعة أعضاء في جسمك. أو كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو إذا كنت تتعاج بالكورتيزون. قد يحدث التهاب وترق للأوتار خلال الـ ٤٨ ساعة الأولى من العلاج وحتى عدة أشهر بعد توقف علاج أفالوكس عند أول علامة على ألم أو التهاب في وتر (على سبيل المثال في الكاحل أو الرسغ أو الكوع أو الكتف أو الركبة)، توقف عن تناول أفالوكس، اتصل بطبيبك و يجب عدم خريك المنطقة المؤلمة. خذ الفياض بأي خريك غير ضروري للمتابعة المؤلمة لأن هذا قد يزيد من خطر ترقق الأوتار.
- أشعر بألم شديد **مفاجئ في البطن أو الصدر أو الظهر**، والذي يمكن أن يكون من أعراض عدم إمتصاص الدموي الأبهري والتساق، فانقل فوراً إلى غرفة الطوارئ؛ قد تزداد مخاطرات إذا كنت تعالج بالكورتيكوستيرويدات.
- إذا بدأت تعاني من بداية سريعة لضيق في التنفس . خاصة عند الاستلقاء على فراشك، أو لاحظت تورماً في الكاحلين أو القدمين أو البطن . أو خضفان في القلب يحدث لأول مرة (إحساس بنبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة) يجب إبلاغ الطبيب على الفور.
- المرضى كبار السن الذين يعانون من **مشاكل في الكلى** يجب عليهم اتخاذ عناية شرب كمية وفيرة من السوائل. لأن عدم أخذ سوائل بكمية كافية يمكن أن يسبب جفاف و نتيجة لذلك تزداد مخاطر الفشل الكلوي.
- أن الحد العلاج بأفالوكس، إذا حدث خلل في البصر أو أي اضطرابات أخرى في العين، الرجاء

- استشارة طبيب عيون فوراً (انظر الجزء ١-٢ القدرة على القيادة و استخدام الماكينات و ٤ – الآثار الجانبية المحتملة).
- قد تسبب المضادات الحيوية الفلوروكينولون **زيادة في مستويات السكر في الدم** فوق المستويات الطبيعية (ارتفاع السكر في الدم). أو **خضف مستويات السكر في الدم** إلى أقل من المستويات الطبيعية (نقص سكر الدم). ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي (غيبوبة نقص سكر الدم) في الحالات الشديدة (انظر الجزء رقم ٤. الآثار الجانبية المحتملة). إذا كنت تعاني من مرض السكري، يجب مراقبة نسبة السكر في الدم بعناية.
- يمكن أن تسبب المضادات الحيوية الكينولونية أي أن يكون **الجلد أكثر حساسية لضوء الشمس أو للأشعة فوق البنفسجية**. يجب تجنب التعرض الطويل لضوء الشمس أو لضوء الشمس الشديد، و عدم استخدام أحماض الشمسية أو الفرشاش الشمسي أو أي مصابيح للأشعة فوق البنفسجية UV خلال تناول أفالوكس.
- لم يتم إثبات قابلية محلول موكسيغلوكساسين للتسرب في علاج الحروق الشديدة. عدوى الانسجة العميقة و عدوى القدم السكري المصحوبة بالتهاب العظم و النقي (عدوى نخاع العظم).

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل كل الأدوية، أفالوكس يمكن أن يسبب آثار جانبية، برغم أنها لا تصيب كل الأشخاص. فيما يلي **الآثار الجانبية الأكثر خطورة** التي تم ملاحظتها أثناء العلاج بأفالوكس.

إذا لاحظت:

- تسارع غير طبيعي لإفراز القلب (نادر)
- تشنج فجأة للذراعين أو الساقين أو تلاخط اصفرار بياض العينين بول داكن، حكة في الجلد، واللبل إلى الترق أو اضطرابات السكر أو القيقظة (يمكن أن تكون هذه علامات وأعراض التهاب كبدي مفاجئ على أن يؤدي إلى فشل كبدي مهدد للحياة (نادر جداً، وقد لوحظ حدوث حالات وفاة) **طفح جلدي خطير** بما في ذلك متلازمة ستيفنز جونسون وانحلال البشرة السمي (تفتشير الطبقة العليا من الجلد بعد ذلك يموت الجلد بعيداً، والجسم في هذه الحالة يخضع لتسهم قوي). كما قد تظهر هذه الأعراض على شكل لطفحات أو بقع دائرية يميل لونها إلى الحمرة غالباً مثل ظهور بقع مكرنة على الجذع (يشمل الجذع، الجزء الصدري من الجذع والجزء الخطين من الجذع والمنطقة الواقعة بين فتحة الشرح وكيس الصفن أو الفرج) وتفتشير الجلد وفرخ الدم والخلق والأنف والأضلاع التناسلية والعينين ويمكن أن تسببها أعراض حمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم)، أعراض تشبه الأنفلونزا (آثار جانبية نادرة جداً، قد تهدد الحياة).
- طفح جلدي أحمر منتشر واسع الانتشار** مع نتوءات خذ الجلد وبثور مصحوبة بحمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم)، فقدان السمع، فقدان طفح حاد شامل (يظهر على شكل بنور جلدية مفاجئة لارتفاعات صغيرة حمراء أو بضاء و حمراء للجلد خدوي على مادة غائمة أو صديد) (تكرار هذا التأثير الجانبي "غير معروف")
- للتلازمة المرتبطة بضعف ضغط الدم، وانخفاض مستويات الصوديوم وتسمى SIADH) (متلازمة الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول) (أحد الآثار الجانبية النادرة جداً)
- فقدان السمع بسبب الانخفاض الحاد في مستويات السكر في الدم (غيبوبة سكر الدم) (نادر جانبية نادرة جداً)
- التهاب الأوعية الدموية (يمكن أن تكون العلامات كبقع حمراء على الجلد، عادة على الجزء الأسفل من الساق أو على الكاحل (تأثير جانبي نادر جداً)
- تفاعلات حساسية عامة حادة و مفاجئة تشمل ضمة تهدد الحياة (مثل صدمة في الحساسية، انخفاض ضغط الدم، سرعة التنفس) (نادر)
- انتفاخ أو تورم في مجرى الجهاز التنفسي (نادر جداً، يحمثل أن يكون مهددة للحياة)
- بولات تشنج (نادر)
- مشاكل مرتبطة بالجهاز العصبي مثل الألم، إحساس بالإحراق، وخز و خدر و / أو ضعف في الأطراف (نادر)
- اكتئاب أو الشعور بالخطر (نادر)
- محاولات الانتحار (نادر)
- الجنون (يحمثل أن تؤدي تعريض النفس للخطر، مثل أفكار، نوابا أو محاولات الانتحار) (نادر جداً)
- إسهال شديد جداً مع وجود دم و / أو مخاط (مضاد حيوي – يرافقه التهاب القولون يشمل التهاب القولون الغشائي (الكتايب)، الذي في ظروف نادرة جداً، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات قد تكون مهددة للحياة (نادر)
- ألم وتورم في الأطراف (الوتر) (نادر) أو ترقق في الأوتار (نادر جداً)

أشعر بضعف، فقدان بياض العين أو الجلد إلى اللون الأصفر، خذل في الإحساس عن طريق الجلد (احلام غير طبيعية)
خذل في التبركيز
ضعف في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم)
اضطراب التوازن و خذل التناسق (نتيجة دوار و دوخة)
فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
ضعف في السمع شامل الصمم (عادة قابل للإصلاح)
زيادة حاسض البوليك في الدم
مزاج متقلب
خذل في الكلام أو التحدث.
فقدان الوعي
ضعف العضلات
خذل في التبركيز
ضعف العضلات
خذل في البقع
خذل خاصة التشم (يشمل فقدان حاسة الشم