



# bedelix®

Montmorillonite beidellitique

3 g

③

## **1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT**

### **DÉNOMINATION :**

**BEDELIX**, poudre pour suspension buvable.

### **COMPOSITION :**

Montmorillonite beidellitique (Monmectite) ..... 3 g

Excipients : gel d'hydroxyde d'aluminium et de carbonate de magnésium codesséchés, extrait de réglisse, vanilline, saccharine sodique, glucose hydraté  
Pour un sachet

### **FORME PHARMACEUTIQUE :**

Poudre pour suspension buvable.

Boîte de 30 ou 60 sachets.

### **CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :**

PROTECTEUR DES MUQUEUSES GASTRO-ŒSOPHAGIENNES ET GASTRO-INTESTINALES

(A : Appareil digestif et métabolisme).

### **TITULAIRE / EXPLOITANT :**

IPSEN Pharma

65, quai Georges Gorse - 92100 Boulogne - Billancourt

**FABRICANT :** BEAUFOUR IPSEN Industrie rue Ethe Virton 28100 Dreux

## **2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

Ce médicament est préconisé dans le traitement symptomatique des colopathies fonctionnelles.

## **3. ATTENTION !**

### **DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant :

– Affection sténosante (rétrécissement) du tube digestif.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Chez les dialysés chroniques, le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, sans avis médical, en raison de la présence d'hydroxyde d'aluminium.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :**

Pour éviter tout risque d'interférence sur l'absorption digestive d'éventuels médicaments associés, il est conseillé d'administrer ces derniers à distance de la prise du produit (au moins 2 heures).

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

**GROSSESSE - ALLAITEMENT :**

*D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.*

**4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT**

**POSOLOGIE :**

Voie orale

Adultes : 3 sachets par jour en moyenne

Enfants :	avant 2 ans	: 1/2 sachet 1 à 2 fois par jour
	de 2 à 5 ans	: 1/2 sachet 2 à 3 fois par jour
	de 5 à 10 ans	: 1 sachet 2 fois par jour

Voie rectale

Lavement à garder : 1 à 3 lavements par jour de 1 à 3 sachets délayés dans 100 ml d'eau.

**MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :**

Voie orale

Le contenu d'un sachet peut être délayé dans un demi-verre d'eau ou mélangé à un aliment semi-liquide comme bouillie, compote, purée, etc...

Voie rectale

Le contenu du ou des sachets doit être délayé dans 100 ml d'eau tiède.

**FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ :**

Administrer de préférence entre les repas ou un peu avant.

**DURÉE DU TRAITEMENT :**

Respectez la prescription de votre médecin.

**5. EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS**

*SIGNEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.*

**6. CONSERVATION**

**NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.**

**7. DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE**

Mai 1999