

DOLEAN PH8™

Aspirine

Propriétés :

Aspirine entérosoluble

L'enrobage des comprimés de Dolean PH8™ est conçu pour empêcher la libération de l'aspirine dans l'estomac et éviter ainsi l'agressivité directe de l'aspirine pour la muqueuse gastrique. D'autre part, en se délitant dans la première portion de l'intestin grêle, les comprimés de Dolean PH8 agissent de façon un peu moins rapide, mais plus durable, ce qui permet l'espacement des prises et l'utilisation du produit dans les traitements prolongés.

Formule :

Acide acétylsalicylique	500 mg
Excipient q.s.p. un comprimé gastrorésistant.	

Indications thérapeutiques :

Celles de l'aspirine :

Affections rhumatismales aiguës et chroniques.

Douleurs d'étiologies diverses : céphalées, migraines, névralgies, lumbagos, douleurs dentaires. Courbatures fébriles, état grippal, états infectieux bénins, en complément du traitement spécifique.

Contre-indications :

Maladies ulcéreuses duodénales, accidents d'hypersensibilité antérieurs aux salicylés, toute maladie hémorragique constitutionnelle ou acquise.

Risques hémorragiques.

Dernier trimestre de la grossesse.

Précautions d'emploi :

Grossesse : éviter toute prise prolongée au cours de la grossesse. Une prise isolée au cours des deux premiers trimestres ne pose pas de problème.

En cas d'ulcère gastroduodénal, de traitement anticoagulant associé, de traitement prolongé ou à fortes doses, d'antécédent d'allergie à l'aspirine et aux salicylés, d'asthme ou de grossesse, il est recommandé de consulter un médecin.

Interactions médicamenteuses :

Certaines associations de l'Aspirine en général, avec d'autres médicaments peuvent entraîner des modifications de l'action de ces produits.

Par exemple : soit en l'augmentant (anticoagulants), soit en la diminuant (anti-inflammatoires).

Effets indésirables :

Un surdosage peut être responsable de troubles divers comme notamment bourdonnements d'oreilles et signes hémorragiques locaux ou digestifs.

En cas de grossesse, ce médicament peut retarder l'accouchement (cf. contre-indications).

Mode d'emploi et posologie usuelle :

Voie orale

Adultes : 1 à 6 comprimés, à avaler sans croquer, avec de l'eau en une ou plusieurs prises quotidiennes susceptibles d'être modifiées, selon les indications du médecin..

Enfants de 12 à 15 ans : 1 à 2 comprimés par jour à avaler sans croquer avec de l'eau.

Présentation :

Comprimés gastrorésistants

Boîte de 20 comprimés A.M.M. 316 395.5

Boîte de 50 comprimés A.M.M. 316 396.1

SALICYLES ORAUX SIMPLES OU ASSOCIÉS

Les informations et conseils suivants vous sont donnés par l'Industrie Pharmaceutique, les Professions de Santé et des Organisations de Consommateurs.

Ce produit contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique) ou un de ses dérivés.

C'est un médicament. Pour sa bonne utilisation, lisez attentivement toute cette notice.

L'aspirine est principalement utilisée pour calmer les douleurs ou faire baisser la fièvre.

Pour que ce médicament soit efficace, vous devez respecter les doses qui sont indiquées. En cas de persistance des troubles, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous prenez actuellement d'autres médicaments, assurez-vous que l'emploi de l'aspirine est autorisé.

Avant d'utiliser ce médicament pour un nourrisson ou un jeune enfant, vérifiez attentivement s'il peut lui être donné, notamment, si le dosage lui convient et respectez scrupuleusement la posologie figurant sur la notice et correspondant à l'âge de l'enfant.

Signalez systématiquement à votre médecin, comme à votre pharmacien, les médicaments que vous prenez déjà, avant qu'il ne rédige une ordonnance ou ne délivre un médicament.

VOTRE MÉDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MÉDICAMENTS. N'HÉSITEZ PAS À LEUR DEMANDER DES PRÉCISIONS.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS

**Département Médecine Interne
Laboratoires 3M Santé**

3, rue Danton
92245 Malakoff Cedex
Tél. (1) 49.65.51.51

3M